

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Дон Гамильтон

*Гомеопатическое
лечение
кошек
и собак*



**Малые дозы
для маленьких
животных**

С помощью сведений, изложенных в этой книге, вы сможете дополнить рекомендации ветеринаров, которые занимаются лечением ваших домашних животных. Некоторые несложные заболевания ваших питомцев вполне возможно лечить гомеопатическим методом самостоятельно в домашних условиях, однако при всех серьезных заболеваниях необходима помощь ветеринара. Во всех случаях, когда требуется выбрать тот или иной метод лечения вашего питомца, я рекомендую вам получить как можно больше информации – тогда ваше решение о методе лечения будет обдуманным и взвешенным. При появлении малейших сомнений в правильности ваших действий следует непременно обращаться за консультацией к ветеринару.

Homeopathic Care *for* Cats *and* Dogs

**SMALL
DOSES
FOR
SMALL
ANIMALS**

DON HAMILTON, DVM



North Atlantic Books
Berkeley California

Homeopathic Care for Cats and Dogs: Small Doses for Small Animals

Copyright © 1999 by Don Hamilton. All rights reserved. No portion of this book, except for brief review, may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without written permission of the publisher. For information contact North Atlantic Books.

Published by
North Atlantic Books
P.O. Box 12327
Berkeley, California 94712

Cover and interior photographs by Kathleen Dudley, Fine Feline Photography
Cover and book design by Ayelet Maida, A/M Studios
Printed in the United States of America

Homeopathic Care for Cats and Dogs: Small Doses for Small Animals is sponsored by the Society for the Study of Native Arts and Sciences, a nonprofit educational corporation whose goals are to develop an educational and crosscultural perspective linking various scientific, social, and artistic fields; to nurture a holistic view of arts, sciences, humanities, and healing; and to publish and distribute literature on the relationship of mind, body, and nature.

North Atlantic Books are available through most bookstores. To contact North Atlantic directly, call 800-337-2665 or visit our website:
www.northatlanticbooks.com

Substantial discounts on bulk quantities of North Atlantic books are available to corporations, professional associations, and other organizations. For details and discount information, contact the special sales department at North Atlantic Books.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Hamilton, Donald, 1954–

Homeopathic care for cats and dogs : small doses for small animals /
by Donald Hamilton.

p. cm.

Includes bibliographical references (p.).

ISBN 1-55643-295-X (alk. paper)

1. Cats—Diseases—Homeopathic treatment.
2. Dogs—Diseases—Homeopathic treatment. I. Title.

SF985.H35 1999

636.8'089532—DC21

98-41291

CIP

Гомеопатическое Лечение Кошек и Собак

МАЛЫЕ


ДОЗЫ

ДЛЯ

МАЛЕНЬКИХ

ЖИВОТНЫХ

Дон Гамильтон, D.V.M.



Издательство «Гомеопатическая Медицина»
Москва, 2005

УДК 619:615.015.32:636.7/.8

ББК 48

Г 18

Перевод с английского:

Мельникова О. Е.

Мельников С. А.

Главный редактор:

к. м. н. Дмитриев Валерий Кузьмич

Гамильтон, Дон

Г 18 Гомеопатическое лечение кошек и собак, М.:

Гомеопатическая Медицина, 2005. — 680 с.

ISBN 5-89777-089-1

Книга Дона Гамильтона посвящена применению гомеопатического метода для лечения кошек и собак. Автору удалось написать яркое и очень основательное руководство по ветеринарной гомеопатии, доступное всем, кто искренне любит своих питомцев. В книге нашли отражение как огромный практический опыт Д. Гамильтона, так и необычайно глубокое понимание принципов гомеопатии. Это удивительная книга, пронизанная любовью и уважением к домашним животным. Благодаря этой книге вы сможете лучше понимать ваших питомцев и заботиться о них.

Книга ориентирована на широкий круг читательской аудитории.

ББК 48

ISBN 5-89777-089-1

© ЗАО «Гомеопатическая Медицина»,
Москва, 2005

Содержание

Благодарность	15
Предисловие	17
Вступление	19

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРИНЦИПЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ	29
---	----

Глава 1 <i>Введение в гомеопатию</i>	31
--	----

История развития гомеопатии	33
-----------------------------------	----

Самуэль Ганеман – основоположник гомеопатии	33
---	----

Испытания и закон подобия	35
---------------------------------	----

Сострадательное отношение к больным.

Индивидуализация

лечения пациентов	37
-------------------------	----

Константин Геринг и развитие гомеопатии в США	38
---	----

Закон излечения Геринга	39
-------------------------------	----

Расцвет и упадок гомеопатии в XIX веке	39
--	----

Джеймс Кент и дальнейшее развитие гомеопатии в США	40
---	----

Возрождение гомеопатии в XX веке	42
--	----

Общее введение в гомеопатию	44
-----------------------------------	----

Испытания, закон подобия и понимание сущности лекарства	44
--	----

Определение подобного гомеопатического средства по <i>Materia Medica</i> и Реперториуму	45
--	----

Что такое гомеопатическое средство	47
--	----

Потенцирование: разведение и встряхивание	48
---	----

Краткое содержание главы 1	51
----------------------------------	----

Глава 2 <i>Природа болезни</i>	53
--------------------------------------	----

Традиционная медицина и учение рационалистов	55
--	----

Холистическая медицина и эмпирическое учение	60
--	----

Острое заболевание в сравнении с хроническим заболеванием	64
--	----

Болезнь как индивидуальное явление	66
--	----

Симптомы – не болезнь, а ее проявления	68
--	----

Симптомы, в сущности, процесс исцеления	69
---	----

Что же такое болезнь?	71
Ваш здоровый питомец	81
Краткое содержание главы 2	84
 Глава 3 <i>Природа излечения</i>	87
Симптомы излечения	91
Симптомы частичного излечения	93
Симптомы облегчения	94
Симптомы подавления	98
Усиление симптомов, не связанное с излечением	100
Отсутствие ответной реакции	101
Краткое содержание главы 3	102
 ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ	105
 Глава 4 <i>Что делать, если ваш питомец заболел?</i>	107
В каких случаях обращаться за ветеринарной помощью -	111
Совместная работа с ветеринаром-гомеопатом	113
Помощь и препятствия к излечению	115
Другие методы лечения	121
Краткое содержание главы 4	125
 Глава 5 <i>Применение гомеопатии в домашних условиях</i>	127
Анализ симптомов заболевания	
и выбор подобного средства	129
Конституциональное назначение	
в сравнении с острым назначением	135
Как работать с главами, посвященными	
лечению отдельных заболеваний	139
Как обращаться с гомеопатическими средствами	
и как правильно применять их у животных	142
Дозы, потенции и повторные приемы средства	146
Наблюдение за динамикой заболевания у животных	155
Краткое содержание главы 5	157
 Глава 6 <i>Кожные покровы и уши</i>	161
Общий обзор	163
Функции кожи	168

Кожные инфекции и высыпания -----	169
Кожный зуд -----	170
Участки раздражения кожи -----	177
Воспаление сальных желез (акне) -----	181
Парша -----	182
Укусы и ужаливания -----	185
Ожоги пламенем и кипятком -----	188
Дерматомикоз -----	190
Заболевания ушей -----	192
Ушные клещи -----	194
Лисохвост и инородные тела -----	195
Ушные гематомы -----	196
Укусы насекомых -----	199
 Глава 7 Полость рта, десны и зубы -----	201
Функции -----	203
Воспаление десен и воспалительные процессы полости рта -----	208
Ретенционная подъязычная киста (ранула) -----	217
Абсцессы и кариозное разрушение зубов -----	218
 Глава 8 Система пищеварения -----	227
Пища и питание -----	229
Функции -----	230
Регургитация и рвота -----	234
Диарея -----	241
Запор -----	251
Вздутие живота (метеоризм) -----	259
 Глава 9 Система дыхания, нос и синусы -----	265
Воздух, которым мы дышим -----	267
Функции -----	268
Чиханье и выделения из носа -----	271
Носовое кровотечение -----	279
Кашель -----	281
Заболевания легких -----	288
 Глава 10 Орган зрения -----	289
Краткое описание -----	291

Функции -----	291
Конъюнктивит -----	292
Гипопион (скопление гноя в передней камере глаза) -----	303
Язвы роговицы -----	304
Энтропион (выворот век) -----	305
Травмы глазного яблока -----	306
Глава 11 Мочевыводящая система -----	309
Функции -----	311
Заболевания мочевыводящей системы -----	312
Цистит (воспаление мочевого пузыря) -----	315
Обструкция уретры и катетеризация -----	325
Почечная недостаточность -----	327
Недержание мочи -----	340
Посттравматическое недержание мочи -----	343
 Глава 12 Костно-мышечная система (органы движения) -	345
Функции -----	347
Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями костно-мышечной системы -----	348
Артрит, дисплазия тазобедренного сустава, спондилит ---	350
Заболевания межпозвонковых дисков (смещение межпозвонковых дисков) -----	357
Заболевания костно-мышечной системы в периоде роста (в основном у собак) -----	362
Паностеит -----	362
Гипертрофическая остеодистрофия -----	364
Расслаивающий остеохондрит -----	366
Рахит -----	367
Болезнь Легга–Кальве–Пертеса -----	370
Травматические повреждения костно-мышечной системы -----	370
Переломы костей -----	370
Растяжения мышц и связок -----	371
Разрывы мышц -----	374
 Глава 13 Нервная система -----	375
Функции -----	377
Дегенеративная миелопатия -----	377
Паралич норных собак -----	382

Паралич из-за укуса клеща -----	383
Судорожные припадки -----	383
Агрессивность и рабический миазм -----	386
Травмы головного и спинного мозга -----	390
Глава 14 <i>Репродуктивная система</i> -----	395
Обзор -----	397
Кастрация -----	398
Размножение -----	401
<i>Мужская половая система</i> -----	404
Функции -----	404
Выделения из половых путей (баланопостит, воспаление крайней плоти) -----	405
Фимоз и парафимоз -----	407
Крипторхизм -----	409
Воспаление яичек (орхит) -----	411
Травмы яичек -----	414
Заболевания простаты -----	415
Гиперсексуальное поведение -----	419
<i>Женская половаая система</i> -----	420
Функции -----	420
Выделения из влагалища -----	422
<i>Беременность и неонатальный период</i> -----	432
Беременность -----	433
Роды -----	434
Послеродовые состояния -----	435
Боли -----	435
Кровотечение -----	435
Задержка отхождения плаценты -----	435
Инфекции в послеродовом периоде -----	435
Эклампсия -----	437
Неонатальный период -----	439
Отторжение (неприятие) котят и щенков -----	439
Ослабленные котята и щенки -----	439
Отставание в росте -----	440
Заболевания молочных желез -----	440
Недостаточная продукция молока -----	440
Как прекратить продукцию молока после завершения кормления -----	442

Неполноценное молоко -----	442
Мастит -----	444
Травмы молочной железы -----	446

Глава 15 Показания к применению гомеопатических средств при различных состояниях -----	447
Обзор -----	449
Абсцессы -----	450
Аллергические реакции -----	457
Укушенные раны у кошек и собак -----	460
Укусы змей -----	463
Резаные и рваные раны -----	467
Сахарный диабет -----	468
Реакции при введении некоторых лекарственных препаратов -----	469
Эвтаназия -----	471
Страх -----	474
Боязнь громких звуков -----	476
Лихорадка и инфекции -----	477
Блохи -----	480
Отравление пищей и пищевыми отбросами -----	487
Горе -----	489
Болезни сердца -----	490
Дирофиляриоз -----	492
Кровотечение -----	493
Повышенная двигательная активность -----	496
Заболевания печени -----	498
Новые обитатели вашего дома -----	503
Перегревание (солнечный удар) -----	506
Хирургические вмешательства -----	509
Заболевания щитовидной железы -----	511
Вакцинальные реакции -----	515
Гельминтозы у животных (кишечные) -----	518

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВАКЦИНАЦИЯ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? -----	523
--	------------

Глава 16 Вакцинация -----	525
Вакцины – простой вопрос, на который сложно ответить -----	528

Зачем проводить ежегодную вакцинацию, если в этом нет необходимости? -----	534
Вакцинация должна предупредить заболевание, не так ли? -----	536
Может ли вакцинация стать причиной заболевания? -----	542
Вакцинация: замена острого заболевания хроническим -----	546
Каким образом вакцинация может стать причиной заболевания? -----	556
Вакцинация и ее влияние на головной мозг -----	558
Как применить полученную информацию на практике? --	560
Какие вакцины следует применить, если вы все же решитесь проводить вакцинацию домашних животных? -----	568
 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА -----	571
 Глава 17 <i>Materia Medica</i> -----	573
Описание гомеопатических средств -----	577
 Дополнение -----	653
Словарь специальных терминов -----	655
Примечания -----	665
Список рекомендуемой литературы -----	669

Благодарность

Благодарю *KD* за поддержку, помощь, бесконечное терпение и корректуру книги. Искренняя благодарность моей матери Барбаре за корректуру, поддержку, которую я ощущаю в течение всей жизни, и за помощь в принятии сложных решений. Благодарю Джеффа, чья неизменная поддержка вдохновляла меня при написании этой книги.

В память моего отца **Фила**, который воспитал во мне честность и веру в то, что каждый имеет право делать то, что считает нужным. В память **Эдварда Витмонта** – одного из самых светлых людей, которые мне встретились.

Предисловие

Длительные хронические заболевания домашних животных являются источником глубочайших страданий для всех, кто искренне любит своих питомцев. Такие же эмоции испытывают и врачи-ветеринары. Надо отдать должное тем самоотверженным и преданным своей профессии ветеринарам, которые, осознавая ограниченные возможности традиционной медицины, не желают с этим смириться и настойчиво ищут новые пути лечения. Одним из этих смелых новаторов и является автор этой книги Дон Гамильтон, чьим жизненным призванием стало гомеопатическое лечение животных.

В своей книге Дон Гамильтон последовательно и в доступной форме излагает основные принципы гомеопатии, знание которых необходимо для успешного лечения больных животных. Несомненно, что благодаря этой книге вы приобретете реальную возможность помочь вашим питомцам в преодолении различных превратностей жизни. Более того – эти знания помогут вам активно сотрудничать с ветеринарами и принимать участие в процессе лечения вашего питомца.

Величайшее преимущество гомеопатии заключается в более точном и глубоком понимании сущности болезни, что позволяет достичь замечательных результатов в лечении. Современному человеку свойственно стремиться к быстрому и легкому разрешению всех проблем; желание быстро вылечить своего питомца не является исключением. Тем не менее методы лечения в рамках традиционной медицины далеко не во всех случаях приводят к полному и быстрому выздоровлению. Для многих пациентов именно гомеопатическое лечение является последней надеждой на полное излечение. Тем более печально смотреть на тех животных, которых вполне можно было бы вылечить при упорном и терпеливом гомеопатическом лечении – если бы люди не стремились к быстрому эффекту от применения аллопатических лекарств.

Возможно, что наиболее четко мы можем почувствовать преимущества гомеопатии при сравнении быстрого привычного и поверхностного эффекта при применении аллопатических лекарств и глубокого истинного излечения при применении гомеопатических средств. Гомеопатические средства обладают

удивительной способностью стимулировать собственные восстановительные способности организма живых существ, однако для такого восстановления необходимо определенное время. В качестве примера можно рассмотреть процесс заживления раны. *Нам хорошо известно*, что должно пройти время, чтобы рана очистилась от поврежденных тканей, заполнилась грануляционной тканью и затем зарубцевалась – естественно, что этот процесс не может произойти за несколько часов. Однако почему-то при хронических длительных заболеваниях у животных мы рассчитываем на стремительное выздоровление. Конечно, о таком можно только мечтать, но на самом деле при хронических заболеваниях быстрое восстановление здоровья просто невозможно. При аллопатическом лечении животных в погоне за быстрым результатом мы назначаем им все больше и больше сильных лекарств, однако желаемое выздоровление не наступает, а несчастные животные продолжают страдать и мучиться в ожидании если не излечения, то хотя бы облегчения.

В своей книге Дон Гамильтон подробно разъясняет понятия «здоровье» и «болезнь», постепенно, шаг за шагом подводя читателей к пониманию сущности этих состояний. Также постепенно читателю становится понятным, почему такой на первый взгляд убедительный эффект аллопатических лекарств оказывается таким недолговечным. Эти знания помогут вам, позволив из наблюдателя превратиться в активного участника процесса лечения вашего питомца.


Понимание сущности здоровья и болезни является основным не только для гомеопатии, но и для других методов лечения, благодаря которым возможно полное исцеление организма. Конечно, читателям потребуется определенное время для внимательного изучения этой книги и постижения одного из величайших открытий в истории медицинской науки. Нам необыкновенно повезло, что в этом увлекательном путешествии нас будет сопровождать именно доктор Дон Гамильтон.

Richard H. Pitcairn, D.V.M., Ph.D.

Вступление

Я получил диплом ветеринара в 1979 г. Я стремился не только добиться определенного финансового успеха; я искренне надеялся, что с помощью полученных знаний и навыков смогу облегчить страдания больных животных. Вполне естественно, что меня одолевали и сомнения относительно моей способности правильно использовать все те знания, которые у меня были. Однако я был полон желания работать и вынашивал честолюбивые планы получить со временем степень доктора ветеринарии.

Сразу же после окончания института я начал работать в клинике по оказанию неотложной помощи животным и быстро убедился, что действительно во многих ситуациях я могу оказать реальную помощь своим пациентам. Несмотря на то, что работа была достаточно тяжелой, я получал огромное удовлетворение от сознания своей полезности. Когда в 1984 г. я перешел работать в обычную ветеринарную клинику, я чувствовал себя уже вполне зрелым специалистом. Однако вскоре появилось и чувство разочарования — я увидел, что



просто не в состоянии помочь некоторым категориям больных животных, с которыми почти не встречался во время работы в экстренной клинике. Чаще всего подобным камнем преткновения были случаи кожных заболеваний и кожного зуда у кошек и собак; кроме этого встречались и некоторые другие состояния, когда я чувствовал себя практически бессильным. Основной общей чертой всех этих состояний было то, что с помощью лечения удавалось лишь на какое-то время уменьшить проявления болезни, однако полностью вылечить несчастных страдальцев не удавалось никогда. Общее состояние

этих животных не было таким уж тяжелым; однако этих пациентов снова и снова приводили ко мне на прием в надежде на облегчение их страданий. Основным лекарством, с помощью которого удавалось уменьшить кожный зуд, был преднизолон (стероидный препарат, который часто ошибочно называется «кортизон»), однако я отчетливо понимал опасность длительного и постоянного применения этого лекарства. При отмене же преднизолона у всех пациентов такого рода кожный зуд немедленно возвращался, причем интенсивность проявления симптомов со временем неуклонно прогрессировала.

Не знаю, кто чувствовал большее разочарование – я сам или мои клиенты, которые просто не понимали, почему я отказываюсь назначать их питомцам такие дозы стероидов, которые полностью подавили бы кожный зуд. Мне приходилось бесконечно объяснять им, что применение значительных доз стероидов крайне опасно для состояния их животных. С другой стороны, я вполне понимал и их доводы – их питомцы действительно страдали от мучительного зуда, не спали ночью сами и не давали спать всей семье; наблюдать же, как собака или кошка постоянно чешется днем и ночью, было не меньшим мучением. В конце концов я просто начал сомневаться в собственных силах и собственном умении лечить. Как-то раз один из уважаемых мною коллег сказал, что он тоже испытывает страшное разочарование из-за того, что все наши лечебные возможности сводятся к назначению «антибиотиков, внутривенных инфузий и стероидов». При этих словах в моей голове будто зазвонил колокольчик – я вдруг понял, что *бессилен не я*, а наша традиционная система лечения больных; фактически мы не лечим, а лишь на какое-то время облегчаем состояние наших пациентов, но затем все симптомы возвращаются практически в том же виде.

Я сразу же приступил к поискам других методов лечения, с помощью которых можно было бы излечить моих пациентов от хронических заболеваний, а самого себя – от чувства глубокой неудовлетворенности и бессилия. В 1986 г. я начал изучать акупунктуру и в 1987 г. получил сертификат, позволяющий мне применять этот метод лечения в ветеринарии. Акупунктура представляет собой достаточно распространенный и понятный метод лечения, однако я не нашел в этом методе того, что

искал. Меня и сейчас привлекает красота и изящество методов лечения китайской традиционной медицины, но все это не стало моим призванием.

В том же, 1986 г. я занялся изучением гомеопатии, которая необычайно меня заинтересовала. С 1990 г. параллельно с основной работой я начал вести прием больных животных уже как ветеринар-гомеопат. Меня совершенно очаровали принципы лечения гомеопатическим методом и сами гомеопатические средства – безвредные и неинвазивные. На меня огромное впечатление произвела экологичность гомеопатии – никаких токсических соединений, никакого побочного эффекта за счет продуктов распада средства в организме, деликатные малые дозы; кроме того, лечение можно продолжать сколь угодно долго, однако не требуется частых повторных приемов средства.

В огромной силе, заключенной в этих предельно малых дозах гомеопатических средств, я убедился на практике – я воочию увидел улучшение состояния тех моих пациентов, которых привык считать неизлечимыми. Чем больше я изучал гомеопатию, тем больше убеждался в цельности и разумности этой лечебной системы. Основные понятия каждой лечебной системы – понятие «здоровье» и понятие «болезнь» – гомеопатической наукой объяснялись совсем не так, как традиционной медициной. Но самым ценным для меня было то, что гомеопатическая трактовка сущности здоровья и болезни вполне *совпадала с моим практическим опытом*. С точки зрения конвенциональной медицины, изучению которой я посвятил достаточно много времени, *я не мог объяснить возникновение болезни*; с точки зрения гомеопатии я не только мог объяснить, что же произошло с моими пациентами, но и мог предвидеть дальнейший ход событий.

Так гомеопатия стала и моим призванием, и моей профессией. С 1993 г. я полностью перешел к гомеопатическому методу лечения животных. Конечно, ни один из лечебных методов не может быть совершенным, однако результаты гомеопатического лечения животных удовлетворяли меня несравненно больше, чем результаты традиционного лечения. Я почувствовал, что теперь могу помочь тем моим пациентам, которые раньше просто не поддавались обычному лечению. Кроме того, я отчетливо увидел, что с острыми нетяжелыми состояниями можно

справиться и в домашних условиях, не обращаясь в ветеринарную клинику, однако успешно лечить животных с серьезными хроническими процессами может только профессиональный гомеопат. Осознание этого факта позволило мне приступить к написанию этой книги. Я надеюсь, что таким образом я смогу помочь значительно большему числу больных животных, чем это возможно в условиях приема в ветеринарной клинике. На страницах этой книги я постарался передать читателям собственный практический опыт; я уверен, что это поможет вам лучше понимать ваших домашних питомцев и лучше заботиться об их здоровье.

При обдумывании плана этой книги выявилось одно препятствие, которое, как мне иногда казалось, я не сумею преодолеть. Дело в том, что мне хотелось бы написать такую книгу, где не только были бы изложены основные принципы гомеопатии, но и которую можно было бы использовать как домашний справочник по ветеринарной гомеопатии. Как правило, книги такого плана обычно принимают следующую форму – «если вы отмечаете этот симптом, то назначьте вот то лекарство». Однако такая форма написания книги немедленно бы исказила основной принцип гомеопатии, сущность которого заключается в назначении такого гомеопатического средства, которое соответствует картине симптомов данного индивидуума; поскольку картина симптомов уникальна у каждого живого существа, то, следовательно, лечение также должно быть уникальным. Препятствие заключалось как раз в том, что ни в книге, ни в многотомном руководстве невозможно учесть множество индивидуальных оттенков различных симптомов. Тогда содержание всех глав, посвященных лечению, было бы сведено к абсолютно правильной, но единственной фразе: «См. описание гомеопатических средств». Необходимо было найти некую компромиссную форму, которая позволила бы изложить основные принципы гомеопатии и в то же время способствовала бы правильному практическому применению гомеопатических средств у животных в домашних условиях.

Второе значительное препятствие – необходимость в доступной форме изложить гомеопатическое понятие сущности болезни и метод интерпретации полученных результатов лечения. Гомеопаты оценивают эффективность лечения по намного

более жестким стандартам, чем врачи-аллопаты. Например, в аллопатии исчезновение или ослабление симптомов иногда считается признаком излечения, однако при этом часто не учитываются такие важные факторы, как общее состояние пациента. Кроме того, в рамках аллопатической медицины возникновение одной болезни у пациента вскоре после другой болезни обычно рассматривается как последовательность совершенно не связанных между собой событий. В гомеопатии же в отличие от аллопатической медицины при оценке результатов лечения подлежат рассмотрению *все* симптомы, которые выявляются у данного пациента; заболевание считается полностью излеченным только тогда, когда произошло улучшение всех аспектов состояния пациента, учитывая и крайне важное состояние психоэмоциональной сферы. С точки зрения гомеопатии исчезновение некоторых симптомов без улучшения общего состояния никак нельзя трактовать как излечение – скорее это следует рассматривать как ухудшение течения болезни.

Применение гомеопатического метода лечения без учета основных «базовых» принципов гомеопатии поможет не больше чем конвенциональная медицина, причем единственным достоинством такого «лечения» будет полное отсутствие токсических эффектов. Тем не менее это не означает, что назначение гомеопатических средств без учета принципов гомеопатии лишено всякого вредного воздействия на организм. Вопреки распространенному мнению о безвредности гомеопатии я хотел бы подчеркнуть, что при неправильном назначении средства возможны и некоторые побочные эффекты, однако по сравнению с традиционными лекарствами их вредное воздействие минимально. Гомеопатия действительно наиболее безопасный метод лечения, однако лечением длительных упорных хронических заболеваний должен заниматься только профессиональный гомеопат.

Решение проблемы не в том, чтобы заменить аллопатические лекарства относительно безвредными гомеопатическими средствами – дело в том, чтобы коренным образом изменить метод выбора средства для лечения. С греческого языка «гомеопатия» переводится как «подобный болезни»; это означает, что симптомы средства, которое выбирается для лечения болезни, должны соответствовать симптомам этой болезни – в

этом случае гомеопатическое средство будет стимулировать собственные силы организма для излечения. «Аллопатия» же переводится с греческого как «противоположный болезни»; в этом случае лекарство подавляет естественные силы организма в борьбе с болезнью. Если же мы просто будем использовать гомеопатические средства по той же методике, что и аллопатические, т. е. если мы будем лечить болезнь в организме, а не организм, «охваченный» болезнью, то мы столкнемся с теми же самыми последствиями, что и при применении аллопатических лекарств. (Строго говоря, гомеопатическое средство – это не просто особым образом приготовленное лекарство. Это лекарство становится истинным гомеопатическим средством только тогда, когда правильно назначается.) Одна из проблем назначения комплексных гомеопатических препаратов для лечения тяжелых заболеваний как раз и заключается в том, что при назначении этих средств не учитываются основные гомеопатические принципы – именно поэтому при назначении комплексных лекарств чаще всего получаются недостаточно удовлетворительные результаты лечения, хотя и может быть кратковременное улучшение. Комплексное гомеопатическое средство может помочь только в тех достаточно редких случаях, когда не удастся определить правильное подобное средство. Мне известен по крайней мере один случай, когда настойчивое назначение комплексных средств едва не привело к развитию почечной недостаточности у собаки с явлениями артрита¹. Однако такая ситуация встречается чрезвычайно редко, поэтому в общем не следует бояться назначать гомеопатические лекарства. Если же после назначения средства вы не видите своевременного улучшения, то не следует назначать этот препарат повторно; кроме этого вам всегда следует обращаться за ветеринарной помощью, если вы не отмечаете должного эффекта. Об этом достаточно сложном моменте гомеопатического лечения мы подробно поговорим в первой части книги.

Замена аллопатического лечения гомеопатическим неизбежно приводит к глубоким фундаментальным изменениям в оценке сущности не только состояний здоровья и болезни, но и в понимании сущности самой жизни. В начале подобные трансформации воспринимаются с трудом, но постепенно, шаг за шагом человек усваивает новые понятия и начинает по-другому

му смотреть на мир. Я убежден в разумности всех принципов гомеопатии; постепенно и к вам придет новое понимание некоторых основных понятий, и тогда *прежние* концепции вам тоже покажутся неестественными.

Я надеюсь, что моя книга поможет вам изменить свое мышление и уяснить основные положения гомеопатии. Я постараюсь на страницах книги объяснить сущность здоровья и болезни с точки зрения гомеопатии так, что вам станут понятны истоки болезни вашего питомца. Я также постараюсь наглядно показать, как со временем меняется «лицо» болезни, ее внешние проявления; вы увидите, что все симптомы болезни у одного индивидуума (неважно, двуногого или четвероногого) тесно взаимосвязаны. В отличие от гомеопатии конвенциональная медицина считает, что человек с течением времени поражается различными, не связанными друг с другом болезнями. Полученная информация не только поможет вам справиться с несложными заболеваниями ваших питомцев, но и будет способствовать развитию вашей наблюдательности и умению отличать индивидуальные особенности каждого организма. Кроме того, надеюсь, что вам станет понятна сущность ответной реакции организма на лечение (причем не только на гомеопатическое, но и на любое другое) – это поможет вам адекватно оценивать изменение симптомов у вашего питомца и не пропустить тот момент, когда ему может понадобиться экстренная помощь.

Книга разделена на пять основных частей. *Первая часть* посвящена основным положениям гомеопатической теории здоровья и болезни. Во *второй части* представлено гомеопатическое лечение наиболее специфичных состояний. В *третьей части* приводится информация по вакцинации, столь распространенной в настоящее время. По моему убеждению, вакцинация не только не предупреждает болезни, но и сама часто является причиной развития некоторых патологических состояний организма. В *четвертой части* книги помещены описания наиболее распространенных гомеопатических средств. В последней части я поместил дополнительную информацию и словарь специальных терминов. В тексте книги я старался по возможности точно объяснить новые понятия, однако словарь поможет вам в тех случаях, когда значение того или иного термина все же остается не совсем ясным.

Как уже говорилось, вторая часть книги представляет собой нечто вроде компромисса между классическим изложением гомеопатического лечения и практическим применением гомеопатии в домашних условиях. Тем не менее я старался развить у своих читателей «гомеопатическое» мышление, чтобы ваш выбор средства для лечения стал обдуманым, а не сводился к простому перелистыванию описаний средств в поисках наиболее (как вам кажется) подходящего средства. Мне хотелось бы вам настоятельно порекомендовать не пропускать первую часть книги и не переходить сразу к чтению тех глав, которые посвящены лечению отдельных заболеваний, хотя, конечно, вы вольны так поступить. Если вы достаточно хорошо разберетесь в основных положениях и принципах гомеопатии, то ваши возможности правильного выбора средств и успешного лечения вашего питомца значительно возрастут. Это непременно окажет свое влияние на уровень вашего общения с ветеринаром или ветеринаром-гомеопатом в тех случаях, когда вашему питомцу потребуется помощь специалиста.

Если же вы не отмечаете быстрой ответной реакции на назначенное вами гомеопатическое лечение, то в таких случаях я настоятельно рекомендую вам обращаться к ветеринару. Основанием для обращения за консультацией может быть не только очевидная тяжесть состояния вашего питомца, но и любое серьезное нарушение здоровья. Тем не менее вы, безусловно, имеете полное право участвовать в принятии решения относительно метода лечения вашего питомца – поэтому будьте настойчивы и задавайте ветеринару вопросы до тех пор, пока ситуация не станет для вас предельно ясной. Если у вас остаются какие-то сомнения относительно диагноза или целесообразности предложенного метода лечения, то непременно проконсультируйтесь у другого специалиста, у ветеринара-гомеопата или у «человеческого» гомеопата, выслушав альтернативные предложения.

Не следует, однако, переходить в другую крайность, отвергая полностью методы лечения традиционной медицины. Несомненно, что именно эти методы необходимы в *экстренных ситуациях*, которые представляют собой *реальную угрозу жизни домашних животных*. К сожалению, в обычной практике те сильнодействующие лекарства, которые логично было бы оставить для лечения неотложных состояний (например,

стероиды и антибиотики), «лихо» прописываются даже тогда, когда в этом просто нет необходимости. Применяйте эти лекарства только тогда, когда без них совершенно невозможно обойтись. У всех живых существ есть удивительная способность к восстановлению здоровья своими собственными силами – если только предоставить им эту возможность. Если бы это было не так, то все живые существа давно бы уже вымерли.

Мне бы хотелось сказать несколько слов и об этической стороне вопроса. Я считаю своим призванием не только лечение, но и защиту прав животных – этих удивительных созданий, которые населяют нашу землю, живут в наших домах и сопровождают нас в той длинной дороге, которая называется жизнь. Я абсолютно убежден, что и животные (домашние и дикие), и растения имеют свои права *независимо от того, приносят ли они пользу людям или нет*. Я убежден, что жизнь каждого живого существа одинаково ценна; по крайней мере я не знаю того метода, который позволил бы определить относительную ценность жизни различных живых существ. Я не думаю, что человеку дано право определять ценность жизни того или иного живого существа.

Животные на земле существуют рядом с нами вовсе не для того, чтобы приносить нам пользу. Они имеют точно такое же право на существование, как и мы. Поэтому я не считаю возможным употреблять термины «хозяин, владелец» животных, хотя в рамках нашей культуры именно так принято говорить о людях, у которых в доме живут кошки, собаки или другие животные. Я предпочитаю называть таких людей «опекуны», а домашних животных называть «питомцы», хотя термин «домашние животные» тоже не лишен смысла.

Из этих соображений я всегда был непримиримым противником исследований и опытов на животных. Для меня совершенно неприемлемым является жестокое обращение с животными ради спасения жизни человека – так или иначе это некому нас научит. Я также не могу согласиться с опытами на собаках ради спасения жизни других собак, или опытами на кошках ради спасения жизни других кошек. Если же мы не можем научиться путем клинических наблюдений, то мы обязаны искать другие пути к постижению истины. Конечно, все живые существа (растения тоже живые существа!) выживают

за счет жизни других живых существ — таков закон природы; однако надругательство и одинокая смерть в железной клетке относится к совсем иной категории.

Кстати, я никогда не использую в своей практике такие средства животного происхождения, как акулий хрящ или китайское средство под названием «три змеи», которое содержит в своем составе вытяжку из тел змей. Я не могу найти этические обоснования для уничтожения змей ради здоровья млекопитающих.

Я всегда был и остаюсь сторонником равноправных отношений как с домашними питомцами, так и с бездомными и дикими животными. Мы еще не осознали полностью, что это «параллельный» мир, живущий независимой от нас собственной жизнью — именно в этом и состоит мудрость природы. Приручение животных приносит обоюдную пользу обоим видам. Однако нам не следует смотреть на домашних животных как на замену их диких собратьев — это возможность нашей связи с дикой природой. Давайте не будем забывать, что мы тоже дети природы. Если мы лишимся наших корней и отсечем себя от природы, мы просто перестанем быть людьми.



ПРИНЦИПЫ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Введение в гомеопатию

История развития гомеопатии

Общее введение в гомеопатию

Краткое содержание главы I

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОМЕОПАТИИ

Высшее и единственное назначение врача состоит в том, чтобы возвращать здоровье больному – излечивать его. Идеал лечения состоит в том, чтобы восстановить здоровье больного скоро, легко и прочно или устранить и совершенно уничтожить болезнь во всем ее объеме кратчайшим, вернейшим и безвреднейшим способом на основании ясных и очевидных данных^{1*}.

Д-р Самуэль Ганеман

Единственная обязанность врача – излечение больного и его болезни как таковой, а не ее последствий².

Дж. Т. Кент

Самуэль Ганеман – основоположник гомеопатии

В сознании каждого человека гомеопатический метод лечения неразрывно связан с именем его основателя – гениального немецкого врача Самуэля Ганемана, одного из величайших мыслителей в истории медицины. Его имя по праву стоит в одном ряду с именами таких великих врачей, как Гиппократ, Парацельс и Хуанг Ди (или *Yellow Emperor*, автор свода знаний по традиционной китайской медицине «*The Yellow Emperor's Classic of Medicine*»). Это руководство было написано в третьем тысячелетии до н. э., однако им пользуются до сих пор).

Самуэль Ганеман³ родился в 1755 г. в немецком городе Мейсен в семье художника по росписи фарфора. Семья была очень бедной, но благодаря исключительным способностям юного Самуэля его освободили от платы за обучение, и он смог получить хорошее для того времени школьное образование. В возрасте двенадцати лет он не только бегло говорил по-французски и по-английски, но даже давал частные уроки греческого и латинского языков. Отец Самуэля в какой-то степени противился продолжению его образования – он считал, что Самуэлю следует побыстрее овладеть навыками какой-либо практичес-

* Здесь и далее цитируемые источники см. на стр. 665. Прим. гл. ред.

кой работы и помогать ему содержать семью. Тем не менее Ганеман-старший старался развить творческое мышление своего сына – правда, весьма своеобразным способом: давал ему теоретическую задачу, запирали в комнате, и к моменту возвращения отца с работы Самуэль должен был найти правильное решение. Этот, казалось бы, слишком суровый метод воспитания научил его справляться с проблемами концептуального характера. Всю свою жизнь Ганеман вспоминал отца с неизменным чувством безграничного уважения и восхищения.

В 1775 г. Самуэль Ганеман поступил на медицинский факультет университета. В 1779 г. он защитил диссертацию и получил диплом доктора медицины. На начальном этапе своей практической работы Ганемана чрезвычайно интересовала фармакология; кроме того, он активно продолжал изучать иностранные языки. Вскоре ему удалось стать фармакологом высокой квалификации и опубликовать несколько научных работ по фармакологии и медицине. Помимо этого он занимался переводами медицинской литературы с английского, французского, итальянского и латыни.

Способы лечения больных, которые существовали в те времена, отличались грубостью и даже определенной жестокостью. Для очищения организма от предполагаемых ядов пациентам вводили сильнодействующие лекарства, вызывающие мучительную рвоту и диарею; для удаления предполагаемого избытка крови проводилось кровопускание; при лечении кожных болезней применялось прижигание и другие не менее суровые методы. Подобная «терапия», несомненно, приносила больше вреда, чем пользы и часто приводила к смерти пациентов не столько от болезни, сколько от лечения.

Подобные методы «лечения» не могли не разочаровать Ганемана. Особенно остро бессилие медицины он ощущал тогда, когда ему приходилось лечить от тяжелых заболеваний своих собственных детей. «Для меня было мучением бродить ощупью в потемках, руководствуясь только учебниками, назначать лечение в соответствии с тем или иным общепринятым фантастическим взглядом на природу болезни, прописывать лекарства, которые всего лишь занимают определенное место в фармакопее... которые легко могут привести к смерти пациента... Мысль, что я своим лечением могу усилить страдания пациентов или даже

стать убийцей, была просто невыносимой...» — писал Ганеман. — «Чувствуя, как страдают от болезней мои дети — плоть от плоти и кровь от крови моей, я все больше упрекал себя за то, что не знаю надежного способа облегчить их мучения».

Разочарование медициной было основной причиной, по которой Ганеман решил окончательно отказаться от практической врачебной деятельности и зарабатывать на жизнь переводами и работой фармаколога. Однако именно в этот период жизни были заложены основы его будущих гениальных открытий, в чем ему немало помогла работа с текстами-оригиналами великих врачей. Эрудиция Ганемана и его высокий профессионализм позволяли ему иногда добавлять к основному тексту примечания критического характера.

Испытания и закон подобия

В 1790 г. Ганеман перевел с английского языка руководство по лекарствоведению знаменитого шотландского врача Уильяма Куллена и добавил свое примечание к статье, в которой Куллен соотносил лечебные свойства коры хинного дерева (основным компонентом которой является хинин) при малярии с ее вяжущими свойствами и горечью. Ганемана чрезвычайно заинтересовали свойства хины; он провел на себе ряд опытов, о чем и написал в примечании: «При проведении опыта я в течение нескольких дней 2 раза в день принимал по 4 глотка хинной настойки. Вначале я отметил похолодание стоп и кончиков пальцев, почувствовал вялость и сонливость; затем я почувствовал сердцебиение, пульс стал быстрым и твердым... затем началась пульсация в голове и покраснели щеки, появилась жажда... Анализируя эти симптомы, я пришел к выводу, что все они соответствуют типичной картине малярии... При повторном опыте все симптомы развивались у меня в той же самой последовательности. После прекращения приема хинной настойки я полностью выздоровел».

В сущности, Ганеману поразительным образом удалось обнаружить ключ к разгадке и пониманию свойств лекарств. Во-первых, проведенный им опыт опровергал общепринятое положение о том, что влияние хины на организм связано с такими ее свойствами, как горечь и вяжущее действие. Ганеман выявил, что воздействие коры хинного дерева на организм пред-

ставляет собой уникальное явление, которое отличается от обычного действия лекарств. Во-вторых – самое важное! – Ганеман открыл научный метод определения истинных свойств лекарства путем испытания их на здоровом человеке, который мог бы достоверно рассказать о своих ощущениях. Таким образом, Ганеман основал объективную систему изучения фармакологии, которая позволяла исследователям точно описывать воздействие лекарства на организм человека. Ганеман назвал этот метод «испытание» (нем. *Pruefung*, эквивалент в англ. яз. – «proving»^{*}).

Будучи фармакологом, С. Ганеман на практике знал метод полифармации, при котором смешивались несколько лекарственных препаратов в соответствии с их теоретически определенными свойствами с целью комбинированного воздействия на организм пациента. Он понимал, что в данном случае предсказать ответную реакцию организма невозможно и только введение единственного лекарства вне смеси с другими предоставляет реальную возможность оценить его воздействие либо при испытании, либо в процессе лечения. Ганеман всегда рекомендовал назначать одно лекарственное средство, хотя и проводил опыты с назначением нескольких препаратов, чередуя их.

В отличие от Куллена, Ганеман предположил, что именно сходство симптомов малярии и воздействия на организм *China* позволяет эффективно лечить малярию препаратами коры хинного дерева. В дальнейшем, развивая это предположение, Ганеман сделал вывод, что подобным образом действуют все лекарства: лечение какого-либо заболевания будет успешным тогда, когда действие лекарства подобно симптомам болезни. Ганеман назвал этот принцип «закон подобия».

До Ганемана подобные идеи высказывались Гиппократом и Парацельсом, который, в частности, писал: «Холодом не вылечишь “горячую болезнь”. “Холодную болезнь” не вылечишь горячим. Подобное лечится подобным»⁴. Неизвестно, был ли Ганеман знаком с этой работой; однако только Ганеману удалось развить это предположение до стройной и разумной научной концепции. Гомеопатическая система лечения существует уже около двух столетий, но сущность ее основных законов ос-

^{*} Врачи-гомеопаты часто используют этот термин в английской транскрипции – прувинг.
Прим. г.л. ред.

тается неизменной, лишь значительно увеличилось количество препаратов, которыми в настоящее время пользуются врачи-гомеопаты, и созданы компьютерные программы, благодаря которым подбор индивидуального лекарственного средства стал более точным. Но вклад великого Ганемана в развитие гомеопатической науки просто невозможно переоценить.

Сострадательное отношение к больным. Индивидуализация лечения пациентов

С именем Самуэля Ганемана связано развитие еще одной области медицины – лечение пациентов с психическими нарушениями. В то время жестокость в отношении подобных больных была скорее правилом, чем исключением. В 1796 г. Ганеман опубликовал статью об успешном лечении одного из таких пациентов и написал в примечании: «Я всегда был против телесных наказаний. Нельзя наказывать того, у кого отсутствует по причине его болезни чувство ответственности – суровое отношение не улучшит, а лишь ухудшит состояние такого пациента. Все они заслуживают сострадательного отношения»⁵. Ганеман, добрый и заботливый врач, всегда подчеркивал необходимость мягкого, деликатного лечения любых заболеваний. В начале этой главы приведены слова Ганемана, с которых начинается его основной труд «Органон врачебного искусства». Призывая к быстрому, легкому лечению с наименьшим вредом для пациента, Ганеман тем самым призывал к сострадательному отношению к пациентам независимо от того, какими заболеваниями они страдают.

Следствием участия врача в судьбе пациента является, по мнению Ганемана, необходимость индивидуализации лечения. Каждый пациент обладает уникальным набором симптомов, и, следовательно, для каждого пациента, а не для группы больных с одинаковым названием болезни необходимо подбирать индивидуальное лекарственное средство.

Испытания лекарств на здоровых людях, лечение одним индивидуально подобранным лекарственным средством, закон подобия, сострадательное отношение к пациентам, лечение больного, а не болезни – именно эти положения составляют сущность учения Самуэля Ганемана и формируют основу гоме-

опатического метода лечения.

Константин Геринг и развитие гомеопатии в США

Константин Геринг, немецкий врач и последователь Ганемана, внес существенный вклад в дальнейшее развитие гомеопатической медицины. В студенческие годы Герингу поручили написать работу, опровергающую гомеопатический метод лечения. Естественно, что ему пришлось прочесть труды Ганемана, которые его невероятно заинтересовали. Проведенные эксперименты окончательно убедили Геринга в истинности положений гомеопатии. После окончания университета в 1826 г. Геринг стал убежденным сторонником этого метода лечения. Однако в то время открыто предпочитать гомеопатический метод было достаточно сложно, так как существовала сильная оппозиция в лице представителей «старой школы» – так врачи-гомеопаты называли приверженцев ортодоксальной, традиционной медицины⁶.

Вскоре после окончания университета Геринг по заданию немецкого правительства работал в Южной Америке, принимая участие в ряде специальных исследований в области ботаники и зоологии. Тогда же Геринг провел ряд опытов с ядом змеи *Trigonocephalous lachesis*. Во многом благодаря испытаниям Геринга *Lachesis* – средство, приготовленное из яда этой змеи, – в настоящее время является одним из основных гомеопатических препаратов. (Кстати, так в греческой мифологии звали одну из трех Мойр, пресекающую нить жизни. Вполне соответствующее название для смертельно ядовитой змеи!)

После нескольких лет, проведенных в Южной Америке, Геринг поселился в Филадельфии, где жил и работал до своей кончины в 1880 г. В Филадельфии он основал Медицинский колледж Ганемана. Это учебное заведение существует до сих пор, хотя гомеопатию тамне преподают уже в течение многих лет (недавно было принято решение изменить название колледжа). Вклад Константина Геринга в развитие гомеопатической науки весьма значителен, и его имя широко известно не только в Америке, но и во всем мире.

Закон излечения Геринга

Геринг написал один из наиболее значительных трудов по гомеопатическому лекарствоведению, состоящий из десяти томов — этот труд до сих пор считается классическим. Кроме того, Геринг сформулировал один из основных законов гомеопатии, который называется «закон излечения Геринга»: «При хронических и длительно существующих заболеваниях симптомы, которые появились последними, являются наиболее важными при выборе подобного гомеопатического средства, даже если на первый взгляд они кажутся малозначимыми; старые симптомы в этом отношении менее важны... Избавление от симптомов в обратной последовательности их появления ведет к истинному стойкому исцелению»⁷.

Развивая эту концепцию, Геринг описал порядок исчезновения симптомов при излечении: изнутри кнаружи, сверху вниз, от жизненно важных органов к менее важным. Нарушение обычного порядка исчезновения симптомов у пациента, по мнению Геринга, свидетельствует о наличии какого-либо препятствия к исцелению.

Расцвет и упадок гомеопатии в XIX веке

Расцвет гомеопатической науки в США, несмотря на сильное противодействие аллопатической медицинской школы, пришелся на вторую половину XIX в. В то время в стране существовали 22 учебных заведения по подготовке врачей-гомеопатов и практиковали примерно 14 тысяч врачей, которые считали себя гомеопатами. Многие из них, строго говоря, не были классическими гомеопатами — последователями Ганемана, что впоследствии явилось одной из причин упадка гомеопатической медицины. Однако на тот момент впечатляющее количество врачей-гомеопатов отражало то важное место, которое занимал этот метод лечения в медицинском сообществе. Поразительные успехи гомеопатического метода лечения во время эпидемии холеры в конце 30-х — начале 40-х годов XIX в. и вспышки желтой лихорадки в 1878 г. способствовали тому, что общество в целом и многие врачи стали убежденными сторонниками этого метода. Однако убольшинства «новообращенных» врачей результаты лечения, как правило, были неудовлетворительными, так как они назначали гомеопатичес-

кие препараты по принципам аллопатической медицины, без глубокого анализа каждого случая и индивидуального подбора лекарства. Естественно, собственные неудачи из-за поверхностного понимания законов гомеопатии они списывали на несовершенство гомеопатического метода лечения в целом.

Новоявленные гомеопаты считали более правильным назначать низкие разведения или даже вполне «материальные» дозы гомеопатических препаратов, а не высокие разведения, о которых говорил Ганеман. Одной из причин популярности низких разведений являлось быстрое получение временного «лечебного» эффекта даже при не совсем корректном назначении. При повторном назначении низких потенций иногда удавалось достичь временного облегчения симптомов, но излечения не наступало. Однако основная причина их неудач все же заключалась в непонимании основных принципов гомеопатии, что неизбежно приводило к заведомо неправильному выбору средства для лечения. На самом же деле правильно выбранное средство будет действовать на организм независимо от разведения, неправильно выбранное – не будет действовать вообще.

Кроме того, медицинская наука базировалась на сугубо материалистических позициях, согласно которым реальна лишь физическая материя; в соответствии с этой точкой зрения все явления окружающего мира, включая мысли, разум, волю и чувства, можно объяснить с помощью физических терминов⁸. Многие врачи-материалисты в принципе не верили, что высокие потенции гомеопатических средств могут оказать на организм какое-либо влияние. Подобная разница в философской позиции привела гомеопатическое общество к противостоянию между классическими гомеопатами, которые использовали высокие разведения лекарственных средств, и «новообращенными» материалистами, которые назначали только низкие разведения. Этот конфликт крайне негативно отразился на моральном состоянии гомеопатической науки и ее положении в обществе на рубеже XIX и XX столетий.

Джеймс Кент и дальнейшее развитие гомеопатии в США

Самой яркой личностью в гомеопатической медицине США в начале XX в., бесспорно, был великий врач Джеймс Кент.

Именно ему принадлежит термин «закон излечения Геринга». Его вклад в развитие гомеопатии огромен, и влияние его идей сказывается до сих пор. Джеймс Кент является автором многочисленных руководств по теории гомеопатии и по гомеопатическому лекарствоведению (*Materia Medica*). Именно Джеймс Кент создал первый «*Реперториум*», который является основой всех современных гомеопатических справочников. Его книга «*Лекции по философии гомеопатии*» – не только одно из наиболее ярких и глубоких исследований в медицине, но и замечательное увлекательное чтение. По первоначальному замыслу Кента «*Лекции по философии гомеопатии*» предназначались в качестве приложения к «*Органону врачебного искусства*» и были написаны как дань огромного уважения к основоположнику гомеопатии С. Ганеману. Однако Кенту удалось написать такое руководство, которое по ясности и глубине понимания теории гомеопатии превосходило английские переводы «*Органона*». Врачи-гомеопаты всего мира до сих пор используют в своей практической работе «*Реперториум*» Кента, который выдержал множество переизданий. Невозможно преувеличить значение его труда «*Лекции по Materia Medica*» как источника понимания возможностей гомеопатической медицины.

В XX в. именно Джеймс Кент оказал на развитие гомеопатической медицины огромное влияние, которое можно сравнить разве что с влиянием самого С. Ганемана. Под руководством Кента выросло несколько поколений врачей-гомеопатов, которые отважно продолжали свою практическую деятельность даже в период упадка гомеопатической медицины с 20-х до 70-х годов XX в., следуя скорее велению сердца и разума, чем моде. Это было время огромных перемен в медицине, время господства материалистической школы и гонений на последователей других философских течений.

На фоне распространения материалистических идей в США обострилась борьба между сторонниками и противниками гомеопатической медицины. Сторонники традиционной медицины («старая школа») просто не могли принять точку зрения, согласно которой один гомеопатический препарат в высоком разведении может излечить заболевание. До сих пор это утверждение остается одной из основных причин противостояния аллопатической и гомеопатической медицины.

Растущее сопротивление медицинского аллопатического сообщества при финансовой поддержке крупных фармацевтических компаний и непрерывная внутренняя теоретическая борьба значительно ослабили позиции гомеопатической медицины, что привело к ограничению практики в целом ряде штатов. В 1894 г. в журнале «Life» была напечатана статья, в которой описывалось отношение к гомеопатии традиционных врачей-аллопатов: «Слово “гомеопатия” действует на обычных врачей, как красная тряпка на быка. Их ярости нет предела!»⁹. В распространении подобных идей немалая роль принадлежала Американской врачебной ассоциации, которая была создана в 1846 г. в основном для борьбы «с посягательством гомеопатии на устои медицины» (Американская гомеопатическая ассоциация была создана на два года раньше, в 1844 г.). И когда произошел внутренний раскол из-за несовпадения взглядов по ряду вопросов, оказалось, что у гомеопатического сообщества просто нет сил противостоять натиску извне и изнутри. В начале XX в. гомеопатическая медицина в США, казалось, практически исчезла¹⁰. Случилось то, что в свое время предсказал К. Геринг: «Если наша школа отойдет от истинных строгих принципов Ганемана, то мы просто исчезнем и останемся всего лишь карикатурным явлением в медицине»¹¹.

Возрождение гомеопатии в XX веке

Несмотря на фактическое исчезновение гомеопатии в США в начале XX в., в ряде европейских стран (Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды) и в некоторых странах Латинской Америки развитие гомеопатической науки продолжалось. Значительного расцвета гомеопатическая медицина достигла в Индии, где практикующие врачи-гомеопаты многое сделали для приумножения богатого теоретического наследия западных стран. Традиционная индийская культура не была настолько пронизана идеями рационализма и материализма, как культура других стран, например США. Именно поэтому гомеопатическая концепция не вызвала в Индии никакого отторжения. В настоящее время и европейская школа гомеопатии, и индийская школа вносят свой вклад в дальнейшее развитие гомеопатической теории и практики.

Возрождение гомеопатии в США началось в начале 70-х го-

дов XX в. во многом благодаря известному греческому гомеопату Дж. Витулкасу, который руководил обучением многих врачей нового поколения. Теоретические труды Дж. Витулкаса оказали огромное влияние на наше понимание гомеопатического метода лечения и способствовали возрождению в обществе интереса как к гомеопатии, так и к другим альтернативным методам лечения.

Применение гомеопатического метода для лечения животных началось практически одновременно с его использованием для лечения человека. Немецкий ветеринар *J.J. Lux* уже в начале 30-х годов XIX в. применял гомеопатические препараты для лечения животных, а с середины 30-х годов этот метод стал широко использовать немецкий ветеринар *G.A. Weber*. В начале своей деятельности *J.J. Lux* был сторонником изопатического метода лечения — побочной ветви гомеопатии. При изопатическом методе для лечения болезней используются потенцированные продукты самой болезни (т. е. гомеопатические разведения продуктов болезни). Например, потенцированная кровь коров, заболевших сибирской язвой, использовалась для лечения других животных с тем же заболеванием (см. дальше в этой главе). В большинстве случаев такое лечение было бесполезным, так как лечебным действием обладает лишь подобное гомеопатическое средство. Однако в некоторых случаях лечение изопатическим методом способствовало предупреждению ряда тяжелых заболеваний. Позднее эта концепция стала основой применения нозодов в качестве превентивных средств (см. главу 16 «Вакцинация», где изложена более подробная информация по нозодам).

Внедрение гомеопатического метода в ветеринарную практику связано в основном с именами д-ров *G. MacLeod* и *Chr. Day* в Великобритании и д-ра *Richard Pitcairn* в США. Написанные ими книги и обучение ветеринаров принципам гомеопатической терапии способствовали применению гомеопатии для лечения как крупных, так и мелких животных. Д-р *Richard Pitcairn* для развития ветеринарной гомеопатии в США сделал столько же, сколько Дж. Витулкас для развития гомеопатии «человеческой». Все мы, практикующие ветеринары, в долгу перед этими замечательными врачами — благодаря им мы сейчас имеем возможность применять этот метод для лечения животных.

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ГОМЕОПАТИЮ

Основной причиной разочарования С. Ганемана в медицине была неэффективность и крайняя жестокость методов лечения. Неприятие медицины того времени и научный склад ума побудили Ганемана искать иные пути лечения пациентов. Все эти факторы стимулировали развитие гомеопатической науки в стройную и цельную систему излечения заболеваний.

Испытания, закон подобия и понимание сущности лекарства

Внедрение в медицинскую науку испытаний лекарственных препаратов на здоровых людях явилось огромным шагом вперед. Благодаря этому методу стало возможным плодотворно и рационально изучать действие лекарственных препаратов на организм. Прежние теории действия лекарств имели в основном умозрительный характер, основываясь на таких особых свойствах препаратов, как, например, горечь или вяжущее действие, которым придавалось определенное гипотетическое значение. С помощью метода испытаний, открытого Ганеманом, появилась возможность понять и подробно описать воздействие лекарства не только на отдельные органы и системы, но и на психическую деятельность человека. Именно с помощью этого метода удалось выяснить, что болезнь никогда не ограничивается физическими изменениями и оказывает значительное влияние на психическую сферу. Дальнейшие размышления привели Ганемана к выводу, что симптомы болезни на самом деле представляют собой ее внешнее проявление, тогда как истинная сущность болезни недоступна пониманию человеческого разума. Симптомы болезни только указывают путь к соответствующему гомеопатическому средству и позволяют в какой-то степени прогнозировать течение заболевания; однако механизм развития болезни нам не дано понять.

Назначение верного гомеопатического лекарства возможно только на основании закона подобия Ганемана, согласно которому соответствующим гомеопатическим средством является то средство, которое создает в организме совокупность симптомов, подобную болезни. Каждое лекарство обладает способностью вызывать определенный комплекс симптомов в организме

живого существа; этот комплекс симптомов представляет собой лекарственную болезнь, которая стимулирует ответную исцеляющую реакцию больного организма. При испытании лекарственного средства выявляются определенные симптомы лекарственной болезни, среди которых можно выделить симптомы со стороны психики, физические симптомы и общие симптомы. Под общими симптомами понимаются симптомы со стороны организма в целом, как, например, сторона поражения тела или обстоятельства, которые улучшают/ухудшают (ослабляют/усиливают) симптомы. Например, у пациента с симптомами *Pulsatilla* отмечается тенденция к правостороннему поражению, ухудшение симптомов при пребывании в душном помещении и после принятия жирной пищи.

Определение подобного гомеопатического средства по *Materia Medica* и Реперториуму

Materia Medica представляет собой перечень гомеопатических средств и соответствующих им симптомов лекарственной болезни. Для лечения пациента из этого перечня необходимо выбрать то гомеопатическое средство, симптомы которого более других напоминают картину заболевания.

По мере возрастания количества гомеопатических лекарств появилась настоятельная потребность в специальном справочнике, с помощью которого можно было бы облегчить поиск подобного средства. Справочник-реперториум представляет собой образец альтернативного подхода к поиску лекарства. В Реперториуме к каждому симптому придается список лекарств, которые в своей картине имеют данный симптом. В обычном Реперториуме симптомы сгруппированы по разделам в соответствии с частями тела и внутри каждого раздела перечислены в алфавитном порядке. В «Реперториуме» Кента, например, первый раздел посвящен психическим симптомам, затем идет раздел «Головокружение», затем «Голова», «Орган зрения» и т. д., заканчиваясь разделом «Общее». Как и в *Materia Medica*, симптомы перечислены в основном сверху вниз начиная с головы.

Например, у вашего щенка диарея возникает всякий раз, когда он остается дома один. В «Реперториуме» Кента надо найти соответствующую рубрику (в каждой рубрике отражен ка-

кой-либо симптом): «Прямая кишка: диарея: один, когда». Данному симптому соответствует только одно средство — *Stramonium*, однако достаточно часто в рубрике перечисляется множество средств. Это не означает, что именно *Stramonium* в данном случае будет соответствующим гомеопатическим средством — для подтверждения необходимо прочесть в *Materia Medica* описание *Stramonium* и определить, соответствуют ли картине симптомов *Stramonium* другие симптомы болезни вашего щенка. Недопустимо при назначении препарата учитывать только один симптом — необходимо выявить несколько характерных симптомов и найти средство, подобное сочетанию этих симптомов. С другой стороны, симптоматика каждого гомеопатического средства необычайно многообразна, и вряд ли удастся у вашего щенка с диареей найти все известные симптомы *Stramonium*. Не обязательно у пациента будут присутствовать все симптомы подобного гомеопатического средства — однако обязательно, чтобы в картине лекарства присутствовали основные симптомы пациента. Подобным образом подбирается гомеопатическое средство при лечении любого живого существа — это наиболее существенная часть работы врача-гомеопата.

Кроме того, при выборе подобного гомеопатического средства нельзя ограничиваться только работой с Реперториумом — всегда следует изучить картину средства по *Materia Medica*, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Обычно Реперториум всего лишь указывает путь к возможному выбору. Для опытных гомеопатов Реперториум представляет собой справочник-напоминание; при четком знании картины лекарственного средства выбор средства в пределах рубрики значительно облегчается. Все дело в том, чтобы за основу выбора гомеопатического средства взять именно основной симптом. Более подробно этот вопрос рассматривается в главе 5, посвященной применению гомеопатических средств в домашних условиях (в данной книге нет специального раздела по реперторизации, поскольку в целом книга представляет собой упрощенный вариант руководства).

Таким образом, в *Materia Medica* представлена симптоматика разнообразных гомеопатических средств, выявленная при испытаниях на здоровых людях. При анализе каждого случая

заболевания необходимо выявить наиболее важный, основной симптом. Наибольшую ценность имеют необычные симптомы, так как именно за счет их возможна более четкая дифференциация между отдельными гомеопатическими средствами. Такие «странные, редкие и необычные» симптомы с большей долей вероятности приведут к выбору правильного средства. После определения основного симптома в картине болезни пациента следует изучить соответствующую рубрику в Реперториуме для определения тех гомеопатических лекарств, в картине которых присутствует данный симптом. Сравнение рубрик позволяет значительно сократить перечень препаратов, которые подлежат анализу. Затем следует прочесть описание выбранных средств в гомеопатической *Materia Medica* и окончательно определить, какое же из гомеопатических средств наиболее подобно картине симптомов пациента.

Что же такое гомеопатическое средство?

Что же собой представляет гомеопатическое средство и чем оно отличается от обычного лекарства? Следует отметить, что название «гомеопатическое средство» является наиболее распространенным. В отличие от гомеопатических средств лекарственные препараты аллопатической медицины в основном маскируют симптомы и не излечивают пациента. Это различие обусловлено особенностями воздействия гомеопатических и традиционных лекарств на организм. Действие каждого лекарства состоит из двух фаз, которые называются первичным и вторичным эффектом. Прямое воздействие лекарства на организм проявляется в виде первичного эффекта, тогда как сущностью вторичного эффекта является ответная реакция организма на прямое воздействие лекарства. В качестве примера можно рассмотреть первичное и вторичное воздействие кофеина на организм человека. Прямое воздействие кофеина заключается в стимуляции нервной системы, которое испытывают люди после чашечки утреннего кофе. Когда стимулирующее действие кофеина заканчивается, человек испытывает сонливость и, как правило, сонливость более выражена у тех, кто пил кофе, что и является проявлением вторичного эффекта.

Аллопатическое или традиционное лечение (или лечение противоположным) основано на первичном воздействии ле-

карств на организм. Например, при повышенной температуре тела, по мнению аллопатов, непременно следует назначить пациенту аспирин для ее снижения. Основой назначений аллопатической медицины является утверждение, что симптом — это и есть болезнь, с которой надо бороться. В отличие от аллопатии, гомеопатическое лечение основано на утверждении, что организм лучше нас знает, как ответить на развитие болезни; наша задача в этом случае — поддержать организм в этой борьбе с болезнью, а не сводить на нет все его усилия. Подобное гомеопатическое средство придает организму новые силы в борьбе за излечение за счет вторичного воздействия на организм.

Поскольку первичный эффект гомеопатического препарата подобен существующей в организме болезни, вторичный эффект подобен усилиям организма самому избавиться от болезни. Назначение правильно выбранного гомеопатического средства поддерживает усилия организма в борьбе с болезнью. С точки зрения гомеопатии повышение температуры тела — это не возникшая в организме болезнь, а наилучший способ избавиться от болезни. Повышение температуры тела характерно для первой стадии воспаления, сущностью которого является защитная реакция иммунной системы организма. При повышении температуры тела назначение подобного гомеопатического средства не обязательно повысит ее еще больше; однако в некоторых случаях у животных с ослабленным иммунитетом и отсутствием должной реакции на болезнь температура действительно может повыситься. Часто у больных животных не происходит активизации всех звеньев иммунитета в ответ на болезнь. Правильно выбранное гомеопатическое средство придаст организму новые силы для полноценной реакции, тем самым ускоряя излечение. Иногда после назначения подобного гомеопатического средства температура тела быстро снижается благодаря усилиям самого организма, а не вследствие прямого действия лекарства.

Потенцирование: разведение и встряхивание

В ходе исследований С. Ганеман выяснил, что вторичное воздействие лекарства наблюдается даже при назначении малых доз. Продолжая экспериментировать с уменьшением доз, Ганеман первоначально стремился лишь уменьшить сильное

воздействие грубо приготовленных лекарств. Гениальность Ганемана состоит в том, что за этими экспериментами ему удалось разглядеть потрясающий феномен. Оказалось, что по мере разведения препарата в сочетании с энергичным встряхиванием сила лекарства возрастала (вторичное действие увеличивалось, а прямое первичное действие уменьшалось). Ганеман назвал этот феномен «потенцирование»¹² — при каждом разведении получались лекарства, обладающие все большей силой воздействия (Ганеман называл этот феномен также «динамизация» из-за возрастания жизненной силы лекарства. Он отмечал в своих работах, что при динамизации «лечебная сила появлялась даже у тех субстанций, которые ни в коей мере не обладали ею в обычном виде»). Энергичное встряхивание раствора Ганеман назвал «суккуссия». Таким образом, потенцирование лекарства состоит из двух последовательных процессов — разведения и встряхивания. Парадоксальный эффект потенцирования гомеопатических средств является одной из основных причин противостояния аллопатической и гомеопатической медицины.

В отличие от гомеопатического метода аллопатический метод минимизации грубого воздействия лекарств заключался в их очищении, при этом концентрация активных составляющих возрастала, а удалению подлежали те компоненты, за счет которых развивались побочные эффекты. Этот метод способствовал созданию сильнодействующих препаратов с минимальным побочным действием, однако влияние этих препаратов на организм основано на их первичном воздействии и подавлении симптомов болезни. Можно сказать, что аллопаты преуспели в подавлении попыток организма к исцелению. С одной стороны, применение аллопатических препаратов могло бы привести к ухудшению здоровья популяции за какой-то большой отрезок времени; с другой стороны, эти препараты необходимы при развитии критических состояний организма, когда требуются экстренные меры помощи.

Гомеопатические средства потенцируются в соответствии с двумя основными шкалами — шкала сотенных разведений (С) и шкала десятичных разведений (Х). Буквы, стоящие в названии средства вслед за римскими цифрами, отражают степень разведения. При сотенном разведении «С» концентрация сред-

ства на каждом этапе уменьшается в 100 раз, при десятичном разведении «Х» – в 10 раз, при этом каждый этап сопровождается интенсивным встряхиванием.

Предположим, требуется изготовить гомеопатическое средство из поваренной соли в сотенном разведении. Для этого надо взять 1 часть соли и 99 частей жидкости (обычно смесь воды и спирта) и интенсивно встряхнуть – получится первое сотенное разведение 1С (1 часть поваренной соли и 99 частей жидкости эквивалентны 100 частям, таким образом, показатель разведения составит 100). Второе сотенное разведение 2С получится при смешивании и встряхивании 1 части полученного раствора с 99 частями жидкости, третье сотенное разведение 3С – при смешивании и встряхивании 1 части 2С и 99 частей жидкости и т. д. Таким образом, в разведении 1С содержится 1/100 часть исходной концентрации, в 2С – 1/10000 часть исходной концентрации, а в 3С – 1/1000000 часть исходной концентрации. Обычно используются разведения до 10000С – если задуматься, то такие цифры могут поразить воображение даже опытного гомеопата!

Подобным образом готовятся десятичные разведения, когда 1 часть, например, поваренной соли разводится с 9 частями воды и получается разведение 1Х и т. д. При десятичном разведении средства не обладают такой силой, как при сотенном разведении, и редко используются выше 200Х.

Если исходное средство не растворяется в воде, то первые три разведения можно приготовить, используя молочный сахар. Например, для приготовления гомеопатического средства из серы *Sulphur* 1С надозвать 1 часть серы и 99 частей молочного сахара и в течение часа растирать смесь пестиком в ступке. Для приготовления *Sulphur* 2С надо взять одну часть полученной *Sulphur* 1С и 99 частей молочного сахара и растирать в течение часа и т. д. Начиная с разведения 3С можно использовать жидкость. Таким же образом молочный сахар используется при приготовлении гомеопатических средств из растительного сырья. Иногда растительное сырье подвергается мацерации в спирте для получения «маточного раствора», из которого в дальнейшем готовят гомеопатическое средство по обычной методике.

Однажды приготовленное средство определенного разведе-

ния используется для изготовления лекарств в соответствии с рецептом врача, при этом нет необходимости каждый раз заново готовить разведение. На шарики (или пилюли) из молочного сахара наливают несколько капель смеси 87% -ного спирта и гомеопатического средства в нужном разведении, и таким образом получается флакон с лекарством, готовым для употребления.

При назначении гомеопатического средства людям обычно рекомендуется рассасывать шарики под языком. При назначении лекарства животным шарики или растворяют в небольшом количестве воды и закапывают в рот, или растирают в порошок и закладывают в рот. Для этого надо использовать ложку или крышку флакона, так как при соприкосновении с руками средство легко нейтрализуется. По этой же причине не рекомендуется смешивать гомеопатическое средство с пищей. Можно также растворить шарики с лекарством в 20% -ном спирте — именно так я поступаю при назначении гомеопатического средства кошкам или собакам.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 1

- * Для определения воздействия гомеопатического средства на организм проводятся испытания на здоровых людях, при этом отмечается развитие психических и физических симптомов.
- * Выбор средства для лечения основан на законе подобия — соответствующим будет то лекарство, которое создает транзиторную совокупность симптомов, наиболее близко напоминающую (подобную) болезни. Гомеопатическая *Materia Medica* представляет собой перечень средств с картиной симптомов. Реперториум представляет собой перечень симптомов и гомеопатических препаратов, которые содержат данный симптом как часть клинической картины (или лекарственной болезни) данного средства. Эти руководства помогают выбрать правильное лекарство, которое называется подобным.
- * Излечение обычно протекает в соответствии с законом Геринга, что особенно четко прослеживается при хронических заболеваниях. Улучшение (ослабление) симптомов происходит в определенном порядке, при этом более поздние симптомы ис-

чезают раньше других. При выздоровлении раньше исчезают более выраженные симптомы и симптомы со стороны наиболее важных органов. Выздоровление обычно идет изнутри кнаружи и сверху вниз, хотя так бывает не всегда.

- * В гомеопатии используется вторичное воздействие лекарственного средства на организм. Другими словами, излечение происходит за счет исцеляющей реакции самого организма, а не за счет прямого действия лекарства. Именно поэтому излечение имеет полноценный характер.
- * Гомеопатические средства готовятся путем потенцирования — разведения и встряхивания. Используются средства в десятичном (Х) и сотенном (С) разведениях. Чем больше разведение, тем большую энергию приобретает средство, что происходит благодаря интенсивному встряхиванию после каждого этапа разведения.
- * Гомеопатические средства в виде шариков, пилюль, таблеток или раствора вводятся непосредственно в полость рта, при этом не рекомендуется брать их руками или смешивать с пищей.

Природа болезни



Традиционная медицина
и учение рационалистов

Холистическая медицина
и эмпирическое учение

Острое заболевание в сравнении
с хроническим заболеванием

Болезнь как индивидуальное
явление

Симптомы – не болезнь,
а ее проявления

Симптомы, в сущности,
процесс исцеления

Что же такое болезнь?

Ваш здоровый питомец

Краткое содержание главы 2

Для успешного лечения необходимо четко представлять себе сущность такого понятия, как «болезнь». Чем глубже ваши знания, тем правильнее будет выбор метода лечения вашего питомца – это касается как лечения некоторых легких заболеваний в домашних условиях, так и лечения серьезных, тяжелых заболеваний, когда требуется вмешательство специалиста-ветеринара. Надеюсь, что содержание этой главы поможет вам понять, каким образом болезнь поражает организм и как идет процесс излечения.

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА И УЧЕНИЕ РАЦИОНАЛИСТОВ

Программа обучения в ветеринарном институте в конце 70-х годов предусматривала подробное изучение как патологических изменений в тканях организма, вызванных различными заболеваниями, так и внешних причин болезней (например, бактерий и вирусов). Мы изучали также и развитие ответной реакции организма на заболевание. Однако, насколько я помню, мы не рассматривали подробно такие важные категории, как процесс излечения, варианты течения различных заболеваний у отдельных представителей вида или особенности болезни в зависимости от времени ее возникновения. Многочисленные заболевания, которые могут возникать в организме, рассматривались нами как отдельные, не связанные между собой явления. В настоящее время, будучи врачом-гомеопатом, я понимаю, что различные симптомы, которые на первый взгляд кажутся проявлением разных болезней, на самом деле не что иное, как проявление одной и той же болезни (см. далее).

Почти во всех случаях причину болезни мы искали *вне организма*. Если внедрение микроорганизма в организм приводило к развитию определенного комплекса симптомов, то нам казалось, что данный микроорганизм и является единственной причиной этого симптомокомплекса. Симптомокомплекс (т. е. болезнь) получал свое название, обычно соответствующее названию микроба, и все были убеждены, что тайна возникновения болезни уже полностью раскрыта.

Например, в конце 50-х и начале 60-х годов ветеринары на-

блюдали многочисленные случаи заболеваний кошек с симптомами иммуносупрессии, анемией и увеличением количества лейкоцитов в периферической крови (лейкоцитоз отмечается при активизации иммунной системы организма). Причина подобного заболевания оставалась неясной. В 1964 г. в крови кошек с лимфосаркомой (злокачественной опухолью лимфатических узлов) шотландские исследователи обнаружили определенный вирус. Позднее другие исследователи обнаружили идентичный вирус у кошек с симптомами иммуносупрессии и нарушением лейкопоэза. Они назвали этот возбудитель «вирус кошачьей лейкемии» и заявили, что появление подобного симптомокомплекса связано с наличием данного вируса. Многие специалисты-вирусологи и сейчас убеждены в существовании подобной причинно-следственной связи. Проще говоря, считается, что все кошки, у которых доказано наличие этого вируса, больны лейкемией, однако при этом не учитывается, что у некоторых кошек с аналогичной клинической картиной не удастся выделить идентичный вирус. Более того, у некоторых кошек при сходной клинической картине выделяется совершенно другой вирус – вирус «кошачьего иммунодефицита», открытый в 1980 г.

Для традиционной медицины, включая традиционную ветеринарию, типичен именно такой взгляд на природу болезни – там, где только возможно, установить связь между заболеванием и возбудителем (бактерии, вирусы, грибки, кожные паразиты, гельминты и т. п.). Если не удастся установить инфекционную природу заболевания, то поиск другой причины проводится на самом элементарном уровне. Любая патология исследуется специальными методами (микроскопия и другие методики). Если патологические нарушения соответствуют общепринятой модели заболевания, то они и рассматриваются в качестве основной причины данного заболевания. Например, считается, что дефицит инсулина приводит к развитию сахарного диабета. В некоторых случаях вырабатывается достаточное количество инсулина – тогда «причина» болезни списывается на неспособность организма должным образом реагировать на наличие инсулина в крови.

Подобный тип доказательства типичен для философского течения, которое обычно называется рационалистическим.

Рационалисты пытаются с помощью логических рассуждений объяснить возникновение и развитие болезни в организме. Сначала выдвигается какая-либо теория относительно функции одной из систем организма, а затем под эту теорию подгоняются данные, полученные в ходе наблюдений. Основоположником такого подхода в медицине является римский врач Гален. Его гуморальная теория возникновения болезней была основана скорее на предположениях и размышлениях, чем на опытах и наблюдениях за пациентами. Влияние Галена на медицинскую науку длилось почти тысячу лет, в течение которых его идеи практически не подвергались сомнению. Даже в настоящее время многие считают его основоположником современной медицины.

Несмотря на то, что основой некоторых теорий Галена были данные опытов, в целом он полагал, что причину болезни можно понять путем абстрактных философских рассуждений.

По мнению Рене Декарта, ярого приверженца рационалистического учения, живой организм представляет собой не что иное, как механизм. По его убеждению, животные не способны испытывать боль или какие-либо виды эмоций. Крики животных при опытах по вивисекции (экспериментальные хирургические вмешательства на животных без всякого обезболивания), с его точки зрения, всего лишь отражают рефлекторную деятельность организма, а не являются признаком глубочайших страданий.

Хотелось бы считать эту точку зрения огромным заблуждением ученых средних веков, однако и в наше время находятся некоторые «исследователи», которые проводят эксперименты такого рода, подвергая невыразимым мучениям миллионы животных во всем мире. Теоретически допуская, что при опытах животные могут испытывать боль, на практике эти «ученые» просто отмахиваются от этой мысли. Более того, они обвиняют защитников животных в антропоморфизме (т. е. проекции человеческих качеств на «безддушных» животных), когда те утверждают, что животные способны в той же мере, что и человек, испытывать не только физическую боль, но и психические и психологические страдания.

Если признать, что животные способны чувствовать и выражать определенные эмоции, то подобные исследования вообще

ничем нельзя оправдать. Мировому медицинскому сообществу следует решительно осудить любого рода эксперименты на животных, в результате которых рационалистическая медицина получает материал для своего дальнейшего развития. С моральной точки зрения убийство одного живого существа ради спасения (или улучшения) жизни другого живого существа является абсолютно недопустимым.

При различного рода экспериментах, которые часто имеют своей целью очередной раз создать модель давно известной болезни, животные испытывают мучительные боли. Считается, что опыты на животных позволяют лучше понять причины возникновения болезней и найти новые методы их лечения. Рационалисты утверждают, что достаточно выявить патологические изменения в организме (например, при вскрытии трупов) и причина заболевания сразу же будет понятна. Лечение тоже сразу становится «понятным» — патологический процесс необходимо подавить. С их точки зрения, живой организм можно отремонтировать подобно машине или механизму, при этом способность организма к самостоятельным попыткам исцеления даже не принимается во внимание. При рационалистическом подходе предельно упрощается понимание сущности болезни. Поэтому сторонники холистической медицины считают рационалистическую систему взглядов несостоятельной — мы убеждены, что любой живой организм бесконечно сложнее, чем любой самый сложный механизм.

Один из исследователей-рационалистов при проведении экспериментов на кроликах совершенно случайно доказал правоту холистического подхода в медицине. Сущность эксперимента состояла в оценке эффективности различных методов лечения одной из «человеческих» болезней, смоделированной у кроликов. Было отмечено, что кролики одной группы всегда выздоравливают быстрее, чем кролики другой группы, несмотря на идентичное лечение. Озадаченный исследователь в конце концов разобрался, в чем дело: за кроликами первой группы лучше ухаживали и относились к ним с большей добротой и теплотой. Такой сравнительно более благоприятный эмоциональный фон способствовал ускорению выздоровления. Если придерживаться рационалистической точки зрения и считать живой организм просто набором механизмов, то объяснить это

явление просто невозможно.

При изучении болезней сторонники рационалистического учения делают акцент на симптомах, общих для всех пациентов, не учитывая индивидуальные особенности болезни. Например, каждый пациент, у которого выявляется симптомокомплекс в виде сахара в моче, жажды и увеличения количества мочи, рассматривается как больной сахарным диабетом. Лечение в таких случаях также стандартное: одинаковая для всех диета, инъекции инсулина или пероральные сахароснижающие препараты. Таким образом, если у человека или животного определяется набор симптомов, напоминающий стандартную модель какого-либо заболевания, то автоматически считается, что именно этим заболеванием и страдает данный человек или животное. При известном диагнозе лечение уже известно заранее и упрощается до предела: фактически все пациенты получают одинаковое лечение.

В самом начале своей работы врача-ветеринара при лечении своих четвероногих пациентов я применял методы, которые в институте преподносились нам как «наиболее эффективные и самые современные». Мне казалось, что во многих случаях лечение было правильным и я действительно помогал животным восстановить утраченное здоровье. Однако встречались ситуации, где я был бессилен. Более того — чем дольше я работал, тем чаще мне приходилось наблюдать подобные случаи. После назначения лечения в полном соответствии с традиционными методиками многие мои пациенты, казалось, начинали выздоравливать, однако вскоре этот процесс приостанавливался по неизвестной мне причине. Я чувствовал огромное разочарование, когда осознавал, что просто не имею возможности облегчить страдания несчастных созданий. Несмотря на увеличение дозы или назначение более сильных препаратов, симптомы болезни у некоторых из моих пациентов сохранялись. В конце концов я понял очень важную вещь: *все попытки противостоять проявлениям болезни заранее обречены на провал.*

Классический пример, с которым часто встречаются ветеринары, — это кошки и собаки с кожными заболеваниями. До тех пор, пока не будет назначено соответствующее лекарство, животное будет испытывать постоянный мучительный зуд. Назначение стероидных препаратов уменьшит зуд, однако при

каждом последующем назначении эффект стероидов будет выражен все меньше и меньше. Постепенно я все более четко осознал, что такие препараты дают лишь временное облегчение, но не приводят к полноценному выздоровлению.

Кожные заболевания у моих пациентов, несмотря на периоды ремиссии, прогрессировали в соответствии с классической схемой. У собак с аллергией на блошиные укусы зимой, например, отмечалась ремиссия, однако весной наблюдалось обострение сыпи с возобновлением и усилением зуда. В типичных случаях приходилось увеличивать дозы стероидных препаратов по сравнению с предыдущим годом. *Даже при отсутствии усиления кожных симптомов за зимний период аллергия у моих пациентов неуклонно прогрессировала* – следовательно, животные становились слабее по сравнению с предыдущим годом, несмотря на все попытки организма излечиться. Анализируя подобные случаи, я пришел к выводу, что с помощью традиционной медицины вообще редко удастся полностью излечить какое-либо заболевание – мы просто тянем время. Меня чрезвычайно беспокоила ограниченность моих возможностей, и я старался как мог, чтобы найти ответы на многочисленные мучившие меня вопросы.

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И ЭМПИРИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

В 1985 г. я приступил к изучению методов холистической медицины, надеясь на их действенность. Вначале я изучал акупунктуру – метод вызывал доверие и был мне знаком. Под влиянием традиционной китайской медицины – основы метода акупунктуры – у меня сформировался совершенно новый взгляд на возникновение и развитие болезни. Для китайской традиционной медицины, история которой насчитывает тысячелетия, характерно эмпирическое понимание болезни и здоровья (эмпирические системы основаны на наблюдении за пациентами и практическом применении полученных данных. Наблюдение первично, а теория вторична – в отличие от рационалистического подхода, где теория занимает первое место).

Традиционным элементом китайской культуры является

чувство огромного уважения к своим предкам. Именно поэтому китайские врачи никогда не рассматривали вскрытие умерших как метод познания болезни, в отличие от рационалистов Старого Света, которые изучали патологию конкретного организма при помощи метода аутопсии. Основой китайской медицины всегда было наблюдение за живыми организмами. Вполне естественно китайские ученые пришли к выводу, что движущей силой жизни и здоровья является некая нематериальная субстанция. (Философский вопрос известного ветеринара *Allen Shoen*: «Так что же отличает живое от неживого?») На изучении этой нематериальной субстанции, названной жизненной силой *Ци*, китайские ученые и сосредоточили свое внимание.

Концепция *Ци* является сущностью китайской медицины. Энергия *Ци* определяет жизнь, хотя ее нельзя измерить, взять в руки, выразить количественно или выделить в чистом виде. Эта невидимая сила проявляется только через свое воздействие на организм и распознается опосредованно через то, что она приводит в движение, производит и предохраняет... *Ци* порождает движение и тепло... Проявления жизненной силы неотделимы от самой жизни. Жизнь наполняет тело до тех пор, пока бьется сердце и дыхание теплое... когда сердцебиение прекращается и тело становится холодным, жизненная сила покидает тело¹.

Понятие «здоровье» не является чисто материальной категорией. Вернее, здоровье существует только тогда, когда в организме сохраняется равновесие (баланс) жизненной силы, равномерно «протекающей» по всему организму.

Мои Учителя даже высказывали мысль, что на результат лечения оказывают влияние наши намерения, наше состояние духа. Замечательная и весьма здравая идея! Не имея добрых намерений, врач может принести больше вреда, чем пользы, даже если использует правильные методы лечения. По мере изучения китайской медицины я постепенно начал осознавать, что вокруг нас не только материальный, рациональный мир — есть нечто большее, что мы не можем постичь, что лежит

за пределами наших знаний, но что, однако, является наиболее существенным и важным для понимания как картины мира в целом, так и процесса излечения в частности.

Основные положения эмпирического учения (т. е. китайской традиционной медицины и гомеопатии) во многом диаметрально противоположны основным положениям учения рационалистического. Эмпирическая медицина исходит из предположения, что полностью постичь причины болезни невозможно (например, причины возникновения злокачественных опухолей), и подобные попытки заранее обречены на неудачу — следовательно, лечение, в основе которого лежит некая гипотетическая причина, также будет неэффективным. Для эмпирической медицины существенным и несомненным является лишь то, что можно увидеть и подтвердить наблюдениями. Путем наблюдений за пациентами можно выявить также и условия, которые *способствуют* возникновению болезни, например стрессовые ситуации, пребывание на сквозняке и т. д.

Напротив, многое в рационалистической медицине основано не на данных наблюдений, а на теоретических размышлениях — свидетельством тому является постоянное изменение ее концепций и принципов лечения. Регулярно появляются и так же регулярно исчезают «новейшие и эффективные» лекарства и «новейшие и эффективные» методы лечения, оставляя за собой тысячи пациентов, здоровью которых нанесен непоправимый вред. В то же время основные концепции и принципы эмпирической медицины, как гомеопатии, так и традиционной китайской медицины, остаются неизменными вот уже в течение сотен лет.

О гомеопатическом методе лечения я впервые услышал примерно тогда, когда занялся акупунктурой. Вначале гомеопатия показалась мне запутанной и оторванной от жизни наукой, тем не менее принципы гомеопатии так заинтересовали меня, что я начал изучать ее всерьез. Полученные знания коренным образом изменили мое представление о сущности болезни и — что более важно — о сущности здоровья.

К этому моменту в моей жизни наметилось глубокое расхождение между теоретическими представлениями о природе болезней, о которых нам говорили в институте, и практическим опытом лечения пациентов. Теория и практика существовали

отдельно, вне связи друг с другом. Знания по китайской медицине и гомеопатии внесли долгожданную ясность во многие вопросы, поскольку эти знания, опираясь на наблюдения за живыми существами, имели эмпирический, а не рационалистический характер. (Я использую слово «рационалистический» в применении к традиционной медицине. Однако это не означает, что холистическая медицина менее логична и рациональна. Фактически гомеопатия как система взглядов намного логичнее аллопатии.)

На начальном этапе обучения гомеопатии на восприятие новых для меня принципов и положений постоянно оказывали влияние традиционные аллопатические взгляды. Вспоминаю, как я однажды спросил одного из моих более опытных коллег о том, какое же гомеопатическое средство следует применять при вирусной кошачьей лейкемии. Коллега ответил вопросом на вопрос: «А какие симптомы заболевания у этой кошки?». Его ответ меня сильно озадачил — мне показалось, что я достаточно четко назвал заболевание. Мне стало понятно, что я допустил какую-то оплошность. Намного позже я осознал, что название болезни — это всего лишь ярлык, ничего не говорящий о ее сущности. Имеет значение то, как болезнь проявляется у данного конкретного живого существа. *И если раньше меня учили диагностировать и лечить болезни, то сейчас я учился анализировать симптомы и лечить конкретных пациентов с проявлениями болезни.* На первый взгляд кажется, что между этими понятиями чисто семантическая разница, однако на самом деле между ними огромная дистанция.

Это утверждение четко отражает различие в рационалистическом и эмпирическом подходе к лечению. Если внимание традиционной медицины сосредоточено на болезни, то внимание холистической медицины, в том числе гомеопатии, сосредоточено на пациенте с проявлениями болезни, причем симптомы болезни отражают не столько болезнь, сколько предрасположенность к ней.

В отличие от традиционной медицины эмпирическая медицина утверждает, что различные проявления болезни в организме связаны между собой, несмотря на различие симптомов в каждом конкретном случае. Следовательно, человек, который перенес цистит, а спустя год — пневмонию, болел не двумя раз-

личными болезнями, а скорее всего это были проявления одной и той же хронической болезни (см. далее). Не бывает живых существ с одинаковыми болезнями, как не бывает одинаковых снежинок, хотя на первый взгляд между ними огромное сходство. Это представление можно применить к хроническим болезням, преобладающим в наше время. Острые заболевания, однако, в некотором роде являются исключением.

ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В СРАВНЕНИИ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Особенностью острых (в основном инфекционных) заболеваний – например, инфекций детского возраста – является сравнительное постоянство их симптомов у разных пациентов. Это явление можно объяснить тем, что основные симптомы острого заболевания связаны с воздействием на организм инфекционного агента, а не с ответной реакцией инфицированного организма. Тем не менее отмечаются некоторые индивидуальные симптомы, которые представляют собой значительную ценность при выборе правильного гомеопатического средства. Например, у всех людей, болеющих гриппом, выявляется повышенная температура тела, слабость, головная боль и т. д. Но у некоторых пациентов отмечается многократная рвота, у других – или жидкий стул, или неутолимая жажда, или полное отсутствие жажды и т. д. В целом картина острых болезней менее индивидуальна по сравнению с хроническими. Для острых болезней характерна тенденция к поражению особей молодого возраста независимо от их видовой принадлежности. Индивидуальной является восприимчивость особи к данному инфекционному агенту. У собак, например, наиболее распространенными острыми заболеваниями являются собачья чума, инфекционный гепатит и парвовирусные инфекции. У кошек чаще всего встречается панлейкопения (кошачья чума) и вирусные инфекции верхних дыхательных путей. Подобные заболевания обычно протекают быстро, однако в некоторых случаях достаточно тяжело, иногда даже представляя собой реальную угрозу для жизни пациента. Однако после исчезновения симптомов болезни пациент, как правило, полностью выз-

доравливает, при этом не возникает повторного заражения и болезнь не приобретает затяжного течения. В некоторых случаях острых заболеваний отмечаются остаточные явления, но и они обычно не прогрессируют. При хронических болезнях наблюдается совершенно иная картина (см. далее).

Характерной чертой инфекционных заболеваний является их относительная полезность, поскольку как отдельные особи, так и популяция в целом становятся более сильными за счет стимуляции иммунной системы и усиления способности к самостоятельному исцелению. Острые инфекционные заболевания способствуют отбраковке слабых особей внутри популяции (стада, стаи, прайда), что повышает способность популяции и вида в целом к выживаемости. С этой точки зрения вакцинация, возможно, противодействует естественному процессу отбора (см. гл. 16 «Вакцинация»).

Хотелось бы привести две цитаты из трудов врачей-эмпириков, которые позволяют более полно понять отличия острых и хронических болезней. Дж.Т. Кент, известный врач-гомеопат, дифференцирует эти две категории болезней следующим образом:

«Острый миазм — это миазм, который в строгой очередности проходит все стадии, начиная с продромального или инкубационного периода (длинного или короткого), затем период разгара и затем период затухания, в котором можно проследить признаки излечения. Хронический миазм — это миазм, у которого есть продромальный период, период разгара и нет периода затухания; он заканчивается только со смертью пациента»².

Philip Incao, современный врач-антропософист, говорит об этом проще: «Острая болезнь — это пламя, которое ярко горит вначале, затем догорает и гаснет. Хроническая болезнь — это тлеющий огонь; он продолжает тлеть и никогда не гаснет»³ (курсив автора).

В понятие «хроническая болезнь» включаются все типы заболеваний, за исключением острых инфекционных болезней. В сущности, хроническая болезнь — это не что иное, как неспо-

способность организма (или его иммунной системы) излечиться от какой-либо болезни. Пациент с хроническим недугом никогда не выздоравливает полностью, и его состояние лишь ухудшается. Постепенное ухудшение здоровья, которое обычно ассоциируется с возрастными изменениями, на самом деле представляет собой прогресс болезни пациента. Здоровый индивидум остается относительно сильным всю свою жизнь; быстрое ухудшение здоровья отмечается незадолго до смерти.

К категории хронических болезней относятся почти все болезни взрослого организма (а также значительная часть болезней подросткового возраста), в том числе такие синдромы, как гипо- и гипертиреозидизм, кожные заболевания (включая аллергический дерматит после укусов блох), диабет, злокачественные опухоли, болезнь воспаленного кишечника, артриты, волчанка – короче говоря, огромное количество болезней. Многочисленные диагнозы у больного не означают, что пациент болеет множеством болезней – можно предполагать, что это различные проявления одной и той же болезни.

Только *одна болезнь* может «поселиться» в организме – одна, но на всю жизнь. Эта болезнь не что иное, как неспособность организма справиться с физическими или психическими стрессами, что приводит к существенному ослаблению организма, точнее, к ослаблению жизненной силы.

БОЛЕЗНЬ КАК ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

«Изменчивость – строительный материал эволюции. Это не случайное отклонение от нормы, а основное свойство природы. Изменчивость – основа всего сущего, постоянство же иллюзорно. Биологический вид представляет собой группу особей с минимальной изменчивостью»

*Steven Jay Gould*⁴

Биолог-эволюционист *Steven Jay Gould* посвятил свою жизнь изучению представителей различных видов животных, и его выводы совпадают с мнением врачей-гомеопатов о том, что каждая особь данного вида отличается от других особей того же

вида. В соответствии с этим утверждением лечение каждой особи одного вида также должно быть индивидуальным.

Если даже здоровые особи одного вида отличаются друг от друга, то можно предположить, что их реакция на заболевание также будет разной и будет зависеть от того, где и как выявится «слабое место» в организме. Невозможно представить себе двух особей одного вида с совершенно одинаковыми «дефектами» в организме, хотя в рамках одного вида может наблюдаться некоторое сходство. Поэтому, например, двое людей могут иметь одинаковые диагнозы в рамках традиционной медицины, но клиническая картина их заболеваний будет разной.

В качестве иллюстрации рассмотрим симптомы гипертиреозидизма (гиперфункции щитовидной железы) у трех кошек. С точки зрения традиционной медицины, симптомы их заболевания абсолютно одинаковы, как видно из *табл. 1*.

George	Lenai	E.C.
Повышен уровень тиреоидных гормонов (Т4 - 17,4)	Повышен уровень тиреоидных гормонов (Т4 - 13,2)	Повышен уровень тиреоидных гормонов (Т4 - 14,5)
Тахикардия и беспокойство	Тахикардия и сердцебиение	Тахикардия и сердцебиение
Истощение	Истощение	Потеря веса
Рвота, диарея	Рвота	Рвота

Однако при более подробном рассмотрении симптомы заболевания у них значительно отличаются, как показано в *табл. 2*.

George	Lenai	E.C.
Легко перегревается, уши горячие	Зябкий, спит под горячей плитой	Нет температурных предпочтений
Злобный, сердитый	Требуем внимания	Предпочитает одиночество
Зеваем, задыхается	Сухая шерсть, жажда	Запор
Привередлив в еде	Воспаление печени	Часто возникают абсцессы
Задыхается, респираторный дистресс-синдром	Когда встает, начинают отходить газы	Лижет камни, стены, свою подстилку

Судя по симптомам, представленным в *табл. 1*, у всех трех кошек одна и та же болезнь. Однако, если внимательно проанализировать симптомы из *табл. 2*, то напрашивается совсем другой вывод – у всех трех кошек болезни разные, но отмечается сходство некоторых симптомов.

СИМПТОМЫ – НЕ БОЛЕЗНЬ, А ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

Тем не менее *комплекс симптомов – это не болезнь*, а лишь ее видимое отображение. В действительности болезнь невидима и загадочна. Принимая за основу различные идеи и предположения, мы можем только размышлять о ее сущности подобно тому, как, например, можно размышлять о силе гравитации. Невозможно увидеть силу гравитации, но можно изучать ее проявления в материальном мире, пытаюсь понять ее сущность. Изучая ответную реакцию организма на болезнь, мы аналогичным образом пытаемся понять сущность таких явлений, как болезнь и здоровье. Падение яблока на голову Ньютона – это не сила гравитации; оно только указывает на существование этой силы. Точно так же диарея – это не болезнь, а проявление болезни.

Понятие «симптом» означает «состояние, которое появляется вследствие болезни, сопровождает болезнь и служит доказательством наличия болезни»⁵.

В этом определении симптома подразумевается наличие глубоко скрытой силы. В отличие от гомеопатии традиционная медицина сосредоточивает внимание на поверхностных явлениях (т. е. на симптомах) и стремится к их минимизации, действуя по принципу противоположности. В результате при аллопатическом подходе к лечению истинная болезнь маскируется, что позволяет ей в дальнейшем развиваться скрыто, без внешних проявлений. Нечто подобное происходит при лечении аллергического дерматита стероидными препаратами. В отличие от аллопатического подхода целью гомеопатического лечения является излечение и полная ликвидация аллергии, а не просто уменьшение ее симптомов.

Механистический взгляд на сущность болезни, свойственный аллопатической медицине, приводит к отождествлению понятий «симптом» и «болезнь». Таким образом, для аллопатов единственной целью лечения является устранение симптомов болезни, что, как им кажется, означает устранение самой болезни. Считается, например, что назначение антибиотиков при цистите приводит к излечению; что после удаления опухоли наступает полное излечение организма и т. п.

Но можно ли излечить организм от опухоли путем ее удаления? Современные исследования показывают, что в крови больных злокачественными новообразованиями присутствует некая специфическая субстанция, причем удаление опухоли не влияет на ее уровень. Таким образом, подтверждается то, что доказано учеными-эмпириками сотни лет назад: *физические симптомы — не болезнь, а указание на наличие болезни.*

СИМПТОМЫ, В СУЩНОСТИ, ПРОЦЕСС ИСЦЕЛЕНИЯ

Симптомы не являются болезнью — на самом деле это отражение процесса исцеления и попыток организма самостоятельно избавиться от болезни. Например, лихорадочная реакция при некоторых заболеваниях представляется вполне логичной

и оправданной, так как при повышении температуры тела условия выживания бактерий и вирусов ухудшаются. При снижении повышенной температуры тела при помощи лекарств состояние животного через какое-то время улучшается, однако в то же время подавляется деятельность иммунной системы, что может привести в дальнейшем к ухудшению состояния в целом. Ярким примером подобной реакции является развитие синдрома *Reye* у некоторых детей, которым при гриппе назначали аспирин для снижения температуры. С точки зрения аллопатии данный синдром представляет собой побочный эффект приема аспирина; однако гомеопаты расценивают синдром *Reye* как явление супрессии, т. е. подавления попыток организма к самостоятельному исцелению (см. гл. 3 «Природа излечения»).

Можно привести еще один аналогичный пример. По мнению врачей-гомеопатов, диарея и другие выделения организма представляют собой способы, при помощи которых организм стремится освободиться от токсинов и/или микроорганизмов. Следовательно, диарея является скорее составной частью процесса излечения, а не составной частью болезни. При пищевом отравлении, например, бактерии или бактериальные токсины попадают в организм вместе с испорченной пищей. Вполне естественно, что при помощи рвоты и жидкого стула организм старается освободить желудочно-кишечный тракт от подобных токсичных субстанций. А назначение лекарств, подавляющих эти процессы, будет препятствовать излечению.

Несколько лет назад мне пришлось лечить щенка с выраженными признаками парвовирусной инфекции (тяжелая вирусная кишечная инфекция). У него уже заканчивалась фаза разгара болезни – рвота прекратилась, он понемногу пил воду и бульон. В целом его состояние начало улучшаться, хотя оставался достаточно частый жидкий стул. Для уменьшения диареи я назначил ему лomotил, однако через пару часов его состояние резко ухудшилось. Только потом я осознал, что назначение этого препарата привело к подавлению способности организма к удалению микробов и их токсинов из желудочно-кишечного тракта. Токсины, оставаясь в кишечнике, начали проникать в кровоток через поврежденную слизистую оболочку, что в итоге привело к резкому ухудшению состояния. Тогда

я отчетливо понял потенциальную угрозу лечения «по противоположности» — основы аллопатической медицины.

Назначение лекарств «от простуды» дает такой же эффект: пациент будет чувствовать себя лучше, но заболевание продлится в два раза дольше. Во всех случаях, когда лекарства видоизменяют ответную реакцию на болезнь (т. е. симптомы), существует реальная возможность ухудшения течения болезни.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ?

Если симптомы — это не болезнь, а ее отражение в организме, то что же тогда представляет собою болезнь? С точки зрения гомеопатии нарушение функции — т. е. то, что называется «болезнь» — начинается на префизическом уровне. Такое понимание сущности болезни гораздо ближе к психосоматической теории, чем к теории механистической. По мнению Ганемана, «...при отсутствии болезни жизненная сила одухотворяет физическое... тело, безраздельно властвуя в нем»⁶. Таким образом, основой болезни является нарушение жизненной силы или духовной сущности организма. С этого глубокого «базового» префизического уровня болезнь может прогрессировать (ухудшиться) до психоэмоционального уровня и затем до уровня физического. Жизненная сила, подобно энергии Ци, представляет собой скорее концепцию, чем нечто конкретное. Болезнь, так же как и жизненную силу, невозможно исследовать экспериментальным путем, однако эта концепция помогает понять сущность и природу болезни.

Что же это означает? Постараюсь объяснить концепцию болезни на примере заболевания гриппом, поскольку подобный личный опыт есть практически у всех. Постарайтесь вспомнить — наверняка у вас, как и у других людей, заболевание начиналось исподволь и развивалось постепенно, а не возникло в одно мгновение.

С точки зрения гомеопатии на начальной стадии заболевания поражается жизненная сила. Нарушение собственно жизненной силы ощутить невозможно; как правило, первым признаком заболевания является чувство непонятного дискомфорта. При переходе болезни на ментальный уровень это ощу-

щение усиливается, но вначале психическое состояние не изменяется. В дальнейшем по мере прогрессирования болезни, начинают развиваться симптомы со стороны эмоциональной сферы, причем они всегда заметнее у других, чем у самого себя. Предвестником тяжелого течения болезни может быть страх смерти, однако на самом деле грипп редко приводит к подобному исходу. Возможно появление раздражительности, тоже более заметной у других. На этой стадии болезнь проявляется симптомами со стороны эмоциональной сферы (страх) и поведения (раздражительность), хотя внешне человек может и не выглядеть больным. Переход болезни с психического уровня на физический также протекает различно — у некоторых пациентов подобная стадийность проявляется очень четко, а у других симптомы обоих уровней проявляются одновременно. В какой-то момент начинают появляться физические симптомы (недомогание, повышение температуры, рвота, боли в горле, мышечные боли и т. д.) — в тот момент и становится ясно, что ощущение дискомфорта было не чем иным, как предвестником заболевания.

Как же происходит развитие заболевания у животных? Много раз ко мне на прием приводили пациентов без каких-либо конкретных проявлений болезни, но с неопределенными нарушениями поведения — «он ведет себя как-то не так, как обычно». При осмотре пациентов на этой стадии заболевания обычно не выявлялось каких-либо патологических изменений, да и анализ крови тоже был нормальный. Казалось, что у четвероногого пациента все было в порядке. Однако, к моему огромному сожалению, через пару месяцев этих же животных приводили ко мне уже с проявлениями серьезных заболеваний (чаще всего с признаками злокачественной опухоли). Как у людей, так и у животных на доклинической стадии болезнь невозможно определить даже с помощью самых сложных методов обследования, поскольку на этой стадии болезнь существует на префизическом уровне.

К счастью, на ранней стадии болезни выявляется множество симптомов. Анализ этих ранних симптомов помогает понять, каким образом развивается ответная реакция организма на болезнь. Как только болезнь затрагивает физический уровень, проявления жизненной силы стараются минимизировать

вред, который болезнь наносит организму. Сущность этих проявлений заключается в том, что наименее важные органы и периферические отделы различных систем организма стараются «сдерживать» болезнь как можно дольше, препятствуя ее дальнейшему развитию. Кроме того, функциональные нарушения отдельных систем возникают гораздо раньше и легче, чем нарушения анатомические. Ответная реакция организма на болезнь заключается в *активизации нормальных физиологических процессов в организме* — таких, как повышение температуры тела, появление выделений (рвота, диарея, образование слизи) или даже появление судорог. При некоторых болезнях ответная реакция организма проявляется в изменении структуры тканей и органов — например, возникает уплотнение кишечной стенки при воспалении, появляются кальцинаты суставной сумки при артрите или формируется опухоль. При развитии анатомических изменений в тканях и при их восстановлении затрачивается большое количество энергии, поэтому процесс обратного развития анатомических изменений сложнее и протекает намного дольше, чем процесс обратного развития функциональных нарушений.

Первые признаки болезни у молодых и относительно здоровых животных имеют обычно функциональный характер и проявляются в виде повышения температуры тела или выделений. Подобным образом — обычно в виде повышения температуры, выделений из носа и диареи — проявляются первые признаки болезни и у детей. Чем больше жизненной силы, тем резче выражены функциональные симптомы в ответ на болезнетворное влияние (термин «болезнетворное влияние» означает интенсивность и выраженность болезненных проявлений в организме). Именно поэтому как у детей, так и у животных молодого возраста в начале заболевания отмечается резкий подъем температуры. Назначение аспирина для снижения температуры подавляет жизненную силу и вынуждает ее отступить на более глубокий уровень — именно так с точки зрения гомеопатии можно объяснить возникновение синдрома *Reye* у детей.

Устойчивость функциональных симптомов фактически является признаком здоровья. Чем дольше организм использует функциональные симптомы для излечения, тем быстрее он из-

бавится от болезни. У особей с недостатком жизненной силы (т. е. слабой иммунной системой) снижена толерантность к повышению температуры тела – в этом случае будут преобладать анатомические изменения, с помощью которых организм будет стараться «поглотить» болезнетворное влияние.

За счет патологических изменений в структуре тканей жизненная сила организма старается локализовать болезнь и ограничить ее распространение менее важными органами. Именно по этой причине столь часто встречается поражение кожного покрова. Поражение какой-либо части кожного покрова обычно не оказывает особого влияния на выполнение его основных функций. Как только у кошек или собак болезнь переходит с функционального уровня на анатомический или усиливается болезнетворное влияние, это немедленно отражается на состоянии кожи. Кожа способна поглотить значительную часть «болезнетворного» влияния. Однако с психологической точки зрения это очень трудный момент – наблюдать, как ваш питомец постоянно чешется, одолеваемый сильным зудом.

Лекарственное подавление кожных симптомов может привести к перемещению болезни на более глубокий уровень, если жизненная сила вновь не выведет болезнь на кожу после отмены препарата. На следующем примере можно достаточно четко проследить путь развития болезни. Хотя подобное обилие симптомов наблюдается нечасто, все же этот случай не такой уж необычный, как может показаться на первый взгляд.

Семилетнего пуделя по кличке Макс привели ко мне на прием из-за многочисленных проблем со здоровьем. В семье, где он жил, делали для него все что могли, однако Макс не вылезал из болезней. До обращения ко мне Макс по назначению ветеринара провели все необходимые диагностические и лечебные мероприятия, но его состояние не улучшилось. Наверное, для традиционного ветеринара этот случай показался совершенно непонятным. Анализ симптомов, которые наблюдались у Макса в течение всей жизни, явно указывал на неуклонный прогресс заболевания. В щенячьем возрасте ему сделали весь стандартный набор прививок. В возрасте пяти месяцев у него отмечались признаки отита и легкий бронхит, однако, несмотря на это, ему провели вакцинацию против бешенства. Через три недели после вакцинации у Макса появилась сыпь на коже. Пос-

ле лечения антибиотиками сыпь исчезла, но спустя три месяца появилась вновь. Макссу назначили еще один курс более сильных антибиотиков. В течение последующих двух лет ему постоянно назначали различные лекарства и мыли специальным лечебным шампунем, но несмотря на все принятые меры, сыпь никогда не исчезала полностью. Ему по-прежнему проводили все необходимые прививки в соответствии со стандартным графиком.

Первый раз приступ судорог у Макса случился в возрасте 2,5 лет. В течение последующих двух лет приступы судорог периодически повторялись — именно поэтому в возрасте 4,5 лет Макссу назначили фенobarбитал. Через 12 дней после первого приема фенobarбитала у Макса появились симптомы острого панкреатита, которые периодически повторялись в течение нескольких последующих месяцев. Примерно в это же время Макссу провели очередную вакцинацию, через две недели после которой у собаки развился сильнейший бронхит. В возрасте шести лет у Макса выявили гипотиреоз и назначили гормоны щитовидной железы. Через два месяца после начала приема гормонов Макссу провели санацию зубов под общим наркозом, после чего у него развилась слабость задних конечностей и шеи. Несмотря на все имеющиеся нарушения, ему опять провели очередную вакцинацию, после которой у Макса случился приступ сильнейших судорог.

Анализируя этот случай, можно выявить следующую закономерность: прогресс его болезни сочетался с ее миграцией от одного органа к другому. Вначале поражались менее важные органы; затем по мере прогрессирования болезни началось постепенное вовлечение в процесс более важных органов, причем интенсивность симптомов неуклонно нарастала. Подобная закономерность уже давно была отмечена врачами-эмпириками. Типичный порядок вовлечения внутренних органов в патологический процесс следующий (возможна некоторая вариабельность): (1) — кожа, уши, нос, глаза, ротовая полость; (2) — желудок, кишечник, мочевой пузырь; (3) — железы внутренней секреции (поджелудочная железа, щитовидная железа, надпочечники, репродуктивная система, гипофиз) и легкие; (4) — печень и почки; (5) — сердце и головной мозг. Внутри одной системы болезней часто перемещается снаружи внутрь, от поверхност-

тно расположенных органов к глубоко расположенным. Например, заболевание мочевого пузыря может привести к заболеванию почек; воспаление слизистой оболочки носа и синусов может повлечь за собой развитие астмы или другие заболеваний легких. Возможны и иные взаимоотношения – например, при подавлении воспалительных заболеваний уха антибиотиками и стероидами могут развиваться вначале функциональные, затем органические нарушения головного мозга.

У пуделя Макса болезнь развивалась следующим образом: вначале появились поверхностные, относительно безобидные симптомы со стороны кожи, которые усугублялись по мере развития болезни. Попытка лекарственного подавления кожных проявлений закончилась тем, что болезнь устремилась внутрь – это и привело в дальнейшем к развитию судорожных припадков. Странно, но легкие судорожные припадки не сопровождаются органическими изменениями со стороны нервной системы и относятся к функциональным нарушениям. Назначенный собаке фенobarбитал подавил такую важную способность организма, как использование судорожного приступа для «удаления» болезнетворного влияния. Болезнь избрала другой выход в виде приступов панкреатита. На этом этапе болезни начались органические изменения, которые представляли собой потенциальную угрозу для жизни. В то же время у Макса появились признаки поражения щитовидной железы и легких, что в целом соответствовало третьему уровню развития болезни. После приема гормонов и стресса, связанного с общим наркозом, уровень поражения углубился – на это указывала слабость мышц шеи и задних конечностей и, кроме того, сильнейший судорожный припадок. Можно предположить, что на этом этапе болезнь затронула жизненно важные органы – головной и спинной мозг.

По мере ухудшения состояния здоровья собаки количество симптомов у Макса возрастало, поскольку возможности организма по «поглощению» болезнетворного влияния в какой-либо одной области не безграничны. С точки зрения гомеопатии лечение, основанное на подавлении симптомов (т. е. на подавлении попыток организма к излечению), способствует ухудшению состояния. На прием к ветеринару часто приводят животных с массой аллопатических диагнозов – гипотиреоз,

почечная или печеночная недостаточность, эпилепсия и т. д. В подобных случаях независимо от возраста животного можно сделать вывод о недостатке у них жизненной силы, что и приводит к развитию ряда тяжелых заболеваний.

Вообразите себе такую картину — полноводная река и город на берегу. Весной начинается наводнение, и жители, естественно, укрепляют берега реки для защиты своих домов, полей и всего города. Если уровень воды в реке продолжает подниматься и вода заливают прибрежный район, то жители эвакуируются и бросают все силы на защиту центра города, где расположено большинство домов и учреждений. Если защитные сооружения не в состоянии дальше противостоять стихии, то рано или поздно наступает их прорыв, обычно в нескольких участках. Эти многочисленные прорывы защиты подобны множеству симптомов, которые наблюдаются у старых или больных животных.

Эта метафора помогает нам понять, каким образом организм сопротивляется натиску болезни. Однако с точки зрения гомеопатии причина болезни кроется не во внешнем воздействии (половодье, разлив реки), а в нарушении жизненной силы по какой-то внутренней, скрытой причине. По словам основоположника микробиологии Луи Пастера, «микроб — ничто; все определяется средой его обитания»⁷, причем под «средой обитания» микробов Пастер подразумевал организм с его свойством восприимчивости к инфекции. Восприимчивость к болезням представляет собой индивидуальное свойство каждого организма, которое может быть приобретенным или передаваться по наследству. Наследственная восприимчивость может быть обусловлена генетически; однако гомеопаты считают, что по наследству может передаваться также и недостаток жизненной силы. (Эта концепция существует в традиционной китайской медицине и сущность ее заключается в недостатке *цзин* у потомков. *Цзин* — это жизненная сила *Ци*, переданная от родителей).

С точки зрения гомеопатии с понятием «восприимчивость» тесно связано понятие «хроническая болезнь». Стрессовые факторы в виде введения лекарств и вакцин не являются основной причиной развития хронического заболевания — они лишь значительно усугубляют уровень хронического заболе-

вания в организме. Какие же факторы в первую очередь оказывают влияние на восприимчивость организма? По мнению большинства гомеопатов, наибольшее влияние на восприимчивость организма оказывают такие факторы, как недостаточное питание в течение поколений, загрязнение окружающей среды и вредоносное действие аллопатических лекарств. Возможно, что опосредованным образом на восприимчивость организма к заболеваниям влияет развитие сельского хозяйства, которое позволяет обеспечить продуктами питания огромное количество людей. В сообществе, где сильный поддерживает слабого и обеспечивает его продуктами питания, теория Дарвина о выживании сильнейшего и наиболее приспособленного не работает. Это положение применимо и к воспитанию домашних животных в семьях.

По моему глубокому убеждению, в развитии и распространении хронических болезней имеет огромное значение еще один фактор – разобщение человека и природы. Этот процесс идет параллельно расцвету сельского хозяйства. Чем дальше человек уходит от естественного состояния единения с окружающим миром, тем больший страх он ощущает – страх, который порождает множество болезней. Именно страх заставляет людей искать причину болезней во внешней среде, а не внутри себя. Именно поэтому настолько распространены аллопатические взгляды на причину и развитие болезней.

О распространенном сейчас ощущении страха говорят многие, но дважды я слышал наиболее откровенные высказывания. Один из представителей коренного населения Америки (прошу прощения, что забыл его имя) в интервью как-то сказал, что члены его племени никогда не ощущают страха от близкого контакта с дикой природой; скорее они чувствуют себя неотъемлемой частью окружающего мира. Более того – их изумляет, что подобные чувства свойственно испытывать белым людям.

Один из моих друзей как-то раз процитировал слова Альберта Эйнштейна. К сожалению, мне не удалось отыскать полный текст цитаты, но в трудах Эйнштейна я нашел подобное высказывание: «Мы часто страдаем чем-то вроде оптического обмана. Мы действуем так, как будто ни с кем и ни с чем не связаны в этом мире... Нам кажется, что мы не связаны с другими

живыми существами... На сегодняшний день это самое вредоносное заблуждение, владеющее миром...».

Именно это заблуждение и позволяет нам непочтительно относиться к окружающим людям, к собственному дому, к нашей планете и к другим видам живых существ, осуществляя эксперименты над ними. Знания, приобретенные таким путем, обернутся против нас; мы неизбежно расплатимся за те страдания, которые мы причинили другим живым существам, осмелившись считать их ниже нас. Мы не должны отделять себя от других живых существ — их боль, мучения и страх непременно негативным образом скажутся на здоровье человечества в целом.

Какой бы ни была природа происхождения хронических болезней, она оказывает на нас огромное влияние. Одновременно с общим ухудшением здоровья популяции возрастает частота возникновения аутоиммунных болезней и злокачественных опухолей. Это манифестные видимые проявления болезни — но это не сама болезнь. Ослабленная иммунная система организма, снижение защитного потенциала — именно так другими словами можно определить сущность хронических заболеваний.

Основной целью гомеопатического лечения является воздействие на болезнь на самом глубоком ее уровне — на уровне жизненной силы, что способствует восстановлению *самой основы* здоровья живых существ (как двуногих, так и четвероногих). В свою очередь, жизненная сила организма, получая импульс для своего восстановления в виде гомеопатического лечения, воссоздает утраченный потенциал иммунной системы, что в итоге приводит к улучшению или полному восстановлению здоровья. Правильно подобранное гомеопатическое средство прежде всего облегчает болезнь, вследствие чего облегчаются (а не подавляются) симптомы — внешние проявления болезни. Более того, иногда на начальном этапе лечения гомеопатическим методом отмечается даже некоторое временное усиление симптомов. Этот феномен называется «кризис исцеления». Частично усиление симптомов объясняется тем резонансом, который вызывает в организме правильно выбранное гомеопатическое средство — оно способно модулировать в организме электромагнитные колебания той же частоты, что и болезнетворное начало, причем при синхронизации частот (т. е. явлении резонанса) выделяется определенное количество энергии.

Существует и другое объяснение «кризиса исцеления» – подобное гомеопатическое средство восстанавливает исцеляющую реакцию организма. У животных с нарушением баланса жизненной силы невозможна адекватная реакция на вирусное или бактериальное обсеменение (по моему мнению, термин «обсеменение» более точный, чем «инфекция». По словам Л. Пастера, популяция бактерий прогрессирует только в организме с ослабленной иммунной системой. Бактерии присутствуют повсюду, но только в ослабленном организме они интенсивно размножаются, занимая «свободную нишу»). Применение подобного гомеопатического средства приводит к повышению температуры тела, выделениям и развитию воспаления, при этом жизненная сила активно сопротивляется болезни, способствуя процессу излечения (напомню, что симптом – способ излечения). При условии, что состояние пациента в целом улучшается, временное усиление представляет собой замечательный признак грядущего излечения. Каким же образом животные могут чувствовать себя лучше при наличии воспаления? Вспомните, как вы болели гриппом – в какой-то момент болезни ваше психическое состояние начинало улучшаться и приходила уверенность, что болезнь наконец-то отступает. Улучшение психического состояния обычно предшествует улучшению физических симптомов. Примерно так обстоит дело и у животных – при улучшении психического состояния безразличие сменяется интересом к окружающим, и вы вдруг замечаете, что ваш питомец после периода полной апатии начинает следить взглядом за вашими перемещениями.

Кроме того, если при ухудшении симптомы перемещаются снаружи внутрь, то при улучшении состояния идет обратный процесс их перемещения изнутри кнаружи, о чем говорит появление явных и поверхностных симптомов. Это выражено более отчетливо, если сочетается с уменьшением признаков глубоких нарушений. Исчезновение хронической диареи в сочетании с появлением кожных симптомов является хорошим прогностическим признаком. И если эти кожные симптомы исчезли под воздействием лекарств раньше, чем началась диарея, то почти наверняка можно сказать, что болезнь отступает.

Конечно, в домашних условиях вы сможете самостоятельно лечить менее сложные острые заболевания ваших питомцев,

поэтому такая реакция излечения может и не проявиться отчетливо. При хронических заболеваниях вашего питомца следует непременно обращаться к ветеринару-гомеопату. Ваши совместные действия помогут вам лучше понять природу болезни и природу излечения. Более подробная информация об ответной реакции организма на лечение излагается в гл. 3 «Природа излечения».

ВАШ ЗДОРОВЫЙ ПИТОМЕЦ

Рассмотрение сущности болезни хотелось бы завершить обсуждением важного вопроса: что же представляют собой здоровые животные? С тех пор как я начал изучать холистическую медицину, особенно гомеопатию, мой взгляд на эту проблему существенно изменился. В рамках традиционной ветеринарной медицины обычно данная тема не обсуждается. Многие из того, что раньше считалось нормой у кошек или собак, сейчас я расцениваю как ранние признаки заболевания. По мере ухудшения здоровья популяции наши стандарты также склонны меняться в худшую сторону. В качестве примера можно привести сравнительные таблицы среднего веса человека, которые приняты в американских страховых компаниях. Отражая избыточный вес населения США, при каждом пересмотре таблиц показатели среднего веса человека год от года увеличиваются.

У меня нет уверенности в том, что мы точно знаем, как в наши дни выглядит совершенно здоровая кошка или собака. Мы можем только теоретически предполагать, как они должны выглядеть. Фактически у всей популяции домашних животных (как и у людей!) выявляются хронические заболевания. У животных некоторые признаки патологии уже принимаются за норму. Например, распространено мнение, что у всех собак должен быть сильный специфический запах, однако у совершенно здоровой собаки не должно быть подобного запаха, даже если ее и не моют регулярно. Нормой считаются и некоторые другие признаки — выделения из глаз (слезотечение) у пуделей и других собак небольшого роста, зубные камни, требующие регулярной санации, серные пробки в ушах, зловонное дыхание, рвота проглоченной шерстью у кошек, жирная

кожа с шелушением, анальные мешочки, которые надо регулярно опустошать и т.д. К аномальным явлениям, которые практически считаются нормой у животных, относятся также гельминтозы, избыточное количество кожных паразитов (блохи) и некоторые поведенческие проблемы. Этот список можно продолжать бесконечно, и ни один из этих признаков не является нормой для здорового животного. Эти симптомы являются отражением хронических болезней и нарушения баланса жизненной силы организма. Подобные симптомы косвенным образом указывают на возможность возникновения более серьезных хронических болезней у домашних животных, в частности аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, диабета, различных поражений суставов, болезней кишечника и т. п., а также злокачественных новообразований.

С точки зрения гомеопатии общее ухудшение здоровья популяции домашних животных связано в основном с супрессивными методами традиционного лечения. Преувеличивая опасность острых болезней, ветеринары многие годы лечили домашних животных современными сильными аллопатическими препаратами и, кроме того, активно проводили вакцинацию. Весь комплекс подобных супрессивных мер способствовал возникновению хронических болезней. Лечение, имеющее своей целью подавление симптомов без удаления лежащей в основе болезни, неизбежно приводит к ослаблению организма. Сильные лекарства и хирургические вмешательства не позволяют болезни выразить себя в естественной форме, поэтому болезнь ищет какой-то иной выход. «Новое» заболевание, как правило, бывает более серьезным, чем первоначальное.

По этой же причине с течением времени происходит ослабление жизненной силы популяции в целом. По мнению гомеопатов, хронические болезни родителей, которые были у них до момента зачатия потомства, передаются детям. Таким образом, если не предпринимаются какие-либо специальные меры, то следующее поколение в целом будет менее здоровым, чем предыдущее. Например, без тщательно разработанной программы специальных мер каждое последующее поколение чистокровных животных будет более склонно к развитию хронических заболеваний. Другими словами, наследование (генетически обусловленное или врожденное) недостатка жизненной

силы на самом деле является наследованием хронических болезней.

Тем не менее существует реальная возможность уменьшить накопление хронических болезней у потомства. Простой отказ от вакцинации и неумеренного применения лекарств в сочетании с соответствующим питанием позволит существенно изменить ситуацию в лучшую сторону. Если в рационе питания домашних животных по-прежнему будет присутствовать современная, специальным образом обработанная пища, то ухудшение здоровья популяции можно ожидать уже в следующем поколении. Чтобы *полностью устранить* вредные последствия такого питания, должна произойти смена трех - четырех поколений. Баланс жизненной силы, нарушенный в результате супрессивной терапии и вакцинации, можно восстановить также путем применения гомеопатических методов лечения. Существенного улучшения здоровья популяции можно добиться уже в первом поколении, однако говорить о *полном* восстановлении здоровья также можно будет только через два - три поколения. Более подробная информация по данному вопросу излагается в гл. 3 «Природа излечения» и в гл. 16 «Вакцинация».

В первой половине XX в. лондонский врач-гомеопат *Дороти Шеферд* утверждала, что с помощью гомеопатического метода лечения можно избавиться от кармического греха. Это может показаться по меньшей мере преувеличением; однако на самом деле речь идет о возможности избавления от хронических болезней. Любая хроническая болезнь начинается на «духовном» префизическом уровне; в то же время «духовный» уровень — это точка сосредоточения кармического греха. Таким образом, именно кармический грех является ядром развития болезни. Болезни «духовные» естественно ведут к болезням физическим. Другими словами, «эпидемия» психических заболеваний как у человека, так и у животных в современном мире представляет собой нечто большее, чем простое распространение хронических болезней. О развитии подобной эпидемии свидетельствует тот факт, что огромному количеству людей и даже животных назначается прозак и аналогичные препараты. Налицо необходимость коренного изменения ситуации, однако это чрезвычайно трудная задача. Подобная идея не нова — о необходимости коренного изменения ситуации говорили мно-

гие известные врачи-гомеопаты, в том числе Дж. Кент, Дж. Витулкас, Г. Култер и др.¹⁰⁻¹⁴

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 2

- * **Философской основой традиционной (аллопатической) медицины является учение рационалистов. Рационалисты утверждают, что природу болезни можно постичь путем размышлений и на основе теоретического понимания можно противодействовать болезни. В свете этих представлений считается, что симптомы – это и есть болезнь, следовательно, можно полностью определить ее природу. Основным методом аллопатической медицины является метод лечения по противоположности, при котором лечение противопоставляется симптомам. По убеждению врачей-аллопатов, у большинства болезней имеется внешняя причина.**
- * **Философской основой холистической медицины, включая традиционную китайскую медицину и гомеопатию, является эмпирическое учение. С точки зрения эмпирической медицины причина болезни скрыта внутри организма и понять причину болезни невозможно. Таким образом, с болезнью может справиться только сам организм, а основная задача лечения – «вдохновить» организм и придать ему силы для собственного исцеления. Принципы гомеопатической медицины сформированы на основе следующих наблюдений.**
- * **Болезнь каждого организма индивидуальна, поскольку причина болезни скрыта глубоко внутри организма. У разных пациентов могут быть сходные симптомы болезни.**
- * **Симптомы болезни представляют собой своеобразные «ключи» для понимания ее сущности. Симптомы – это не болезнь, а ее проявление; болезнь сама по себе остается невидимой.**
- * **Название болезни отражает всего лишь внешнее ее проявление и ничего не говорит о глубине поражения организма.**
- * **Для острых болезней характерно относительно быстрое течение, практически полное выздоровление с последующей иммунизацией. Острые болезни представляют собой инфекционные заболевания; у животных молодого возраста в некоторых случаях острые болезни реально угрожают жизни. Острые болез-**

ни усиливают популяцию за счет удаления слабых особей.

- * Хронические болезни протекают медленно, длительно и коварно. Для них характерно отсутствие инфекционного агента и последующей иммунизации, так как прежде всего хронические болезни подавляют иммунную систему. *Заражение животных некоторыми инфекционными агентами (например, вирусом кошачьей лейкемии или вирусом кошачьего перитонита) происходит только тогда, когда имеется изначальная слабость иммунной системы (т.е. хроническая болезнь).*
- * Первая ответная реакция организма на болезнь выражается в основном в виде функциональных симптомов (повышение температуры тела и выделения). Органические изменения появляются при прогрессировании болезни.
- * Физические симптомы вначале появляются на поверхности тела, затем по мере ухудшения болезни перемещаются внутрь.
- * При подавлении поверхностных симптомов болезнь перемещается внутрь. Например, лечение кожных проявлений стероидными препаратами в дальнейшем может привести к развитию заболевания печени и почек.
- * Применение сильнодействующих лекарств или вакцинации ослабляет здоровье популяции. Эти методы лечения способствуют перемещению болезни внутрь у всех особей популяции и передаче болезней по наследству. Потомки рождаются примерно с таким же уровнем хронических болезней, какой был у их родителей.
- * Коренного улучшения здоровья популяции можно достичь лишь при помощи лечения заболеваний методами холистической медицины, однако полное восстановление здоровья популяции возможно только после смены трех - четырех поколений.

Природа излечения

Симптомы излечения

Симптомы частичного излечения

Симптомы облегчения

Симптомы подавления

Усиление симптомов, не связанное с излечением

Отсутствие ответной реакции

Краткое содержание главы 3

Для оценки ответной реакции организма на гомеопатическое или аллопатическое лечение необходимо достаточно четко понимать, в чем состоит сущность такого понятия, как «излечение». В этой главе хотелось бы обсудить не только признаки излечения, но и признаки других видов ответной реакции организма. Эти понятия основаны на законах гомеопатии, однако с их помощью можно оценить и глубже понять любой другой метод лечения. Имея представление о природе болезни и природе излечения, вам будет легче представить, каким образом различные методы лечения воздействуют на физическое и психическое состояние вашего питомца. В нужный момент при выборе того или иного метода лечения эти знания помогут вам принять правильное решение. Содержание этой главы основано на понимании природы болезни, поэтому вначале следует ознакомиться с содержанием главы 2.

Традиционно предполагается, что исчезновение симптомов означает полное выздоровление. Однако на самом деле исчезновение симптомов не всегда является признаком выздоровления – возможно, это признак наступления ремиссии или перемещения болезни на иной, более глубокий уровень. Это отличие имеет принципиальное значение. С точки зрения традиционной медицины (и свойственной ей путаницы в понятиях) организм поражается в разное время разными болезнями, причем эти болезни совершенно не связаны друг с другом. Иными словами, в рамках традиционной медицины исчезновение одной группы симптомов у пациента и появление вслед за этим другой группы симптомов считаются отдельными, не связанными друг с другом явлениями. Пациент считает себя предельно невезучим и несчастным человеком, если вскоре после исчезновения симптомов одной болезни у него появляются симптомы другой, как правило, более тяжелой и серьезной болезни. Если же принять точку зрения, что это не разные заболевания, а разные проявления одной и той же болезни, то вся последовательность событий предстанет перед нами в ином, более ясном и логическом свете.

С альтернативной точки зрения возможны несколько вариантов ответной реакции организма на лечение – это излечение, частичное излечение, облегчение, подавление, усиление симптомов, не связанное с излечением, и отсутствие эффекта. Врачи-

аллопаты расценивают первые четыре вида ответной реакции как целительные, но в действительности эти реакции имеют совершенно разное значение. При всех этих видах ответной реакции наблюдается улучшение по крайней мере одного симптома, и именно этот симптом аллопаты расценивают как основной симптом клинической картины. Например, у кошек с гипертиреозом (повышенной функцией щитовидной железы) традиционным основным симптомом клинической картины является уровень гормонов щитовидной железы в крови, причем его снижение считается показателем эффективности лечения, даже если на этом фоне отмечается ухудшение других симптомов. В отличие от традиционной точки зрения для врачей-гомеопатов существенным является улучшение основных симптомов, что в некоторых случаях вступает в противоречие с данными лабораторных исследований. При гомеопатическом лечении в некоторых случаях данные лабораторных исследований нормализуются после улучшения общего состояния пациента.

Различные варианты ответной реакции организма на лечение не строго отличаются друг от друга, как, например, черное и белое; в некоторых случаях наблюдаются смешанные типы. В общем и целом, интерпретация ответной реакции организма на гомеопатическое лечение представляет собой одну из самых трудных задач в гомеопатии, особенно если речь идет о хронических болезнях с обилием особенностей и деталей. Если ваш питомец страдает каким-либо хроническим заболеванием, то вам целесообразнее обратиться за помощью к ветеринару-гомеопату и не пытаться лечить его самостоятельно. В случаях хронических заболеваний только профессионал-гомеопат сможет правильно интерпретировать ответную реакцию организма на лечение (см. гл. 2 «Природа болезни»).

Однако чем больше вы будете знать о возможных вариантах ответной реакции организма на воздействие гомеопатических средств, тем лучше вы будете ориентироваться в ситуации. Полученные знания помогут вам запастись необходимым терпением — часто именно терпение дается нам труднее всего. Гомеопатическое лечение требует времени, иногда довольно длительного. В целом имеется четкая зависимость между отрезком времени, за который развилось заболевание, и тем отрезком времени, который потребуются для излечения. Напри-

мер, для излечения тяжелых кожных болезней может потребоваться 2–3 года, для излечения менее тяжелых хронических болезней – около года упорного лечения.

Ответная реакция организма при лечении острых заболеваний не отличается таким многообразием, как при лечении хронических болезней. Самым важным признаком грядущего выздоровления вашего питомца является улучшение симптомов со стороны психоэмоциональной сферы, которое идет параллельно с улучшением физических симптомов. Кроме того, в процессе излечения острого заболевания нет необходимости в частом повторном приеме гомеопатического средства. Более подробно информация о правилах назначения гомеопатических препаратов изложена в гл. 5 «Применение гомеопатии в домашних условиях».

Даже если в домашних условиях вам придется лечить только не очень сложные острые болезни вашего питомца, то все равно вам необходимо прочесть и постараться понять, каким же образом организм может реагировать на назначение гомеопатических средств. Особенно важно уметь отличать излечение от облегчения – в некоторых случаях эти виды реакций различить достаточно сложно. Умение правильно интерпретировать полученную ответную реакцию организма на лечение поможет вам в выборе гомеопатического средства и в сравнительной оценке состояния вашего питомца.

СИМПТОМЫ ИЗЛЕЧЕНИЯ

Понятие «излечение» подразумевает улучшение (ослабление) симптомов, которое идет параллельно с ослаблением лежащей в их основе болезни. Для оценки ответной реакции организма на лечение гомеопатия использует вполне четкие критерии, которые были обоснованы в прошлом столетии К. Герингом и получили название «закон излечения Геринга» (фактически основы этого закона изложены в трудах Гиппократов и Парацельса, но формулировка К. Геринга отличается особой полнотой и четкостью). Согласно закону Геринга, при излечении симптомы исчезают в определенном и предсказуемом порядке. Исчезновение симптомов идет от головы к стопам

и изнутри кнаружи. В первую очередь исчезают более выраженные симптомы, затем – менее выраженные; вначале исчезают недавно появившиеся симптомы, затем – симптомы «старые», которые появились давно.

Действие закона Геринга часто сопровождается появлением «старых» симптомов, которые ранее исчезли или самостоятельно, или под воздействием супрессивной терапии. «Старые» симптомы могут появиться при развитии исцеляющей ответной реакции организма на лечение. Подобный возврат симптоматики следует расценивать как очень хороший признак – это означает, что жизненная сила под воздействием лечения способна вернуть «точку приложения» болезни к изначальному состоянию, которое обычно менее тяжелое, чем последующие проявления болезни. Обычно возврат «старых» симптомов – явление временное; как правило, через короткий промежуток времени они исчезают самостоятельно, без дополнительного лечения. В редких случаях «старые» симптомы не исчезают под воздействием гомеопатического средства, которое вызвало их появление. Очевидно, что в подобной ситуации необходимо дополнить лечение назначением нового гомеопатического препарата.

Подтверждением скорого выздоровления является не только ощущение хорошего самочувствия, но и *постепенное* уменьшение симптомов, а также перемещение симптомов от более важных органов к менее важным. По мере выздоровления болезнь может переместиться с уровня органических изменений на уровень функциональных изменений. (Например, изъязвления на коже у собаки могут зажить, но эпизоды зуда без последующего изъязвления кожи могут сохраняться еще некоторое время – см. гл. 2 «Природа болезни»). Иногда в процессе излечения некоторые симптомы могут и ухудшиться (усилиться) на какое-то время – например, вслед за исчезновением судорожных припадков у животного могут появиться признаки отита. Возможно кратковременное усиление локальной симптоматики – например, при излечении кошек с инфекцией верхних дыхательных путей может на какое-то время усиливаться кашель и выделения из носа. Очень важным является тот факт, что подобное кратковременное усиление некоторых симптомов происходит на фоне улучшения общего состояния животного, увеличения физической активности и улучшения ап-

петита. Меня как ветеринара-гомеопата усиление отдельных симптомов в процессе выздоровления только радует, однако люди обычно приходят в состояние некоторого недоумения и расстраиваются, если у их питомцев вновь «появляется болезнь». На самом деле это явление указывает на благоприятное течение заболевания и называется «исцеляющее усиление симптомов» (некоторые гомеопаты пользуются термином «кризис исцеления»).

Когда наступило излечение острого заболевания, то необходимости в постоянном применении гомеопатических средств уже нет — болезнь больше не вернется. Однако излечение хронического заболевания может занять месяцы или даже годы. Иногда процесс излечения приобретает циклический характер, причем на фоне общей тенденции к выздоровлению периоды улучшения чередуются с периодами ухудшения. В некоторых случаях подобная модель излечения наблюдается при острых заболеваниях, однако время излечения измеряется часами и днями, а не месяцами и годами, как при хронических заболеваниях. Эту модель выздоровления можно назвать «два шага вперед, один шаг назад». Очевидно, что в модели выздоровления «один шаг вперед, два шага назад» заложен иной смысл — обычно такой тип течения заболевания указывает не на излечение, а на облегчение (см. далее).

СИМПТОМЫ ЧАСТИЧНОГО ИЗЛЕЧЕНИЯ

При частичном излечении налицо исцеляющее воздействие гомеопатического средства, однако *не происходит улучшения всех симптомов*. В этом случае в соответствии с законом излечения Геринга происходит улучшение не всех, а только некоторых симптомов. Важно то, что исчезновение этих симптомов *не будет сопровождаться* появлением других, более тяжелых нарушений. Если же какие-либо новые симптомы и появятся, то они будут иметь менее серьезный и более поверхностный характер. В этих случаях также не требуется частых повторных приемов гомеопатического средства, так как по мере восстановления жизненной силы и улучшения общего состояния у организма постепенно восстановится способность сдерживать

появление новых серьезных симптомов. Предположим, у вашей кошки имелись симптомы воспаления мочевого пузыря и хронического синусита с гнойными выделениями. Под воздействием назначенного гомеопатического средства прекратилось воспаление мочевого пузыря и улучшилось общее состояние животного, однако симптомы синусита не исчезли. Налицо пример частичного излечения, так как исчезновение симптомов со стороны мочевого пузыря не сопровождалось появлением другой, более тяжелой симптоматики. Для продолжения излечения потребуется назначение другого гомеопатического средства, которое позволит избавиться от воспаления пазух и окажет благотворное влияние на общее состояние животного.

СИМПТОМЫ ОБЛЕГЧЕНИЯ

Облегчение (или паллиативный эффект) означает, что уменьшение симптомов (чаще всего очень быстрое) не сопровождается искоренением основной болезни. В течение какого-то времени пациент чувствует себя лучше, однако на этом фоне болезнь продолжает прогрессировать – именно этим отличается облегчение болезни от излечения. В типичных случаях ощущение хорошего самочувствия непродолжительно, и вскоре симптомы болезни возвращаются. В дальнейшем, для того чтобы достичь состояния облегчения и сохранить его на какой-то период времени, потребуется более сильное средство или более частый прием гомеопатического препарата. Достаточно часто облегчению болезни сопутствует улучшение отдельных симптомов, другие же остаются неизменными или ухудшаются. При прекращении лечения возвращается практически прежнее состояние, изменения касаются только интенсивности проявления симптомов. Часто после прекращения паллиативного лечения интенсивность симптомов возрастает, особенно если лечение продолжалось длительное время (именно поэтому облегчение коренным образом отличается от частичного излечения, при котором достигнутое улучшение состояния остается неизменным и после прекращения лечения).

Примером подобного паллиативного лечения является применение стероидных препаратов для облегчения кожного зуда

у животных. Год от года для достижения эффекта требуется все большее количество лекарства, пока препарат не прекратит работать или пока не произойдет подавления симптомов. (С точки зрения гомеопатии большинство аллопатических лекарств являются паллиативными. При их применении в течение долгого времени отмечается эффект подавления — см. далее). Паллиативное лечение можно сравнить с приготовлением некоторых блюд в закрытой емкости с постоянным подогревом («скороварка» русск. — *Прим. перев.*). По мере нагревания емкости всё большие усилия требуются, чтобы пар не вырвался наружу (повторение паллиативного лечения). В конце концов, если продолжается нагревание, то в какой-то момент пар под давлением вырывается наружу через выпускной клапан (возврат симптомов болезни). В данном примере симптомы — это тот пар, который вырвался наружу, хотя обычно болезнь не прогрессирует столь стремительно.

Облегчение весьма обманчиво из-за явного улучшения симптомов под воздействием гомеопатического средства. В большинстве случаев, особенно при хронических болезнях, облегчение не только не приносит пользы, а скорее вредит. Исключением являются острые болезни, при которых облегчение симптомов заболевания под действием лекарств не мешает процессу излечения. Подобное облегчение симптомов можно отметить при гомеопатическом лечении некоторых заболеваний, например абсцессов. Назначение паллиативного средства приведет к улучшению симптоматики, но при отмене лекарства абсцедирование вспыхнет с новой силой. В таких случаях важно понимать разницу между реакцией в виде облегчения болезни и реакцией в виде излечения. А назначение при абсцессе правильного «подобного» средства таким образом может «стимулировать» организм, что произойдет полное излечение абсцесса.

Разницу между понятиями «облегчение» и «излечение» можно достаточно четко проследить на примере следующего клинического случая. Несмотря на то, что речь идет о хронической болезни, подобные принципы применимы и к интерпретации ответной реакции организма при острых болезнях. Впервые коккер-спаниеля Долли привели ко мне на прием, когда ей было 9 лет. У Долли отмечались выраженные мозговые нарушения в виде судорожных приступов, эпизодов помра-

чения сознания и снижения способности вступать в контакт с окружающими. Если Долли оказывалась в углу комнаты или в промежутке между столом и стеной, то надолго «застревала» там, так как не могла найти выход. Кроме того, у нее был одно-сторонний парез лицевого нерва, поэтому ей было трудно принимать пищу или пить воду. В анамнезе после вакцинации в течение нескольких дней у нее отмечалась настолько выраженная двигательная активность, что в какой-то момент она даже спрыгнула с высоты 2,5 м. Позже я понял, что после вакцинации у Долли развился синдром повышенной активности и нарушения внимания – проявления подобного синдрома в настоящее время часто встречаются у детей.

Вначале я назначил Долли *Helleborus 10M*, и после кратковременного усиления симптомов наступило удивительно быстрое улучшение – казалось, это не что иное, как исцеляющая реакция. Улучшение состояния продлилось три недели (немного меньше, чем ожидалось от приема средства такой потенции), после чего я назначил ей то же средство в потенции 1M для усиления действия. После дозы 1M улучшение длилось две недели, после повторения – полторы недели. В это время я начал подозревать, что *Helleborus* только облегчает состояние, но все же решил дать Долли еще одну дозу, после чего наступило критическое ухудшение состояния («пар вырвался наружу»). Все данные четко указывали на паллиативный характер выбранного мною средства.

Ключом для интерпретации этого случая (конечно, «задним умом все мы крепки») могло бы служить стремительное улучшение состояния на короткий период времени и укорочение периодов улучшения после повторных приемов гомеопатического средства. Кроме того, некоторые симптомы у Долли улучшались, а некоторые оставались без всяких изменений. После отмены средства все возвращалось на свои места в прежнем виде. Если бы у назначенного мною лекарства имелось частично или полностью исцеляющее действие, то отмечалось бы стойкое улучшение состояния без возврата к прежнему уровню к моменту приема следующей дозы. При продолжении приема гомеопатического средства реакция организма становится более четкой: либо жизненная сила прекратит реагировать на гомеопатический препарат, либо состояние резко ухудшится,

как в случае с Долли. Оба типа ответной реакции указывают на паллиативный характер выбранного средства. Однако при продолжении приема паллиативного лекарства существует потенциальная причина для подавления симптомов, что является чрезвычайно опасным (см. далее). По этой же причине нельзя беспорядочно повторять прием паллиативного средства, особенно высоких потенций (30С и выше).

Ответная реакция Долли на следующее гомеопатическое лекарство *Nux moschata 1M* была совершенно другой. На следующий день после приема дозы препарата она стала вялой и апатичной, затем в течение трех дней отмечалось улучшение. В течение двух последующих дней отмечались нарушения координации, потом последовал десятидневный период практически нормального поведения. Потом три дня депрессии, затем целая неделя удивительно нормального поведения, после чего пять дней легких координаторных нарушений и вслед за этим улучшение. Подобные изменения длились в течение месяца, после чего последовало постепенное улучшение всех психических симптомов в течение семи месяцев. В промежутке между шестым и седьмым месяцем от начала лечения у нее был возврат «старых» симптомов в виде выделений из уха, выделений из влагалища и появления корочек на коже носа и на подошвенной поверхности задних конечностей. После закладывания в ухо мази, содержащей стероиды и антибиотики, отмечался возврат психических симптомов в легкой форме. После отмены мази все симптомы исчезли без дополнительного лечения. Выделения из уха и влагалища постепенно также прекратились без дополнительного лечения, исключая дополнительную дозу *Nux moschata 1M*.

Эта ответная реакция — явное излечение — имела несколько характерных признаков. Во-первых, за усилением симптомов последовало постепенное стойкое улучшение. Во-вторых, ответная реакция организма длилась достаточно долго. В-третьих, произошел возврат старых симптомов. В-четвертых, перемещение симптомов шло изнутри кнаружи и от более выраженных симптомов к менее выраженным. И в-пятых, произошло постепенное восстановление здоровья без постоянного приема гомеопатических средств. В данном случае выздоровление соответствовало модели «два шага вперед, один назад». Анализ

приведенного случая показывает, что слишком быстрая оценка результатов лечения может быть ошибочной. Тем не менее в ходе исцеляющей реакции организма могут присутствовать не все стадии процесса. Часто, особенно при острых заболеваниях, у животных просто начинается улучшение состояния, хотя в некоторых случаях состояние улучшается медленно. На стремительное улучшение состояния после начала лечения всегда следует обращать особое внимание, так как почти всегда это признак облегчения, а не излечения.

СИМПТОМЫ ПОДАВЛЕНИЯ

В отличие от облегчения подавление (супрессия) симптомов оказывает намного более выраженное воздействие на организм по сравнению с облегчением, в результате чего наступает быстрое ухудшение состояния. При реакции в виде подавления на фоне лечения (иногда чрезмерно активного) из клинической картины удаляются некоторые симптомы, и вслед за временным улучшением состояния следует внезапное ухудшение, часто с появлением совершенно новых, более тяжелых симптомов. Если вновь вернуться к нашему примеру с нагреванием плотно закрытой емкости, то облегчение симптомов будет напоминать выход пара под давлением через выпускной клапан. Подавление симптомов (если продолжить сравнение) напоминает взрыв емкости из-за того, что давление внутри постоянно возрастает (болезнь), а постепенного удаления небольшого количества пара через выпускной клапан не происходит (подавление симптомов).

Подавление симптомов может возникнуть в результате использования любого типа лечения, в том числе гомеопатического (редко), хотя основными причинами являются хирургические вмешательства или применение сильнодействующих препаратов. Болезнь имеет свою «точку приложения» в организме, что и проявляется соответствующими симптомами, при этом жизненная сила стремится минимизировать ущерб, который наносит организму болезнетворное начало. При подавлении симптомов создаются условия или для перемещения «точки приложения» болезни к более важным органам, или для более

серьезного поражения той же самой системы. Например, в прошлом столетии врачи обнаружили, что при чрезмерно активном лечении банальной простуды (т. е. при подавлении симптомов простуды) возможно развитие астмы. Другое не менее серьезное последствие подавления симптомов заключается в развитии выраженных психических нарушений. Анализ заболевания коккер-спаниеля Долли показывает, что после закладывания в ухо антисептической мази – т. е. после подавления симптомов отита – вернулись симптомы психических нарушений.

Мне вспоминается случай из моей практики традиционного врача-ветеринара, когда я произвел одностороннюю радикальную мастэктомию собаке по поводу злокачественной опухоли молочной железы. Послеоперационный период протекал без особенностей, однако затем состояние быстро ухудшилось за счет развития острой почечной недостаточности, подтвержденной лабораторными исследованиями. Обычно такое нарушение считается осложнением общей анестезии. Однако, если проанализировать этот случай с точки зрения гомеопатии, то можно сделать вывод, что хирургическое удаление опухоли (подавление симптома болезни) послужило причиной перемещения болезни к более важным органам – почкам. В результате наступило резкое ухудшение состояния, которое закончилось смертью животного.

Прекращение лечения (если это возможно) при подавлении симптомов в типичных случаях не приведет к возврату прежнего состояния. Восстановление баланса жизненной силы и возвращение к исходному состоянию возможно только в результате упорного гомеопатического лечения. В некоторых случаях, однако, возврат к прежнему состоянию невозможен, например при хирургическом удалении пораженного органа.

При острых заболеваниях явление подавления встречается очень редко, поскольку организму чаще всего удастся сдержать болезнь на уровне поверхностных симптомов, а болезнетворное начало не бывает настолько сильным. При гомеопатическом лечении острых заболеваний чаще всего встречается ответная реакция организма в виде излечения, облегчения или же отсутствия эффекта. При традиционном аллопатическом лечении острых заболеваний типична ответная реакция в виде облегчения (паллиативная реакция).

Основными причинами реакции подавления (супрессии) при гомеопатическом лечении хронических болезней являются либо слишком усердное назначение высоких потенций, либо неправильный (но близкий) выбор средства. Правильно выбранное гомеопатическое средство обладает огромной силой воздействия и способно вызвать излечение; неправильно выбранное средство обладает минимальным воздействием. В некоторых ситуациях близкое средство оказывает на организм достаточно сильное влияние, но не приводит к излечению. При небольшом количестве приемов близкий препарат может вызвать облегчение болезни, но при частом приеме близкое средство может спровоцировать подавление симптомов заболевания.

Подавление симптомов более характерно для традиционного метода лечения, что связано с сильным воздействием аллопатических лекарств на организм. Обычно эти лекарства противопоставляются симптомам болезни, что мешает попыткам организма самостоятельно исцелиться. Кроме того, сильнодействующие аллопатические препараты обладают супрессивным воздействием на иммунную систему организма.

УСИЛЕНИЕ СИМПТОМОВ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ИЗЛЕЧЕНИЕМ

При этом типе реакции организма после назначения лекарства отмечается усиление и ухудшение симптомов. Это напоминает усиление симптомов при излечении, однако вслед за усилением симптомов не происходит улучшения состояния. Когда период усиления симптомов заканчивается, состояние животного или возвращается к прежнему уровню (до начала лечения), или даже ухудшается. Кроме того, при этом типе реакции ухудшение длится намного дольше, чем при «кризисе исцеления». В редких случаях (чаще при хронических заболеваниях, а не при острых) отмечается стойкое ухудшение состояния. Это явление более характерно при назначении высоких потенций (выше 30C) или у животных с недостатком жизненной силы. Считается, что причиной усиления симптомов, не связанной с излечением, является назначение близкого к правильному гомеопатического средства, так как энергия подобного средства негармо-

нично нарушает баланс жизненной силы в организме.

Обычно такой тип реакции имеет тенденцию к самоограничению, но в некоторых случаях для изменения ответной реакции возникает необходимость в назначении другого средства. Прежде чем сделать следующее назначение, следует убедиться в том, что усиление симптомов у пациента не представляет собой временного усиления симптомов при излечении. При острых заболеваниях редко возникает необходимость в назначении другого средства, поэтому при лечении вашего питомца в домашних условиях вам вряд ли придется поступать подобным образом. Если же вы чувствуете, что период ухудшения симптомов затягивается, то несомненно следует обратиться к профессионалу-гомеопату. Свойством противодействовать ухудшению симптомов обладает *Nux vomica*, однако это назначение оправданно только тогда, когда ухудшение симптомов ослабляет вашего питомца.

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ

Отсутствие ответной реакции организма на лечение встречается в тех случаях, когда выбранное для лечения гомеопатическое средство очень далеко отстоит от подобного лекарства. В этих случаях в организме не возникает никакого резонанса в ответ на прием гомеопатического средства. Усиление симптомов, не связанное с излечением, и отсутствие эффекта можно проиллюстрировать классическим примером – иностранец потерялся в чужом городе и спрашивает дорогу. Из-за языкового барьера жители города не в силах объяснить ему, куда надо идти, кричат, жестикулируют и возмущаются, что он ничего не понимает. Такое же «возмущение» возникает в организме при усилении симптомов. Отсутствие реакции организма можно сравнить с появлением на улице города представителя иной цивилизации, с которым контакт вообще невозможен.

Важно понять, что описанные выше варианты ответной реакции организма возможны как при гомеопатическом, так и при любом другом методе лечения, включая традиционное. При применении холистических методов подавление симптомов встречается гораздо реже, так как воздействие этих ле-

карств на организм более мягкое. В целом тип ответной реакции организма на лечение зависит от разных факторов – и от выбранного метода, и от уровня профессионализма врача, и от особенностей организма пациента. Точная интерпретация типа ответной реакции на лечение, независимо от выбранного метода, поможет оценить достоинства каждого из них.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 3

*** Симптомы излечения**

Симптомами скорого излечения являются улучшение состояния и возвращение нормального поведения. Появление выделений и повышение температуры свидетельствуют о соответствующей ответной реакции организма на лечение. При хронических болезнях после назначения подобного средства может наступить временное ухудшение состояния, которое может длиться от трех до 14 дней, иногда дольше. При излечении острых болезней подобное ухудшение наблюдается редко и длится несколько часов. При излечении симптомы болезни исчезают постепенно, иногда циклически. В редких случаях при излечении хронического заболевания можно наблюдать возврат «старых» симптомов, которые ранее были подавлены. Исчезновение симптомов происходит в определенном порядке – изнутри кнаружи, от головы к нижним конечностям, от более важных органов к менее важным, от недавних симптомов к более «старым», от органических изменений к функциональным. При возвращении старых симптомов излечение обычно бывает удивительно быстрым, однако симптомы со стороны кожи, как правило, исчезают намного медленнее.

*** Симптомы частичного излечения**

Несомненно, что частичное излечение по сути своей подобно полному излечению, однако исчезают не все симптомы, что требует дополнительного назначения иного гомеопатического средства. В отличие от паллиативной реакции (облегчения) и супрессивной реакции (подавления) при частичном излечении общее состояние улучшается и не отмечается стойкого ухудшения. На фоне улучшения общего состояния отмечается улучшение более глубоких и/или новых симптомов, а менее

серьезные и/или старые симптомы остаются неизменными.

*** Симптомы облегчения**

Один или несколько симптомов улучшаются или исчезают, причем это происходит быстро. Другие симптомы или ухудшаются, или остаются без изменения. Могут появиться новые симптомы («побочный» эффект). Нет стойкого улучшения общего состояния, хотя отмечается временное облегчение. При прекращении лечения может быть возврат тех симптомов, которые временно улучшились после начала лечения, причем их интенсивность возрастает, особенно при лечении хронических заболеваний. Продолжение лечения в некоторых случаях приводит к ухудшению общего состояния. При острых заболеваниях, склонных к самоограничению, при облегчении состояния может произойти излечение. В этих случаях вместе с облегчением симптомов идет процесс выздоровления животных за счет собственных сил организма. При хронических болезнях (и иногда при острых) облегчение маскирует симптомы, однако болезнь при этом прогрессирует, поэтому при прекращении лечения возможно ухудшение состояния.

*** Симптомы подавления (супрессии)**

Один или несколько симптомов полностью исчезают. Психическое и эмоциональное состояние пациента ухудшается. Несмотря на исчезновение основных симптомов, у пациента нет ощущения хорошего состояния, даже если болезнь кажется «излеченной». Через какой-то промежуток времени наступает кризис с появлением «новой болезни», которая обычно тяжелее первоначальной и сопровождается вовлечением в болезненный процесс непораженных ранее органов и систем организма.

*** Усиление симптомов, не связанное с излечением**

Интенсивность симптомов нарастает. Усиление симптомов может быть кратковременным, но может иметь постоянный характер. Через какое-то время состояние пациента возвращается к первоначальному, которое было до начала лечения. Для улучшения состояния необходимо назначить другое гомеопатическое средство независимо от того, прекратилось ли ухудшение состояния или нет. Это наиболее характерно для ослабленных особей с хроническими болезнями.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Что делать, если ваш питомец заболел

В каких случаях обращаться
за ветеринарной помощью

Совместная работа с ветеринаром-гомеопатом

Помощь и препятствия к излечению

Другие методы лечения

Краткое содержание главы 4

Хотелось бы порекомендовать вам непременно прочитать эту главу, прежде чем вы приступите к гомеопатическому лечению вашего питомца. Изложенная в этой главе информация поможет вам определить, в каких случаях вы сможете самостоятельно лечить домашних животных, а в каких ситуациях целесообразнее обращаться к ветеринару-гомеопату. Кроме того, вы сможете лучше понять сущность холистических методов лечения и научиться распознавать те препятствия, которые могут блокировать все ваши усилия по излечению. Если назначенное вами гомеопатическое лечение малоэффективно, то одно из этих препятствий, возможно, является частью картины заболевания.

Если вы решили самостоятельно лечить некоторые несложные заболевания вашего питомца, то непременно обратите внимание на материал, изложенный в главе 5, где подробно описываются особенности назначения гомеопатических средств. В главе 5, кроме того, рассматривается методика работы с теми главами и разделами книги, где речь идет о заболеваниях отдельных органов и систем. После усвоения этой информации вам следует ознакомиться с теми разделами книги, которые непосредственно касаются специфических нарушений у вашего питомца. В каждом из этих разделов приводится достаточно большой объем информации не только об особенностях гомеопатического лечения животных, но и о тех состояниях, которые подлежат лечению только при поддержке и помощи традиционных ветеринаров.

Многие заболевания у домашних животных хорошо поддаются самостоятельному гомеопатическому лечению; именно стремление разъяснить особенности применения гомеопатии в домашних условиях и послужило основным поводом для написания этой книги. В некоторых случаях, однако, не следует лечить вашего питомца самостоятельно. В главах, посвященных лечению отдельных заболеваний, я старался подробно рассмотреть те ситуации, в которых вам непременно надо обратиться за помощью в традиционную ветеринарную лечебницу. Основные показания к обращению за ветеринарной помощью рассматриваются в этой главе. Наиболее успешным ваше лечение было бы в том случае, если бы поблизости от вас практиковал ветеринар-гомеопат или ветеринар-холистик, к которым вы всегда могли

бы обратиться за консультацией. В настоящее время многие ветеринары-гомеопаты консультируют по телефону и, естественно, всегда помогут вам разобраться в трудных случаях.

Кроме того, я настоятельно рекомендую вам поддерживать отношения и с тем ветеринаром, который практикует в вашей местности — это целиком и полностью в интересах вашего питомца. За годы своей ветеринарной практики я убедился, что большинство ветеринаров действительно стараются сделать все возможное для лечения больных животных. К сожалению, нам всем во время обучения не удалось получить достаточно информации о холистических методах лечения, однако в настоящее время число учебных заведений, в которых на достойном уровне преподается этот предмет, стремительно увеличивается. Консультации ветеринара-гомеопата по телефону вначале представляются чем-то необычным и даже неприемлемым. Когда я впервые столкнулся с этим, моей естественной реакцией было полное неприятие этого «способа» лечения, однако по прошествии некоторого времени моя точка зрения коренным образом изменилась. Сейчас я считаю телефонные консультации вполне разумным и эффективным способом оказания помощи больным животным. По мере того как будет увеличиваться число практикующих ветеринаров-гомеопатов, необходимость в телефонных консультациях отпадет сама собой, однако в настоящее время во многих случаях это вполне разумный выход.

Возможно, что у традиционных практикующих ветеринаров ваше желание применять холистические методы лечения вашего питомца вначале не встретит понимания и не получит одобрения. Однако вам следует непременно развивать и поддерживать эти отношения — традиционные ветеринары обладают огромным опытом лечения больных животных и знают все особенности течения различных заболеваний. Со временем, однако, всем станет ясно, что вы не отвергаете категорически их помощь, а просто хотите лечить ваших домашних животных наименее вредным и наиболее эффективным методом. Однако возможны такие ситуации, когда только традиционный ветеринар, обладающий практическим опытом и навыками, сможет оказать вашему питомцу необходимую помощь. Кроме того, вам может понадобиться совет или консультация по наблюдению или уходу за больным животным.

Если некоторые заболевания вашей собаки или кошки вы собираетесь лечить самостоятельно, то в этих случаях особенно важно заручиться поддержкой практикующего ветеринара. Вам неизбежно понадобится совет и помощь опытного профессионала; кроме того, ветеринар поможет вам адекватно оценить тяжесть состояния вашего питомца и подскажет, в каких случаях домашнее гомеопатическое лечение является нецелесообразным. Как и во всем, только чистосердечные отношения на основе взаимопонимания позволят вам при необходимости рассчитывать на поддержку опытных специалистов.

В данной главе также рассматриваются основные препятствия к излечению вашего питомца — неполноценное питание, частые стрессовые ситуации, вакцинация и необдуманное применение аллопатических препаратов. Кроме того, мы подробно поговорим о возможности сочетания гомеопатического и других методов лечения, по крайней мере в течение какого-то периода времени. Мне бы хотелось также дать вам несколько рекомендаций по переходу к холистическим методам лечения, так как это часто требует определенного времени и не всегда протекает гладко.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩЬЮ

Обращение в ветеринарную лечебницу необходимо в тех случаях, когда у домашних животных развиваются какие-либо угрожающие жизни состояния или отмечается тяжелое течение заболевания на фоне потери аппетита. Более того — ваше нежелание обращаться за помощью к традиционным ветеринарам в экстренных случаях может обернуться тем, что ситуация выйдет из-под контроля. В настоящее время многие ветеринары знакомы с методами холистической медицины, и интерес к подобным методам лечения постоянно возрастает. Возможно, что ваш ветеринар проникнется вашим желанием применять нетрадиционные методы лечения и даст вам ряд полезных советов. Не исключено, что он порекомендует вам обратиться к своим коллегам, более сведущим в вопросах холистической медицины.

В любом случае при заболевании вашего питомца совершенно нецелесообразно и неразумно отказываться от помощи практикующих ветеринаров, даже если они и не применяют гомеопатический метод лечения. У традиционных ветеринаров есть опыт наблюдения за больными животными и навыки диагностики и лечения. В интересах вашего питомца выслушать их мнение и затем принять самостоятельное решение, как и чем вы его будете лечить. Ответственность за его здоровье целиком и полностью лежит на вас, и отказ от помощи традиционного ветеринара может пагубным образом отразиться на его состоянии.

Конечно, при заболевании вашего питомца лучше всего было бы сразу обратиться к ветеринару-гомеопату, однако, к сожалению, ветеринары-гомеопаты практикуют далеко не везде. Возможно также обратиться за советом к тем, кто уже в той или иной степени применял холистические методы лечения домашних животных или просто интересуется ими. Однако, к кому бы вы ни обратились, ваши записи и самостоятельные назначения будут важным подспорьем при анализе заболевания вашего питомца.

В следующих ситуациях вашему питомцу требуется помощь ветеринара:

- если животные отказываются от еды более двух дней,
- если отмечаются нарушения дыхания,
- если у вашего питомца рвота 1–2 раза в день при хроническом заболевании или каждые несколько часов при остром заболевании,
- если диарея длится более нескольких дней,
- если ухудшение состояния длится дольше обычного или вы не отмечаете улучшения после назначения 3–4 гомеопатических средств.
- если состояние ухудшается,
- если отмечается вялость в течение более двух дней,
- если вам не удастся подобрать подобное гомеопатическое средство или вы не можете разобраться в состоянии,
- если у вашего питомца не происходит мочеиспускания или дефекации.

В интересах вашего питомца обратиться за помощью в тех случаях, когда вы не совсем понимаете сущность его заболевания или видите, что ваших знаний не хватает, чтобы ему помочь. Не следует учиться лечению ценой его здоровья. Интересы вашего питомца всегда должны быть на первом месте.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ВЕТЕРИНАРОМ-ГОМЕОПАТОМ

Во многих случаях при заболевании ваших домашних животных вам просто необходим совет опытного гомеопата, причем совершенно не обязательно гомеопата со специальным ветеринарным образованием. Если вы решите обратиться к практикующему «человеческому» гомеопату, то предварительно следует заручиться поддержкой вашего ветеринара, который мог бы профессионально оценить особенности состояния вашего питомца.

Успех гомеопатического лечения животных во многом зависит от того, насколько полно и четко вы расскажете гомеопату об имеющихся симптомах. Назначение правильного подобного средства во многих случаях будет основано именно на ваших наблюдениях, поэтому от вас требуется предельное внимание и объективность. Обязательным является ведение ежедневных записей. Непременно поинтересуйтесь у гомеопата, какая именно информация о состоянии вашего питомца будет иметь особое значение, и регулярно записывайте все результаты ваших наблюдений. Наблюдайте за физическими симптомами, за активностью и настроением вашей кошки или собаки. Обязательно обращайтесь внимание на периодичность возникновения симптомов (ежедневно, через день, раз в неделю и т. п.) и их зависимость от времени суток или фаз луны. Непременно отметьте и запишите, какие общие факторы влияют на его состояние, как изменяются симптомы, например, при различных погодных условиях, каким образом на его состояние влияет пища, предпочитает ли ваш питомец находиться в одиночестве или жаждет вашего внимания и ласки.

Перед очередной консультацией гомеопата обязательно проанализируйте ваши наблюдения и составьте единый отчет —

ваша беседа с гомеопатом будет гораздо результативнее, если вы представите ему некоторые свои выводы и умозаключения, а не просто ежедневные записи. Если представленной информации будет недостаточно, то гомеопат сам задаст вам необходимые вопросы. При составлении отчета старайтесь быть как можно объективнее и не выдавайте желаемое за действительность – в некоторых случаях все мы склонны «корректировать» реальные факты и видеть улучшение состояния там, где его нет (возможно и обратное – исключительно из-за опасений за здоровье своего питомца). Ни в коем случае не следует скрывать какие-либо важные сведения или наблюдения из естественных человеческих опасений, что кто-то будет осуждать ваши действия – когда речь идет о здоровье вашего питомца, за которое именно вы несете полную ответственность, любая информация может оказаться хорошим подспорьем в выборе подобного гомеопатического средства.

Я настоятельно рекомендую вам прочесть те главы книги, где изложены представления о сущности болезни и излечения. Эта информация поможет вам подготовиться к вопросам гомеопата и объективно на них ответить. Кроме того, вы сможете правильно интерпретировать ответную реакцию организма вашего питомца на назначение гомеопатического средства и сможете четко понять, когда следует подождать, а в каких случаях (например, при усилении симптомов) необходимо еще раз обратиться к гомеопату. В некоторых случаях при усилении симптомов целесообразно подождать день-два – часто ухудшение состояния проходит самостоятельно, без каких-либо дополнительных назначений.

Непременно спросите у гомеопата совета относительно питания, применения дополнительных лекарственных средств и других мероприятий, которые помогут вашему питомцу проявить ответную реакцию на назначение гомеопатического средства. Часто неполноценное питание и недостаточное поддерживающее лечение являются основными факторами, которые ограничивают эффективность холистических методов лечения. Гомеопатический метод лечения в руках специалиста – могучее и эффективное оружие, однако не менее важно, чтобы за счет правильного питания организм своевременно получил энергию для процесса излечения.

ПОМОЩЬ И ПРЕПЯТСТВИЯ К ИЗЛЕЧЕНИЮ

«Любой разумный врач прежде всего постарается удалить соответствующим способом ту причину, которая вызывает и поддерживает болезнь, в также все препятствия к излечению. Далее разумный врач на основе принципов умственной и физической гигиены постарается изменить образ жизни своего пациента таким образом, чтобы он стал более здоровым и организованным. В противном случае результат гомеопатического лечения будет ничтожным и кратковременным»¹.

Stuart Close, M.D.

Питание

Гомеопатический метод лечения способствует активизации собственных сил организма для исцеления от болезней; для этого организм должен получать достаточное количество энергии, заключенной в полноценной пище. Несмотря на то, что в этой книге основное внимание уделяется различным аспектам гомеопатического лечения, все же целесообразно обсудить основные вопросы питания домашних животных.

Полученные в институте знания о принципах питания животных имели отрывочный и (как я сейчас понимаю) ошибочный характер. Нам в основном рассказывали о тех замечательных свойствах, которыми обладает специальная готовая пища для животных и о ее чудесном сбалансированном составе. Считалось, что любые дополнения к пище домашних животных губительным образом скажутся на их здоровье за счет нарушения баланса основных компонентов. Полученные сведения подкреплялись двумя-тремя рекламными проспектами фирм, производящих специальное питание для животных. Неудивительно, что в основном благодаря рекомендациям ветеринаров эти фирмы монополизировали рынок. Сейчас я уверен, что большая часть той информации была в корне неправильной. Более того — во многом из-за применения подобной пищи (скорее коммерческой, чем полезной и сбалансированной!) в последние десятилетия мы отмечаем очевидное ухудшение здоровья

домашних животных.

Вообще питание и его принципы представляют собой весьма щекотливую медицинскую тему. Витрины книжных магазинов до отказа заполнены книгами по питанию; в некоторых из них излагаются здравые и правильные концепции, однако можно встретить и весьма далекие от жизни фантастические идеи. Естественно, что за годы моей практической работы у меня сформировались свои собственные принципы питания животных. С моей точки зрения, большинство теорий питания игнорируют один важный, можно сказать, ключевой аспект проблемы — необходимость индивидуального питания. Каждый живой организм уникален — следовательно, и питание каждого организма должно соответствовать его индивидуальным потребностям (меня удивляет, что многие гомеопаты не придают индивидуализации питания должного значения!). Наилучшей оценкой питания является ответная реакция вашего питомца. Однако при изменении пищевого рациона ответную реакцию следует ожидать не ранее чем через месяц, а у некоторых животных — через 3–6 месяцев. У животных, страдающих тяжелыми заболеваниями, положительное влияние качественных изменений питания иногда сказывается лишь через один-два года.

В основном я сторонник кормления наших питомцев свежей пищей, приготовленной в домашних условиях, так как именно такая пища более всего напоминает ту, к которой животные приспособились в процессе эволюции. Сырое мясо, свежесваренные злаки и овощи в разумных количествах и некоторые дополнительные балансирующие ингредиенты в большей степени, чем другие виды питания, напоминают ту добычу, которой питались хищники в дикой природе. Как для вас, так и для ваших питомцев наиболее полезно питание на основе натуральных экологически чистых продуктов, при выращивании которых не применялись пестициды и специальные лекарственные препараты. Тем самым помимо всего прочего мы сможем способствовать улучшению экологической обстановки на нашей планете.

Если вы по какой-либо причине не можете позволить себе покупать для животных натуральные экологически чистые продукты, то по крайней мере покупайте некоторые экологически чистые субпродукты (например, печень и почки). В обыч-

ных субпродуктах, однако, содержится значительное количество сильнодействующих лекарств в виде антибиотиков и гормонов роста; впрочем, обычное мясо тоже в достаточном количестве содержит подобные ингредиенты. Печень, так же как и мясо, следует давать животным в сыром виде. Некоторые ветеринары, к моему огромному удивлению, приходят в ужас при одной только мысли о кормлении домашних животных сырым мясом. Как будто кто-то видел, как хищники жарят в лесу убитую добычу!

Конечно, некоторые животные из-за нарушений здоровья не смогут сразу перейти к пище, состав которой значительно отличается от привычного. Этот переход должен совершаться медленно и постепенно. Именно в этот момент следует обратить особое внимание на индивидуальную реакцию организма на изменение диеты. Например, некоторые специалисты по питанию не рекомендуют кормить животных кашами из злаков — действительно, у некоторых животных такая пища просто не усваивается. При изменении рациона питания наших питомцев мы всегда должны руководствоваться их ответной реакцией. Лишь отдельные кошки и собаки неплохо себя чувствуют, получая постоянно сухие готовые корма. Однако все животные, которые получают свежее мясо и необходимые дополнительные ингредиенты, выглядят почему-то счастливыми и довольными жизнью — их шерсть блестит и переливается, они активны и деятельны!

За последнее время накопилось огромное количество сведений о тех страшных находках, которые обнаруживаются иногда в составе готовых кормов для животных. Испорченное мясо, прогорклое масло, пораженные болезнями органы животных, даже мясо пойманных и убитых кошек и собак² — вот далеко не полный перечень всего того, что вы предлагаете вашему любимцу съесть на обед или на ужин. Иногда «в составе» готовых кормов обнаруживаются даже фрагменты противоблошиных ошейников! Естественно, что подобная пища содержит и пестициды, и лекарства, которыми перед смертью лечили животных, и инсектициды из противоблошиных ошейников, и многое другое, что вы никогда бы не предложили вашему четвероногому другу, если бы знали об этом. Корпорации, специализирующиеся на изготовлении пищи для животных, из всего из-

влекают выгоду. Наивно было бы предполагать, что такая пища улучшит состояние вашего питомца – скорее наоборот. Ни одно живое существо без полноценной пищи не сможет восстановить здоровье – какой бы метод лечения ни использовался для этого.

В главе «Дополнение» приведены адреса некоторых издательств, которые выпускают специализированную литературу по питанию животных. См. также главу 8 «Система пищеварения», где более подробно изложена информация по питанию кошек и собак. Если в силу обстоятельств вы просто не можете кормить вашего питомца пищей домашнего приготовления, то по крайней мере покупайте ему самые качественные консервированные продукты, которые только можете найти – при изготовлении некоторых из них применяются «человеческие» продукты без красителей, консервантов и усилителей запаха. Старайтесь вообще не покупать сухие корма – лучше консервированные; если же вы используете оба вида готовой пищи, то старайтесь, чтобы доля сухого корма у собак была менее 50%, а у кошек – менее 25%. Почаще давайте вашему питомцу «человеческую» пищу со своего стола, однако ни в коем случае не кормите его гамбургерами, чизбургерами и прочими образцами *fast food*. Вашему питомцу непременно пойдут на пользу все ваши действия по изменению состава питания – пусть хоть дважды или трижды в неделю у него будет полноценный обед или ужин. Даже если вы не сможете обеспечить его стопроцентным полноценным питанием – не сдавайтесь! Делайте, что можете, но не останавливайтесь и идите вперед!

Вакцинация

Помимо питания на здоровье вашего питомца может оказать значительное влияние вакцинация. Это настолько важный фактор, что одну из глав этой книги я полностью посвятил именно вакцинации и ее последствиям (см. гл.16 «Вакцинация»). Часто вакцинация блокирует все усилия по восстановлению здоровья вашего питомца. В некоторых случаях с помощью гомеопатических средств можно уменьшить вредное влияние вакцин, однако при продолжении серии прививок лечение последствий вакцинации может стать неэффективным. Я пришел к подобным выводам после многолетних раздумий;

как и большинство ветеринаров, я раньше был уверен в замечательной способности вакцин предотвратить заражение некоторыми болезнями. Однако по мере накопления практического опыта моя точка зрения на вакцинацию постепенно изменилась — я пришел к выводу, что вакцинация вызывает значительно больше заболеваний, чем предупреждает.

Особое место занимает вопрос относительно вакцинации против бешенства. Будучи ветеринаром, я обязан соблюдать закон и не могу рекомендовать своим клиентам отказаться от антирабических прививок. В каждом штате страны имеется специальный закон, в котором четко расписана периодичность введения антирабической вакцины. Таким образом, отказ от вакцинации против бешенства вашего питомца может повлечь за собой как медицинские, так и юридические последствия. Обычно при введении антирабической вакцины создается пожизненный иммунитет, по крайней мере после второй вакцинации. Именно поэтому ежегодные вакцинации важны с юридической точки зрения, но бессмысленны с медицинской (см. гл.16 «Вакцинация»). Можно лишь рекомендовать по мере сил бороться за изменение этого закона в каждом штате. За некоторыми исключениями (некоторые медицинские сообщества требуют проведения у домашних животных и других прививок, хотя, насколько мне известно, ни в одном из штатов нет подобного закона), все остальные виды вакцинаций делаются по вашему выбору. По моему убеждению, следует избегать введения всех вакцин (кроме положенной по закону антирабической вакцины), так как они не предупреждают, а скорее вызывают различные заболевания.

Образ жизни

Одним из препятствий к лечению вашего питомца может быть его образ жизни. Мы должны научиться уважать интересы этих славных созданий и стараться предвидеть те последствия наших действий, которые могут отразиться на их жизни. Прежде чем взять в дом нового обитателя, вы должны реально оценить свои возможности — хватит ли у вас времени, сил, способности и возможности ухаживать за ним в течение всего того времени, что он будет жить в вашей семье. Не следует принимать непродуманных импульсивных решений, так

как их последствия будут сказываться в течение долгого времени. Есть ли у вас отдельное помещение для содержания собаки крупной породы? Сможете ли вы отпустить кошку или собаку погулять на улице? Если вы планируете, что ваш питомец будет жить вне дома, будет ли ему там удобно и хорошо?

Мы хорошо представляем себе, как влияет депрессия на человека, и знаем, что именно из-за депрессии у людей возникает масса проблем со здоровьем. Однако нам даже трудно себе представить, что в такой же степени от эмоциональных проблем страдают и наши питомцы. При осмотре больных животных я всегда спрашиваю об условиях их жизни и о тех стрессах, которые они испытывают. Постепенно я научился предвидеть и ответы — иногда они меня просто ошеломляют. Мне пришлось много раз наблюдать, как после смерти одного из членов семьи у собаки развивался диабет. Неоднократно я видел, насколько животные тяжело переживают развод в семье. Не думайте, что домашние животные безразличны к нашей жизни и устойчивы к воздействию тех же самых стрессов, от которых страдаем мы. Это не так. На самом деле они впечатлительны и необычайно восприимчивы.

Укреплять здоровье, а не бороться с болезнью

Итак, в чем же заключается рецепт здоровья у животных? Хорошая еда, любящая семья, благоприятные возможности для развития и развлечений — в общем, все как у нас. Мы не должны этому удивляться. Если вы видите, что ваш питомец заболел, то следует пересмотреть не только его, но и свой образ жизни.

Не менее важно стремление сохранить здоровье за счет безопасных методов; не следует искусственно создавать в организме болезнь, чтобы потом предупредить ее. Вопрос о вакцинации вызывает много споров и значительное сопротивление. Однако мой практический опыт ежедневно убеждает меня, насколько велика опасность вакцинации. По моему мнению (которое разделяют многие из моих коллег), мы должны обуздать и ограничить применение вакцин, если хотим сохранить здоровье домашних животных. Кроме того, важно использовать сильнодействующие лекарства только по строгим показаниям — т. е. в тех ситуациях, когда их применение действительно

необходимо для спасения жизни. Распространенная практика назначать антибиотики независимо от степени тяжести состояния действительно очень опасна, так же как их назначение при вирусных инфекциях. Надо максимально использовать методы укрепления здоровья, а не сосредоточивать основное внимание на методах борьбы с внешней угрозой. Есть только один действенный метод укрепления здоровья — это укрепление организма. Деструктивные методы, даже если они предназначены для полного устранения врага, проникшего в организм, остаются разрушительными по своей сути и дают кратковременный эффект.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

У большинства животных, которых приводят ко мне на прием, имеются тяжелые заболевания, по поводу которых они постоянно получают те или иные лекарства. Мешает ли это успешному гомеопатическому лечению или нет — вопрос спорный; однозначного ответа на него у гомеопатического сообщества нет. Думаю, что все зависит от особенностей индивидуальной ответной реакции. В некоторых случаях прием гомеопатических средств на фоне приема аллопатических препаратов представляется малоэффективным; в других случаях создается впечатление, что одно другому не мешает. Возможно, что у некоторых пациентов вследствие болезни развивается повышенная чувствительность организма.

В общем, картина заболевания всегда гораздо более четкая, если применяется какой-либо один метод лечения. Это касается и акупунктуры — в некоторых случаях этот мощный холистический метод мешает воздействию гомеопатических средств (и наоборот). Все воздействия, меняющие ход болезни, изменяют ее внешние проявления. Поскольку основой выбора подобного средства в гомеопатии является оценка симптомов в ответ на лечение, изменение этих симптомов под влиянием других методов лечения, естественно, изменяет и часто затрудняет эту оценку. Именно трудности в интерпретации ответной реакции организма, а не интерференция лекарств, является основным препятствием применения двух методов лечения од-

новременно. При более стабильной ситуации в некоторых случаях вполне возможно одновременное применение двух методов лечения.

Напрашиваются два вывода. Во-первых, истинная картина симптомов болезни выявляется только при отсутствии супрессии симптомов. Для выбора подобного гомеопатического средства необходима истинная картина болезни, в то же время при применении аллопатических лекарств картина симптомов изменяется. Во-вторых, при применении супрессивного лечения видоизменяется ответная реакция на гомеопатическое средство; иногда очень трудно разобраться, какие изменения в организме происходят вследствие приема гомеопатического лекарства, а какие – вследствие приема аллопатических препаратов. Отсутствие ответной реакции может означать либо некорректное гомеопатическое средство, либо влияние аллопатического препарата. *Для того чтобы понять ответную реакцию организма на лечение, необходимо знать, какой метод лечения вызвал эту ответную реакцию; именно поэтому не следует применять одновременно гомеопатический, аллопатический или какой-либо еще метод лечения.* Это особенно важно в тех случаях, когда необходимо изменить только часть лечения – при одновременном применении разных методов лечения этот вопрос решить практически очень сложно.

В некоторых случаях, например при поражении кожи, отмена аллопатических сильнодействующих препаратов (чаще всего стероидов) приводит к выраженному усилению дискомфорта пациента. Именно поэтому так часто встречается нежелание прекратить применение стероидных препаратов несмотря на то, что во многих случаях стероиды и являются одним из основных препятствий к излечению. Стероиды подавляют функцию иммунной системы – т. е. той системы, которую мы стараемся активизировать для успешного процесса излечения. Подобным образом на организм воздействуют и антибиотики – таким образом, их отмена оказывает на организм положительное воздействие.

Как-то раз на съезде ветеринаров я услышал дискуссию относительно парадоксальной способности антибиотиков оказывать воздействие на вирусную инфекцию верхних дыхательных путей у кошек. (Антибиотики не оказывают прямого вли-

яния на вирусы, однако часто назначаются при вирусных инфекциях и у человека, и у животных — возможно, из-за того, что противовирусное лечение просто недоступно). Как и следовало ожидать, это парадоксальное влияние антибиотиков сильно озадачило традиционных ветеринаров. С точки зрения аллопатической медицины объяснить этот феномен невозможно. Однако с позиций теории гомеопатии этот феномен вполне объясним. Дело в том, что в организме введение антибиотиков вызывает лекарственную болезнь (т. е. изменение состояние организма под действием лекарства), которая оказывает на организм более сильное влияние, чем вирусная инфекция. Когда действие антибиотиков прекращается, то вновь появляются симптомы вирусной инфекции. Таким образом, антибиотики препятствуют естественной борьбе иммунной системы с вирусной инфекцией и замедляют процесс излечения (см. гл. 2 «Природа болезни»).

Кроме того, некоторые антибиотики, в частности тетрациклины, обладают противовоспалительным (иммуносупрессивным) действием, прямо влияя на процесс излечения. Именно эти свойства тетрациклинов способствуют частым сообщениям о болезни Лайма (*Lyme*). Болезнь Лайма представляет собой инфекционное поражение суставов вследствие укусов клещей, вызывающее хромоту; тетрациклины являются средством выбора при лечении этого заболевания. На самом деле болезнь Лайма встречается редко, однако сообщения об этой болезни можно встретить довольно часто. Это связано с тем, что назначение тетрациклина у животных с хромотой и поражением суставов неинфекционной этиологии (т. е. не имеющей отношения к настоящей болезни Лайма) уменьшает боли за счет противовоспалительного действия. Таким образом, неправильная интерпретация действия антибиотиков тетрациклиновой группы и провоцирует сообщения об успешном излечении массовых случаев болезни Лайма.

В тех случаях, когда ко мне на лечение поступают животные, которым постоянно дают какие-либо аллопатические препараты, я прежде всего думаю о том, нельзя ли эти препараты отменить. Отмена аллопатических средств (при возможности, конечно) и есть фактически мое первое назначение. Если же состояние животных не позволяет сразу же отменить аллопа-

тические препараты, то я назначаю гомеопатическое средство и постепенно уменьшаю дозу аллопатического препарата до разумного минимума. Резкая отмена препаратов в большинстве случаев нецелесообразна, так как она является стрессовым фактором, оказывающим влияние на деятельность некоторых систем организма — именно поэтому аллопатические средства следует отменять постепенно. Сильнодействующие аллопатические препараты оказывают супрессивное действие на функцию ряда важных систем организма, а медленная отмена их позволяет постепенно восстановить функцию. Гомеопатические средства помогают восстановлению этих функций, однако из-за сильного действия аллопатических препаратов я обычно назначаю в подобных случаях низкие потенции и частые приемы. При такой методике даже на фоне приема аллопатических препаратов гомеопатия срабатывает. После улучшения состояния все аллопатические лекарства можно отменить.

Конечно, в идеальном случае лечение большинства заболеваний у животных следовало бы проводить только с помощью гомеопатических средств; однако практически это невыполнимо и нередко даже опасно. Если есть риск, что отмена аллопатического препарата ухудшит состояние животных — начинайте гомеопатическое лечение на фоне аллопатического. Если вам удастся подобрать подобное гомеопатическое средство, то его воздействие скорее всего поможет организму справиться с вредным влиянием традиционных препаратов. Чаще всего через какое-то время удастся либо существенно уменьшить дозу аллопатического препарата, либо даже полностью его отменить. В конце концов, если животные действительно полностью выздоравливают, то не все ли равно, благодаря чему произошло выздоровление — это уже вопрос чисто академического характера.

Если ваш питомец постоянно получает аллопатические препараты, то, прежде чем отменять их, непременно посоветуйтесь с ветеринаром — именно он сможет вам точно сказать, какое лекарство следует отменять постепенно, а какое можно отменить сразу же. Кроме того, ветеринар поможет вам определить, не является ли действие аллопатического препарата частью картины болезни, или уменьшение дозы препарата вызывает появление других симптомов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 4

- * Очень важно распознать те случаи, когда лечение вашего питомца дома лежит за пределами ваших возможностей и способностей — в этом вам поможет информация, изложенная в разделе «В каких случаях обращаться за ветеринарной помощью», а также главы, посвященные описанию заболеваний отдельных систем. Ваш питомец сможет получить наилучшую помощь только в том случае, если вам удастся наладить тесное сотрудничество с ветеринаром.
- * Это не означает, что вы не имеете права выбирать тот метод лечения, который вы считаете наиболее приемлемым — ведь именно на вас лежит ответственность за его здоровье. Если это необходимо для лечения ваших домашних животных, то при необходимости следует применять как холистические, так и традиционные методы.
- * Излечению заболеваний у домашних животных может препятствовать неполноценное питание, частые необдуманные вакцинации, аллопатические сильнодействующие препараты, стрессовые факторы, а также одновременное применение разных методов лечения. Особенно велика роль первых четырех факторов. Без соответствующей поддержки жизненной силы организма многие животные просто не в состоянии дать ответную реакцию на лечение. Оптимальным вариантом является применение в данный период времени только одного метода лечения, однако практически часто это или невозможно, или невыполнимо. В некоторых случаях приходится применять гомеопатический метод лечения одновременно с другими методами, однако ответная реакция на лечение может быть вялой и замедленной; кроме того, в подобных ситуациях возникают трудности адекватной оценки ответной реакции организма. Если вы одновременно применяете у вашего питомца более одного метода лечения, то оценка симптомов может быть достаточно сложной — именно в этой ситуации особенно важно иметь возможность проконсультироваться со специалистами.

Применение гомеопатии в домашних условиях

Анализ симптомов заболевания
и выбор подобного средства

Конституциональное назначение
в сравнении с острым назначением

Как работать с главами,
посвященными лечению отдельных
заболеваний

Как обращаться с гомеопатическими
средствами и как правильно применять
их у животных

Дозы, потенции и повторные
приемы средства

Наблюдение за динамикой
заболеваний у животных

Краткое содержание главы 5

Данная глава посвящена практическому применению гомеопатических средств. Надеюсь, что материал первых четырех глав помог вам разобраться в сущности теоретических положений и принципов гомеопатии, на основе которых вы сможете успешно лечить ваших домашних животных. В этой главе мы рассмотрим ваши конкретные действия по выбору подобного средства, соответствующих потенций и доз гомеопатических лекарств.

Процесс выбора гомеопатического средства начинается с выявления основных симптомов заболевания у вашего питомца, записи этих симптомов и их анализа. После того как у вас сложится более или менее связная картина заболевания, ваш следующий шаг должен заключаться в чтении материала соответствующей главы, сравнении симптомов с картиной гомеопатических средств и выборе подобного лекарства. Несомненно, что одним из самых важных моментов является также и наблюдение за динамикой заболевания у вашего питомца после приема им подобного препарата.

АНАЛИЗ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВЫБОР ПОДОБНОГО СРЕДСТВА

Гомеопатический метод лечения существенно отличается от аллопатического; именно поэтому наиболее трудным и ответственным этапом лечения является выявление симптомов у пациента, их запись и анализ. С точки зрения гомеопатии *болезнь представляет собой нечто, что поражает организм и становится его неотъемлемой частью*; таким образом, наша основная задача заключается в поиске такого гомеопатического средства, картина симптомов которого будет соответствовать именно индивидууму, а не просто болезни. Конвенциональная медицина в отличие от гомеопатии основное внимание обращает на типичные проявления болезни в организме, а не на индивидуальные особенности пациента, страдающего данной болезнью. Осознание этого коренного различия и переход к гомеопатическим принципам лечения требует времени и определенных умственных усилий.

Как же мы можем распознать индивидуальные особенности

каждого пациента? Рассмотрим в качестве примера, как мы узнаём своих друзей и знакомых. Этот процесс происходит почти инстинктивно, на основе идентификации особенных черт лица; однако описать словами их отличия от других людей достаточно сложно. В сущности, черты лица у всех людей одинаковы, однако выглядим мы все по-разному. Внутри каждой расы можно выделить несколько характерных типов внешности, однако эти различия очевидны лишь для тех, кто знаком с основными чертами расы в целом. Вначале индивидуумов другой, мало знакомой нам расы мы с трудом отличаем друг от друга; их идентификация невозможна до тех пор, пока мы не познакомимся с характерными чертами этой расы.

Нечто подобное происходит и с распознаванием болезни. Например, у собак, больных диабетом, очень много общих симптомов, в то же время у каждой из них имеется ряд индивидуальных особенностей. При анализе симптомов в рамках гомеопатии нашей основной задачей является не распознавание стереотипных симптомов, общих для всех пациентов с данным заболеванием, а поиск и выявление особых симптомов, которые имеются только у данного пациента. Другими словами, нам необходимо знать общие для всех пациентов симптомы болезни и индивидуальные симптомы каждого пациента; только потом мы можем отделить общие и особые симптомы. Индивидуальные особые симптомы в гомеопатии называются «характерными», так как они отражают проявления болезни у отдельного пациента.

Например, у всех животных с диабетом выявляется высокий уровень глюкозы в крови, вследствие чего развивается жажда и увеличение количества мочи. В типичных случаях отмечается также усиление аппетита. В то же время у одной собаки с симптомами диабета отмечается выраженное стремление при плохом самочувствии остаться в одиночестве, а другая собака с симптомами диабета буквально льнет к членам семьи, где она живет. Или, например, у одной кошки с диабетом развивается волчий аппетит и регургитация сразу же после еды, тогда как другая кошка с диабетом ест очень мало, но после каждой еды у нее появляется диарея. У всех этих животных имеются явные признаки диабета с общими для всех симптомами в виде высокого уровня глюкозы в крови, жажды и выделе-

ния значительного объема мочи. Индивидуальность этих животных проявляется в особых, характерных симптомах. *Именно по характерным симптомам — не по общим для всех симптомам болезни, а по индивидуальным проявлениям болезни — можно найти ключ к выбору подобного гомеопатического средства.* Особенно важными в этом отношении являются симптомы, которые проявились примерно в то же время, что и заболевание.

Кроме того, к характерным симптомам относятся так называемые «странные, редкие и особенные» симптомы. Эти симптомы представляют собой особенную группу симптомов, позволяющую быстро идентифицировать индивидуальность. Часто эти симптомы даже в некоторой степени противоречат остальным — например, у собаки может быть холодная на ощупь кожа, но она предпочитает находиться на холоде; или у кошки отмечается тошнота или рвота, которые облегчаются во время еды. Такие «редкие, странные и особенные» симптомы выявляются далеко не у всех больных животных; однако эти симптомы для гомеопата представляют особую ценность, так как значительно облегчают поиск подобного средства.

Однажды мне пришлось лечить кота Спарки с эрозией в области носа, которая внешне напоминала изъязвление. Я назначил Спарки одно за другим два средства, однако без особого результата, так как вначале не мог выявить ни одного характерного симптома. Как-то раз совершенно случайно в разговоре выяснилось, что кот постоянно трет нос лапой; таким образом рана на носу, которую я вначале принимал за изъязвление, оказалась следствием буквально ожесточенного растирания кожи. В Реперториуме я нашел рубрику «Пощипывание кончика носа, которое уменьшается при растирании» (рубрика в Реперториуме представляет собой отдельный симптом с перечислением соответствующих гомеопатических средств, в картине которых имеется этот симптом). В этой рубрике было отмечено только одно лекарство, которое излечивает это состояние, — *Belladonna*. Чем необычнее симптом, тем с большей вероятностью он указывает на подобное гомеопатическое средство, при условии, конечно, что это средство хорошо известно и описано в гомеопатической литературе. Обычно гомеопаты при выборе подобного средства никогда не ориентируются

только на один, пусть даже редкий или необычный симптом — картина гомеопатического средства должна соответствовать полной картине симптомов болезни. Однако в данном случае других симптомов у кота Спарки просто не было, поэтому я назначил ему *Belladonna*, после чего Спарки быстро выздоровел (такие случаи в гомеопатии называются «односторонние». Лечение их может быть достаточно сложным, если не посчастливится выявить особый, «странный» симптом).

Странный или редкий симптом в некоторых случаях может и не иметь прямого отношения к основным жалобам, как было, например, при лечении собаки Джесси. Ее привели ко мне на консультацию по поводу значительных неврологических нарушений в виде пареза задних конечностей и неустойчивой походки, из-за чего она не могла бегать и играть со своими собачьими приятелями. После двух консультаций выявился необычный симптом, который не имел прямого отношения к поражению задних конечностей — во время еды у Джесси изо рта выпадала пища. В Реперториуме в разделе «Полость рта» в соответствующей рубрике приводится только одно гомеопатическое средство — *Argentum nitricum*. Помимо необычного симптома другие симптомы Джесси (парез задних конечностей с неустойчивостью походки) также соответствовали картине симптомов этого средства. После назначения *Argentum nitricum* состояние собаки явно и значительно улучшилось.

Этот случай впечатляющий, однако его нельзя назвать типичным. Чаще всего у животных можно выявить группу менее ярких симптомов, среди которых необходимо найти главные и наиболее важные. После выявления всех характерных симптомов и получения более или менее полной картины заболевания мы переходим к следующему этапу — поиску подобного гомеопатического средства. В процессе выбора лекарства гомеопаты обращаются к Реперториуму, где в каждой рубрике перечисляются гомеопатические средства, в картине которых имеется тот же симптом, что и у данного пациента. Следующий этап посвящается чтению полной картины каждого возможного средства в *Materia Medica* и определению того препарата, картина симптомов которого как можно более полно отражает картину симптомов, выявленную у пациента. Если ни одно из возможных средств не подходит полностью симптомам данно-

го пациента, то непременно следует проанализировать симптомы еще раз — необходимо удостовериться, что при анализе картины заболевания мы не пропустили какого-либо важного характерного симптома и в то же время не придали особого значения одному из общих симптомов (общие симптомы присутствуют в картине всех животных с данным типом патологии, как, например, жажда у всех собак при диабете). Придание особой важности общим симптомам является одной из наиболее распространенных ошибок начинающих гомеопатов.

Эта книга не является настоящим Реперториумом, поэтому метод выбора подобного средства для лечения вашего питомца здесь несколько иной. Основные этапы выбора подобного лекарства те же самые — выявление и анализ картины симптомов, определение характерных симптомов, чтение той главы книги, в которой описывается соответствующее заболевание, чтение раздела с описанием гомеопатических средств при данном заболевании, выписывание возможных подобных средств, затем изучение полной картины всех выписанных вами средств в *Materia Medica* и, в конечном итоге, определение подобного препарата для лечения вашего питомца. Отличие в том, что в каждом разделе приводятся средства, имеющие в своей картине один общий симптом, а при описании гомеопатических лекарств приводятся особенности картины каждого препарата, которые позволяют остановить выбор на одном из них.

Все этапы ваших действий по выбору соответствующего средства можно проследить на примере одного случая. У английской овчарки Лили после посещения парикмахера развился специфический трахеобронхит с приступами глубокого сухого кашля. В остальном поведение Лили оставалось прежним — у нее сохранялась активность, живость характера и хорошее настроение; температура также была нормальной. Собака кашляла так, что создавалось впечатление, будто что-то застряло у нее в горле. Отмечалась также повышенная чувствительность глотки — малейшее прикосновение к ней или лай провоцировали приступ кашля. Приступ кашля начинался и тогда, когда Лили укладывалась на свое место. В течение недели ей проводили антибиотикотерапию, однако без всякой динамики. В этом случае почти все выявленные симптомы были общими для трахеобронхита у собак — глубокий сухой кашель,

возникающий как будто от инородного тела в глотке, и повышенная чувствительность глотки к прикосновению. Однако чувствительность глотки была выражена значительно сильнее, чем обычно у собак с трахеобронхитом; кроме того, характерным симптомом был кашель при переходе в положение лежа. Именно эти характерные симптомы указывали на особенность реакции организма собаки на заболевание. Подобным лекарством для Лили оказалась *Drosera*; назначение этого препарата позволило быстро восстановить ее здоровье.

На этом примере мы можем практически рассмотреть все этапы выявления и анализа симптомов. По-первых, вам необходимо отметить и записать все изменения состояния, которые произошли у животных с момента начала заболевания, особо отметив те симптомы, которые в первую очередь привлекают ваше внимание. Затем следует пройти по всем симптомам от головы до хвоста и убедиться, что ни одного из симптомов вы не пропустили. Непременно обратите внимание на физиологические отправления (моча, стул), аппетит, чувство жажды, отношение к теплу и холоду, выделения и т. п. Особое внимание надо обратить на изменения поведения, но не забывайте, что значение имеют лишь те изменения, которые возникли одновременно с заболеванием. Все симптомы заболевания следует записать и постараться сгруппировать их в общие и характерные. Поскольку вы не специалист по ветеринарии, то соотнесите симптомы болезни вашего питомца с симптомами собственного похожего заболевания, возможно также с симптомами похожих заболеваний у ваших родственников, друзей и т. п. Не исключено, что вам понадобится дополнительная информация из книг. Постарайтесь разобраться, какие симптомы являются общими для всех животных с данным заболеванием, а какие отмечаются только у вашего питомца. Затем подчеркните характерные симптомы и один-два общих симптома, которые выражены отчетливо и характеризуют состояние вашего пациента — таким образом, в результате проведенной работы у вас получится цельная картина заболевания. В этой картине отражены как симптомы болезни (т. е. общие симптомы), так и симптомы, отражающие индивидуальную реакцию организма вашего питомца на болезнь (т. е. характерные симптомы).

Понимание цельной картины болезни позволит вам перейти к чтению соответствующей главы с описанием гомеопатических препаратов с той же картиной симптомов, что и у вашего питомца, и выбору подобного средства для лечения.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В СРАВНЕНИИ С ОСТРЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ

Термин «конституциональное лечение и назначение» широко применяется в гомеопатии, однако смысл его иногда не совсем понятен. Дело в том, что нередко разные авторы трактуют этот термин по-разному. Тем не менее эта концепция очень важна и нуждается в специальном разъяснении.

Надеюсь, что вы уже понимаете, что при правильном гомеопатическом назначении принимаются во внимание не только основные признаки заболевания (кашель, рвота и т. п.), но и общее состояние организма в момент заболевания. В понятие «общее состояние организма» включаются как физические симптомы, так и психоэмоциональное состояние пациента и особенности его поведения. Например, подобное гомеопатическое средство для лечения собаки с диареей, сопровождающейся выраженной жаждой, будет отличаться от гомеопатического средства для лечения другой собаки, у которой диарея протекает совсем без жажды — хотя, казалось бы, основной симптом (диарея) идентичен у обеих собак.

Как при лечении острых, так и при лечении хронических заболеваний это весьма существенный момент гомеопатического назначения. При острых заболеваниях, однако, болезнь чаще всего располагается поверхностно, все изменения в организме минимальны и сосредоточены вокруг основного симптома. Конечно, можно заметить и некоторые индивидуальные особенности течения острого заболевания, причем у некоторых животных они почти незаметны, но иногда выражены достаточно демонстративно. Кроме того, острое заболевание протекает за короткий промежуток времени; гомеопатическое назначение при остром заболевании должно исходить из тех симптомов, которые успели развиться именно за это короткое время. Таким образом, *особенности поведения животных при остром заболева-*

нии практически не влияют на назначение гомеопатического средства, за исключением тех случаев, когда эти особенности развиваются в процессе острого заболевания.

«Острое» назначение (назначение средства при остром заболевании) определяется заболеванием, которое лишь до некоторой степени затрагивает организм в целом. В отличие от острого при хроническом заболевании отмечается глубокое проникновение болезни в организм; болезнь становится частью его сущности. Индивидуальность организма проявляется в особенностях его ответной реакции на болезнь. Чем поверхностнее располагается заболевание, тем больше гомеопатическое средство должно соответствовать болезни. Чем глубже влияние заболевания на организм животных, тем больше назначение должно соответствовать сущности индивидуума. Именно здесь располагается пограничная зона между острым и конституциональным назначением.

Назначение конституционального средства основано на концепции, что болезнь по сути своей является ответной реакцией организма на воздействие внешних стрессовых факторов — следовательно, конституциональное назначение оказывает на организм более глубокое влияние. Ответная реакция на стресс проявляется у различных индивидуумов (неважно, человек ли это или животное) в виде продукции различных симптомов, отражающих внутреннюю сущность этих индивидуумов. Эта ответная реакция обусловлена конституцией, другими словами, сущностью отношений индивидуума с окружающим его миром. В этих случаях гомеопатическое средство, назначение которого основано на физических симптомах, не окажет существенного влияния, так как оно будет вступать в «диалог» с болезнью, а не с индивидуальной ответной реакцией. Следовательно, конституциональное назначение должно быть направлено на гармонизацию отношения индивидуума с окружающим миром — только после восстановления нормальных отношений организма с внешним миром возможно победить и полностью устранить болезнь. При гармоничных отношениях индивидуума с внешним миром у него отпадает необходимость в создании специальной защиты, что и позволяет организму полностью излечиться.

В действительности острое и конституциональное назначе-

ние не противопоставляются друг другу — каждое из них применяется в свое время и в своей ситуации. Часто болезнь представляет собой слияние внешнего стресса и ответной реакции на него. Например, пищевые отравления у большинства индивидуумов возникают вследствие воздействия похожих внешних факторов — именно поэтому у большинства пациентов так эффективно назначение *Arsenicum*. С эмоциональным стрессом — например, с горем — каждый справляется по-своему; следовательно, для лечения заболеваний, возникающих вследствие горя, каждому пациенту требуется подобрать свое индивидуальное гомеопатическое средство.

Методика, по которой проводится выбор острого или конституционального препарата, практически одна и та же — необходимо выявить и проанализировать симптомы болезни у животных и найти то гомеопатическое средство, в картине которого имеются такие же симптомы. Однако в некоторых случаях препарат, выбор которого проводился в соответствии с симптомами текущего состояния, не излечивает болезнь. В этой ситуации для лечения требуется средство, которое соответствует более глубоким особенностям индивидуума. Иногда только после анализа всей жизни животного мы сможем выявить тот фактор, который оказал или оказывает в настоящее время глубокое влияние на организм, и выявить ответную реакцию на воздействие этого фактора в различных ситуациях. Преимущественное влияние на ответную реакцию организма в целом оказывает конституция, в частности, именно конституция влияет на реакцию на острое заболевание. Таким образом, в некоторых случаях для излечения организму требуется конституциональное назначение, а не острое. У животных, которым требуется назначение конституционального средства, ответная реакция организма на внешние стрессовые факторы не способствует сохранению здоровья, а лишь благоприятствует возникновению болезни.

Развивая далее эту мысль, можно сделать вывод, что назначение конституционального препарата может быть полезным в течение всей жизни животных. Редкие приемы конституционального средства при развитии симптомов болезни могут на некоторое время задержать ее развитие. Так мы можем говорить, например, о кошке *Phosphorus* или о собаке *Sulphur*. Од-

нако, по моему мнению, в данном вопросе очень многое зависит от индивидуальных особенностей. Некоторые гомеопаты уверены, что каждому пациенту необходимо подобрать конституциональное лекарство и периодически назначать его в течение всей жизни. Другие гомеопаты считают, что в течение жизни конституциональное средство может меняться. С моей точки зрения, право на существование имеют оба варианта. Некоторым животным действительно раз от разу помогает их конституциональное лекарство, однако у других с течением времени наблюдается изменение картины симптомов, вследствие чего приходится искать другой конституциональный препарат. Так появилась концепция «уровней» болезни. После излечения одного уровня болезни с помощью гомеопатического средства может «всплыть» другой уровень, который потребует назначения другого препарата; или, например, животным, которым раньше требовалось назначение конституционального средства, может потребоваться острое гомеопатическое лекарство.

Гомеопатическая наука потому часто так трудна для понимания, что встречается слишком много разнообразных ситуаций, в которых подчас сложно разобраться; иногда незыблемые принципы гомеопатии даже кажутся противоречивыми. Я думаю, что читателям моей книги нет необходимости в таком глубоком проникновении в суть гомеопатии, так как вам следует сосредоточиться на лечении только острых заболеваний. Я постарался объяснить, почему в некоторых случаях острое назначение не приводит к желаемому результату и почему возникает необходимость в назначениях конституциональных средств. Подобные случаи означают, что у вашего питомца развивается хроническое заболевание – другими словами, его конституциональная ответная реакция не способствует поддержанию его здоровья. В такой сложной ситуации, однако, только ветеринар-гомеопат сможет проанализировать симптомы и их изменение в течение всей жизни вашего питомца и затем подобрать необходимое конституциональное средство.

КАК РАБОТАТЬ С ГЛАВАМИ, ПОСВЯЩЕННЫМИ ЛЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В этом разделе мы рассмотрим методику работы с теми главами книги, в которых описываются заболевания отдельных органов и систем. В каждой главе, с 6-й по 14-ю кратко излагаются основные функции отдельных систем организма, наиболее распространенные заболевания и гомеопатические средства, которые применяются для лечения этих заболеваний. Это не совсем классический подход к частной гомеопатии, однако в данном случае этот подход позволяет рассмотреть основные симптомы и назначение гомеопатических средств. В главе 15 «Показания к применению гомеопатических средств при различных состояниях» рассматривается лечение тех заболеваний и травматических повреждений, которые по разным причинам не были включены ни в одну из глав; разделы расположены в алфавитном порядке и каждый из них является самостоятельным.

Каждая глава, посвященная лечению животных, содержит специфическую информацию по отдельным заболеваниям. Вначале вам следует определить сущность заболевания вашего питомца и прочесть соответствующую главу книги. В ней содержится информация, которая поможет вам определить степень тяжести состояния и необходимые лечебные мероприятия. В каждой главе перечисляются те симптомы, которые указывают на необходимость специальной ветеринарной помощи. При описании некоторых заболеваний указываются те мероприятия, которые требуется осуществить в зависимости от степени тяжести состояния. Если же у вас есть хоть какие-то сомнения в правильности ваших действий, то, естественно, надо сразу же обращаться за ветеринарной помощью. Самостоятельное гомеопатическое лечение возможно лишь в тех случаях, когда ветеринар заверит вас, что ничего угрожающего в состоянии вашего питомца он не выявил. Непременно ознакомьте ветеринара с планом ваших действий и держите его в курсе всех изменений — ветеринар должен быть вашим союзником в поддержании здоровья вашего питомца; как и в любом начинании, победу обеспечивают лишь соединенные усилия.

Если у вас есть полная уверенность, что заболевание вашего

питомца не приведет при домашнем лечении к каким-либо негативным последствиям, то следующий ваш шаг должен заключаться в оценке индивидуальных симптомов заболевания, на основании которых вы будете подбирать подобное гомеопатическое средство для лечения.

Прежде чем вы перейдете к выбору подобного средства, вам следует ознакомиться с теми дополнительными методами лечения, которые могут ускорить выздоровление вашего пациента. К таким методам относятся, например, теплые компрессы при абсцессах, промывание ушей, назначение соответствующих витаминов и фитопрепаратов. В каждой главе я указываю дозы и способ применения всех дополнительных лекарств. Расчет дозы дополнительных компонентов лечения проводится на основе веса животных в фунтах, так, как это принято в традиционной ветеринарии (1 фунт равен 373,2 г. – *Прим. перев.*), что позволит вам легко вычислить дозу лекарства, необходимую вашему питомцу. Вполне допустимы некоторые отклонения от стандартной дозы; в целом животным малого веса требуется количество аллопатического лекарства на фунт веса несколько большее, чем животным большого веса, как, например, собакам крупных пород. В некоторых случаях дозы аллопатических лекарств и фитопрепаратов для кошек я привожу отдельно, что связано с повышенной чувствительностью организма этих животных.

По моему глубокому убеждению, фитопрепараты у животных следует применять в течение короткого периода времени; при длительном приеме в организме животных могут накапливаться токсические вещества, иногда входящие в их состав. Обычно я рекомендую применять фитопрепараты в течение 3–4 недель с последующим перерывом; при необходимости через неделю прием фитопрепарата можно возобновить. Если на протяжении нескольких подобных циклов вы не отмечаете положительного действия фитопрепарата, то его следует отменить. Некоторые фитопрепараты, например желтокорень канадский (*Goldenseal*), обладают сильным действием на организм, поэтому я всегда рекомендую проводить короткий курс лечения; другие же фитопрепараты, например одуванчик, достаточно безопасны. Перед применением фитопрепарата необходимо проконсультироваться с фитотерапевтом или почитать справочник.

После того как вы прочитаете соответствующую главу и определитесь с особенностями наблюдения и назначения дополнительных лекарств, можно приступать к выбору подобного гомеопатического средства. Не забывайте, что воздействие препарата на организм намного эффективнее, если оно будет соответствовать не только основному симптому, но и другим, включая симптомы со стороны психоэмоциональной сферы. В процессе выбора подобного средства все те симптомы, которые изменяются в связи с основным симптомом, требуют внимательного анализа и подробного рассмотрения.

Для каждого состояния перечисляются несколько возможных гомеопатических лекарств. Картина симптомов у этих средств несколько отличается друг от друга, но я надеюсь, что вам удастся найти среди них то лекарство, которое будет соответствовать симптомам заболевания вашего питомца. После того как вы найдете одно-два подходящих средства, вам следует прочитать более полную картину каждого из них в *Materia Medica*.

Только после изучения картины средства по *Materia Medica* вы сможете принять окончательное решение относительно средства, которое будет принимать ваш питомец.

Я настоятельно рекомендую вам всегда читать полное описание гомеопатического средства в *Materia Medica*, не ограничиваясь его описанием в соответствующей главе, — это не только внесет полную ясность в ваш выбор, но и ознакомит вас с другими характерными чертами выбранного средства. Постепенно гомеопатические препараты станут вашими добрыми друзьями, готовыми прийти на помощь по первому зову. Чем лучше вы будете понимать их особенности, тем легче вам будет определить, кого же из них пригласить на помощь в данную минуту. Со временем вы приобретете способность ориентироваться во многих ситуациях и накопите свой собственный опыт назначения гомеопатических лекарств. Но и тогда регулярное чтение *Materia Medica* вам не повредит. Даже опытные профессиональные гомеопаты всегда изучают соответствующий раздел *Materia Medica*, прежде чем назначить пациенту выбранное ими средство.

Если вам не удалось найти подобное лекарство, то непременно пересмотрите и вновь оцените симптомы вашего пациента —

возможно, что вы упустили какой-либо важный симптом или неправильно сделали выводы. Если же после повторного анализа вам опять не удалось подобрать подобное средство, то это означает, что его просто нет в данном списке. В этой книге приводятся только самые распространенные гомеопатические препараты, а на самом деле их более 2000! Если вы не смогли подобрать подобное средство или не получили желаемой ответной реакции, то в этих случаях следует обратиться к ветеринару-гомеопату. Возможно, вам требуются более полные руководства по гомеопатии – список издательств приводится в конце книги, в главе «Дополнение». В Реперториуме приводится гораздо больший список средств, а в *Materia Medica* приводится более полное их описание – вполне возможно, что вам удастся найти подобное средство на основании других гомеопатических источников. Эта книга имеет скорее познавательный, чем научно-теоретический характер; я отчетливо понимаю, что ни одна из книг не предоставит вам ответы на все ваши вопросы. Цель этой книги – не только и не столько дать вам фактические знания, сколько воодушевить вас на дальнейшие поиски.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ИХ У ЖИВОТНЫХ

Ваш пациент должен принять назначенное вами средство. Это несложный, но чрезвычайно ответственный шаг, так как прием гомеопатических препаратов отличается от приема обычных аллопатических лекарств. Гомеопатические средства воздействуют на организм на энергетическом уровне, поэтому они чрезвычайно чувствительны ко всем внешним влияниям. Гомеопаты называют это влияние «инактивация средства»; это явление может наблюдаться как до приема гомеопатического лекарства, так и после приема. Наилучший эффект средства проявляется тогда, когда оно попадает непосредственно в полость рта вашего пациента. При смешивании с пищей может произойти его нейтрализация, поэтому следует по возможности избегать этого. Нейтрализовать средство могут также мелкие частицы пищи, оставшиеся в полости рта, поэтому до приема лекар-

ства после кормления животных должно пройти не менее 15–20 минут. Не так уж важно, полон желудок у вашего питомца или пуст — важно, чтобы ничего не содержалось в полости рта. По мнению многих гомеопатов, средства могут инактивировать такие физические факторы, как электромагнитное излучение и солнечный свет; кроме того, инактивация препарата может произойти в присутствии сильных запахов, например запаха камфоры или мяты. Я не могу вам точно сказать, как часто происходит инактивация гомеопатического средства, но думаю, что предосторожность никогда не бывает излишней. Не следует хранить гомеопатическое лекарство рядом с электроприборами, специями или держать его на подоконнике.

Гомеопатические препараты продаются в специальных аптеках и большинстве магазинов здорового питания. Общеупотребительные средства приобрести нетрудно, однако может быть ограничение выбора потенций. Многие аптеки предлагают специальные наборы, в составе которых имеется от 25 до 50 наиболее распространенных острых гомеопатических средств. Цена такого набора гораздо ниже той цены, которую бы вы заплатили за покупку всех этих препаратов по отдельности. Несомненное достоинство таких наборов заключается также и в том, что в экстренных ситуациях у вас все будет под рукой. В главе «Дополнение» приводится список организаций, которые высылают гомеопатические средства по почте.

Перед тем как давать гомеопатическое средство вашему питомцу, объясните ему, что вы собираетесь делать, — пусть он успокоится. Конечно, он не поймет ваших слов, но наверняка сможет уловить интонацию и понять ваши добрые намерения. Так следует поступать во всех случаях, когда ваши действия могут вызвать у домашних животных чувство дискомфорта — например, когда вы собираетесь промыть рану, прочистить уши и нос или дать ему горький травяной настой. Животные, как правило, принимают гомеопатические средства без проблем, однако предварительно поговорить с вашим пациентом, по моему мнению, просто необходимо. На фотографиях показано, как правильно давать животным гомеопатические средства.

Гомеопатические средства выпускаются в виде таблеток, шариков и в виде раствора. Стоимость гомеопатических растворов, как правило, выше, чем других гомеопатических



форм, однако я думаю, что применять у животных растворы намного удобнее — несколько капель раствора просто закапывают в рот. Неважно, проглотит ваш пациент раствор или нет — средство начинает работать в момент соприкосновения со слизистой оболочкой полости рта. В растворах гомеопатических средств в качестве консерванта содержится спирт, вкус которого животным обычно не нравится, однако его количество минимальное. Иногда несколько капель гомеопатического раствора можно разбавить питьевой водой и давать живот-




ным уже в таком виде. Чтобы исключить влияние различных химических субстанций, следует добавлять только родниковую или фильтрованную воду. Я не рекомендую пользоваться водой из бутылок с этикеткой «Питьевая вода», так как качество ее оставляет желать много лучшего.

Воздействие средства в виде шариков и таблеток (типичная и более распространенная форма выпуска) у некоторых живот-

ных выражено более отчетливо. Шарики и таблетки просто закладываются в полость рта животным, но при этом не следует брать их в руки (из-за возможной нейтрализации), а использовать крышечку от флакона. В отличие от аллопатических лекарств гомеопатические средства обычно не вызывают у животных отвращения. Можно также растереть средство до порошкообразного состояния и засыпать в рот (так точно не выплюнет!), а можно растворить в воде и закапать в рот пипеткой или с ложки.

Предварительное разведение гомеопатического средства с водой показано ослабленным или чувствительным животным, поскольку при этом уменьшается риск усиления симптомов. Таким же образом следует давать гомеопатические средства старым или очень больным животным. Для разведения надо взять унцию или две родниковой воды (1 унция равна 31,1 г. — *Прим. перев.*), растворить пару шариков гомеопатического лекарства, аккуратно размешать и дать вашему пациенту четверть чайной ложки этого раствора.

Вас наверняка удивляет, почему при таком методе разведения доза гомеопатического средства практически не изменяется. Вспомните, какой степени разведения уже подверглись эти средства при приготовлении. Дело в том, что воздействие на организм оказывают не материальные количества гомеопатических лекарств, а энергия, заключенная в них, — таким обра-



зом, количество средства не имеет особого значения. Можно провести аналогию со звучанием камертона, который реагирует на определенную высоту звука независимо от силы звука. Подобные взаимоотношения возникают между гомеопатическим средством и организмом, причем эти отношения тоже можно назвать гармоническими. Правильно выбранное подобное средство вызывает определенный резонанс в организме подобно тому, как это происходит с камертоном, настроенным на определенную высоту звука. Продолжая аналогию, можно сказать, что неправильно выбранное лекарство не вызовет в организме никаких изменений, за исключением тех случаев, когда чувствительность организма резко повышена.

ДОЗЫ, ПОТЕНЦИИ И ПОВТОРНЫЕ ПРИЕМЫ СРЕДСТВА

Дозы

Вопрос дозирования гомеопатических лекарств представляет собой камень преткновения для понимания гомеопатии. В обычном понимании доза лекарства – это определенное количество таблеток, капель, шариков или миллилитров жидкости, которое вводится в организм за однократный прием. Однако количество шариков и таблеток при назначении гомеопатического средства не имеет особого значения. Мы все настолько привыкли к подсчету количества лекарств при введении их в организм, что нечто, называемое дозой гомеопатического средства, вызывает вначале полное недоумение. Вспомним, как готовятся гомеопатические лекарства методом потенцирования (см. гл. 1 «Введение в гомеопатию»). Гомеопатическое средство практически не содержит материальных доз данного вещества; энергетическое же воздействие на организм следует оценивать не количественно, а качественно.

Можно провести условное сравнение с музыкальными нотами. У ноты «до» одной октавы имеется ряд общих черт с нотой «до» другой октавы – например, они гармонически сочетаются с одними и теми же нотами, следуют в звукоряде за одними и теми же нотами и т. п. Однако в то же время это две различные

ноты, и более громкое звучание «до» одной октавы никогда не перейдет в звучание «до» другой октавы; так же многократное повторение «до» первой октавы не превратится в звучание «до» второй октавы. Таким же образом разведение 6С отличается от разведения 12С. Сколько бы раз мы ни повторяли разведение 6С, оно никогда не превратится в разведение 12С, оставаясь всегда разведением 6С. Два шарика препарата в потенции 6С никогда не будут эквивалентны одному шарiku средства в потенции 12С.

Ну и чтобы все запутать окончательно, в гомеопатии придуманы шарики различного диаметра. Таблетированные средства имеют стандартный одинаковый размер, однако шарики выпускаются в трех видах. Самым распространенным размером являются шарики № 35, затем шарики № 10, напоминающие маковое зернышко, и шарики № 20 — нечто среднее между № 35 и № 10 (диаметр шариков № 20 составляет примерно половину диаметра № 35 или примерно два диаметра шариков № 10). Другими словами, диаметр шариков № 35 составляет 1/8 дюйма, шариков № 20 — чуть больше, чем 1/16 дюйма, и шариков № 10 — чуть больше, чем 1/32 дюйма (1 дюйм равен 2,54 см. — *Прим. перев.*).

Вся эта арифметика еще больше усложняет и так очень непростое понимание гомеопатии. Соответствует ли воздействие одного шарика средства № 35 воздействию одного шарика № 10? Возможно, что и соответствует, однако, занимаясь практической гомеопатией уже больше десяти лет, я все же не вполне в этом уверен. Возможно, из-за того, что я не совсем изжил свои материалистические предрассудки, я условно считаю, что один шарик № 35 эквивалентен двум шарикам № 20 и трем шарикам № 10.

По той же самой причине кошкам и собакам малого веса я назначаю 2–3 шарика в качестве однократной дозы (№ 35; количество шариков другого диаметра можно пересчитать), собакам среднего размера — по 3–4 шарика и крупным собакам — по 4–6 шариков. Одну таблетку гомеопатического средства я условно считаю эквивалентной одному шарiku № 35 или одной капле раствора и использую при назначении такие же дозы. Такой способ позволяет некоторым образом избежать дискомфорта от сознания того, что доза в гомеопатии не имеет особого

значения.

Некоторые гомеопаты придерживаются той точки зрения, что доза (т. е. количество назначенных шариков, таблеток или капель) все же имеет определенное значение, и считают, что слишком большое количество шариков может вызвать реакцию усиления симптомов. Однако подобная реакция при правильном назначении встречается очень редко и только у ослабленных животных с повышенной чувствительностью организма. Поэтому для таких животных не забывайте растворять средство в воде, особенно если у вашего питомца уже отмечались подобные реакции.

Выбор правильной потенции

Очередным препятствием для легкого освоения гомеопатической науки является параллельное использование десятичной и сотенной шкалы разведений. Давайте вспомним, что десятичная шкала разведения, или Х-шкала, означает, что при каждом этапе средство разводится в 10 раз; сотенная шкала разведения, или С-шкала, означает, что на каждом этапе средство разводится в 100 раз. Таким образом, разведение 3Х означает, что одна часть средства разводится в 10 раз и этот процесс повторяется трижды. Разведение 6С означает, что одна сотая часть средства разводится в 100 раз и этот процесс повторяется шесть раз. Потенция 6С сильнее потенции 6Х, так как в этом случае средство разводится намного сильнее, а каждый этап потенцирования увеличивает энергию гомеопатического лекарства, возможно, за счет энергичной суккуссии, которая является необходимой составной частью процесса приготовления каждого гомеопатического средства. Другое объяснение увеличения силы гомеопатического средства при потенцировании заключается в том, что при разведении появляется значительно больше «пространства» для аккумуляции энергии средства. Есть еще и химическое объяснение этого феномена – при разведении связи между атомами водорода внутри молекул становятся более напряженными. В конце концов причина этого явления, наверное, не так уж и важна; многочисленные эксперименты убедительно доказывают, что воздействие на организм сотенных потенций действительно намного более выраженное.

Невозможно установить прямую корреляцию между двумя

шкалами разведений; важное значение имеет индивидуальный опыт практика-гомеопата. Из десятичных разведений чаще всего используются 6Х, 12Х, 30Х и (гораздо реже) 200Х. На основании моего опыта могу сказать, что эти разведения *примерно* соответствуют разведениям 3С, 6С, 12С и 60С. Энергия трех нижних десятичных разведений, возможно, чуть больше, чем соответствующих сотенных разведений (12Х, например, чуть сильнее, чем 6С). Наивысшая потенция, которая продается без рецепта, составляет 30С; из десятичных потенций наивысшая потенция, которую можно приобрести без рецепта, составляет 30Х.

Если требуются более сильные потенции, то назначаются гомеопатические препараты в сотенном разведении. Хотя в продаже есть потенции 60С и 100С, традиционно переходят сразу от 30С к 200С. Высшие сотенные разведения принято обозначать латинской буквой М, что означает число этапов разведения, например, 1000С = 1М, 10 000С = 10М, 50 000С = 50М и т. д. Разведение в 100 000 раз обозначается СМ, а 1 000 000С — ММ, при этом гомеопатическое средство разводится в миллион раз (!). С такими сверхвысокими потенциями в силу ряда особенностей может работать только опытный профессионал-гомеопат.

При выборе соответствующих потенций для лечения должно приниматься во внимание множество факторов; в целом этот выбор определяется несколькими жесткими правилами, которые, однако, достаточно сложно объяснить. Каждый случай заболевания хоть немного, но отличается от другого; сущность индивидуализации гомеопатического лечения заключается в том, что отразит эти различия в назначении подобного средства. Со временем у вас выработается чутье на назначение препарата нужной потенции. Основными факторами, которые следует учитывать при выборе необходимой потенции средства, являются следующие: степень выраженности симптомов, состояние жизненной силы животных, наличие или отсутствие уверенности в выборе подобного препарата и сила гомеопатического средства. Надеюсь, что вам помогут некоторые мои практические рекомендации.

Первое. Постарайтесь подобрать потенцию средства таким образом, чтобы она соответствовала степени выраженности

симптомов болезни. При острых агрессивных болезнях, например при высокой лихорадке у молодых животных, целесообразнее назначать высокие потенции лекарства. Профессиональные ветеринары-гомеопаты в подобных случаях назначают или 200С, или 1М, или 10М потенции. Однако я не рекомендую вам самостоятельно, без консультации опытного специалиста, назначать потенции выше, чем 30С или 200С. Назначение высоких потенций, особенно частый или многократный прием гомеопатического средства в высоком разведении, может в некоторых случаях вызвать серьезные нарушения. Заболевания с постепенным медленным началом и длительным вялым течением невозможно излечить быстро – поэтому при их лечении следует начинать с назначения низких потенций (6С, 9С или 12С). Средства в низкой потенции можно назначать ежедневно или каждые несколько дней, в зависимости от заболевания и ответной реакции на лечение.

Второе. Потенция препарата должна соответствовать состоянию жизненной силы животных. Это очень важное правило. Ослабленные животные просто могут не выдержать потрясения, которое вызывает в организме назначение высоких потенций, в результате чего может отмечаться выраженное ухудшение состояния животных и даже смертельный исход. У старых животных обычно используются редкие приемы средств в разведении 6С или иногда 6Х. Выраженные симптомы у животных соответствуют крепкой жизненной силе, так как при ослаблении жизненной силы организм просто не в состоянии продуцировать яркую и выраженную ответную реакцию. Однако острые агрессивные заболевания (например, парвовирусная инфекция у собак или пищевое отравление) приводят к быстрому истощению организма; если при назначении высоких потенций в этих случаях не наблюдается быстрого улучшения состояния, то следует перейти к назначению низких потенций. Под влиянием крепкой жизненной силы организм стремится локализовать болезнь в пределах одного периферического органа (как правило, кожи) или в пределах менее важных органов (например, уши).

Третье. Потенция должна соответствовать степени вашей уверенности в правильности выбора подобного средства. Неправильно выбранное гомеопатическое лекарство обычно не

оказывает заметного влияния на организм, однако в редких случаях может вызвать выраженное усиление симптомов болезни. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в правильности выбора препарата, то начните лечение с назначения низких потенций. Вы всегда сможете повысить потенцию средства после того, как убедитесь, что вы назначили действительно подобное лекарство. Некоторые гомеопаты всегда начинают лечение с назначения низких потенций, например с потенции 6С, особенно при хронических заболеваниях. Я не сторонник шаблонных назначений, но думаю, что в этом случае такое назначение всегда более безопасно. Однако при выраженности симптомов болезни низкие потенции могут и не оказать значительного влияния на организм даже при правильно выбранном средстве; в этих случаях целесообразно постепенное и последовательное повышение потенции.

Четвертое. Выбранная вами потенция препарата должна соответствовать силе гомеопатического средства. Некоторые препараты по природе своей обладают большей силой воздействия по сравнению с другими средствами; именно поэтому при назначении отдельных препаратов вероятность усиления симптомов значительно выше. Это особенно важно учитывать в начале лечения хронических заболеваний. Например, *Sulphur* и *Lycorodium* представляют собой глубоко действующие и мощные гомеопатические лекарства; начинать лечение хронических заболеваний с назначения этих средств можно только в тех случаях, когда есть полная уверенность в правильности вашего выбора. Таким же образом следует назначать и другие средства-полихресты (т. е. глубоко действующие, мощные, «главные» препараты). Назначение неправильно выбранного, но более специфического или более поверхностного средства, как правило, не приводит к выраженному усилению симптомов. Эта концепция применяется в основном при лечении хронических заболеваний; в этих случаях глубокое регулярное изучение *Materia Medica* приобретает особенно важное значение. Лечение же хронических заболеваний — прерогатива профессиональных гомеопатов; мне лишь хотелось предостеречь вас от необдуманного назначения и частых повторных приемов некоторых глубоко действующих гомеопатических лекарств.

Повторный прием гомеопатического средства

Как часто следует принимать выбранное гомеопатическое средство? По моему мнению, во всех случаях не следует торопиться с повторным приемом препарата или с его отменой и назначением другого препарата. Гомеопатические лекарства представляют собой стимуляторы ответной реакции организма, для формирования которой требуется определенное время. Ответная реакция организма зависит в основном от тех же факторов, что и выбор потенции – при острых болезнях с выраженными симптомами и быстрым их изменением требуются более активные действия, тогда как медленно и длительно протекающие болезни требуют выжидания. Возможно, что именно выжидание является наиболее сложной частью гомеопатического лечения. Однако необходимо достаточно четко представлять себе, какую ответную реакцию мы ожидаем получить, и уметь идентифицировать ее (см. гл. 3 «Природа излечения»). Кроме того, при ожидании ответной реакции не должно быть ощущения, что ситуация выходит из-под контроля (см. гл. 2 «Природа болезни»). Иногда просто следует запастись терпением и предоставить организму возможность проявить себя.

Наилучшим показателем эффективности вашего назначения является поведение животных. Однако мы все склонны выдавать желаемое за действительное, надеясь во всех случаях получить быстрые хорошие результаты. Самым первым симптомом улучшения состояния вашего питомца, особенно при тяжелых заболеваниях, является изменение его поведения, иногда даже незаметное для других – например, вы вдруг отмечаете, что ваш тяжелобольной пациент начинает потихоньку ходить за вами по дому, а не лежит постоянно на своем месте; или вдруг вы замечаете, что глаза у него как будто стали поярче; или вдруг ваш пес начинает принюхиваться к пище, хотя раньше даже не подходил к своей миске.

В отношении частоты повторных приемов гомеопатических средств надо действовать в соответствии с определенными принципами. При назначении высоких потенций требуются редкие повторные приемы препарата. При назначении низких потенций вполне допустимы частые повторные приемы лекарства или их назначение в соответствии с определенным расписанием. Конечно, возможны некоторые индивидуальные осо-

бенности назначений. С точки зрения классической гомеопатии промежуточное положение между высокими и низкими потенциями занимает потенция 30С.

До тех пор пока вы не приобрели определенный опыт гомеопатического лечения, я рекомендую вам применять потенции 30С и ниже. Конечно, каждый случай заболевания индивидуален, поэтому к моим рекомендациям общего характера тоже надо относиться с определенной долей критичности. Однако вам следует соблюдать определенные правила, особенно в начале лечения, и внимательно наблюдать за состоянием вашего питомца – его организм сам вам подскажет, как действовать дальше. При выраженных симптомах заболевания требуются или частые повторные приемы средства, или применение более высоких потенций. Однако в том случае, если вы начали лечение с редких назначений низких потенций, то в дальнейшем вы всегда сможете либо участить приемы препарата, либо перейти на более высокие потенции. Общее представление о частоте повторных приемов гомеопатического средства и потенциях в зависимости от выраженности симптомов заболевания можно получить из данной таблицы.

Потенция	Повторный прием при выраженных симптомах	Повторный прием при умеренных симптомах	Повторный прием при легких симптомах	Повторный прием при хронических заболеваниях
6Х	Каждые 5–30 минут	Каждые 1–4 часа	3–4 раза в день	1–4 раза в день
6С, 12Х	Каждые 5–30 минут	Каждые 3–6 часов	2–4 раза в день	Каждый третий день 1–4 раза
12С, 30Х	Каждые 5–60 минут	Каждые 8–12 часов	1–2 раза в день	Каждый 1–7 день
30С	Каждые 5–90 минут	Каждые 12–24 часа	Каждые 1–4 дня	1 раз в неделю, 1 раз в месяц или реже

Выраженные, умеренные и легкие симптомы характеризуют степень тяжести заболевания; в последней колонке представлена частота приемов гомеопатического средства при хроническом заболевании. При выраженных симптомах, которые указывают на развитие состояния, угрожающего жизни (шок, коллапс и т. п.), требуется экстренная ветеринарная помощь. Примером умеренных симптомов является, например, парвовирусная инфекция у собак или тяжелые вирусные респираторные заболевания у кошек – в этих случаях также следует

обращаться к ветеринару. Легкие симптомы типичны, например, для некоторых вирусных заболеваний верхних дыхательных путей у кошек, легкие случаи рвоты и т. п. Выраженные, умеренные и легкие симптомы в целом примерно соответствуют сверхострому, острому и подострому течению заболевания, т. е. категориям, принятым в традиционной медицине. К хроническим состояниям относятся астма, судорожные приступы, кожные заболевания, заболевания щитовидной железы, аутоиммунные заболевания и т. п. На прием к ветеринару-гомеопату чаще всего обращаются именно по поводу хронических заболеваний животных. По возможности хронические заболевания должен лечить профессиональный ветеринар-гомеопат. Приведенное выше деление заболеваний является весьма условным, однако позволит вам лучше ориентироваться в различных ситуациях.

Классическое гомеопатическое назначение заключается в приеме дозы выбранного средства и наблюдении за ответной реакцией организма; до тех пор пока сохраняется улучшение, повторные приемы препарата не рекомендуются. Это наилучший метод назначения высоких потенций. Повторные приемы низких потенций средства назначаются так часто, как это считается необходимым, в зависимости от длительности ответной реакции. При недостаточно частом назначении средства в некоторых случаях отмечается так называемый «эффект американских горок», хотя при назначении действительно подобного лекарства состояние животных в общем будет постепенно улучшаться. При слишком частых приемах гомеопатического препарата иногда отмечается усиление симптомов — в этих случаях рекомендуется на некоторое время отменить средство, подождать стабилизации состояния и в дальнейшем назначать лекарство пореже. В подобных случаях интерпретация ответной реакции организма может быть очень сложной, так как иногда неправильно выбранное средство может привести к развитию сходной реакции (см. гл. 3 «Природа излечения»). В таких случаях рекомендуется ориентироваться на общее улучшение всех симптомов, особенно симптомов со стороны психоэмоциональной сферы и поведения. Со временем состояние животных будет улучшаться, однако неправильная частота приемов препарата может отразиться на длительности и выражен-

ности симптомов заболевания.

После улучшения состояния животных повторные приемы гомеопатических средств становятся все реже, пока совсем не отпадет надобность в их применении. Процесс излечения требует определенного времени, однако действие правильно выбранного средства продолжается и после его полной отмены. На этой стадии лечения целесообразнее всего применять 30С, 30Х и 12С потенции, причем повторные приемы назначаются только при наличии некоторого ухудшения.

В редких случаях состояние животных может ухудшиться сразу же после приема гомеопатического средства. Это ухудшение может указывать на наличие резонанса со стороны организма на введение препарата; обычно в этих случаях вслед за кратковременным ухудшением состояния начинается стойкое улучшение. Именно поэтому никогда не следует торопиться с повторным приемом лекарства или назначением другого средства.

Выраженное усиление симптомов, связанное с излечением, может продлиться несколько минут, умеренно выраженное — от 30 минут до часа и легкое — от нескольких часов до одного дня. При «кризисе исцеления» улучшение не за горами. Если же гомеопатическое средство выбрано неверно, то состояние животных будет либо ухудшаться, либо вернется к прежнему уровню. Феномен «кризиса исцеления» хорошо известен в гомеопатии и часто считается предвестником полноценного излечения; но на самом деле усиление симптомов, связанное с излечением, встречается достаточно редко. Если потенция средства подобрана правильно, то усиления симптомов скорее всего не будет, а начнется постепенное стойкое улучшение состояния.

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДИНАМИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖИВОТНЫХ

Как-то раз в разговоре со своей соседкой — опытным садоводом — я посетовал на особенности климата нашего штата, к которым я никак не мог приспособиться. Соседка дала мне очень правильный совет: «Надо записывать все, что вы делаете или собираетесь сделать в саду! Это только кажется, что вы все

помните, а на самом деле все очень быстро забывается». Я думаю, что этот совет вполне уместен и для всех тех, кто собирается лечить некоторые заболевания своих домашних животных с помощью гомеопатии. Необходимо регулярно записывать все особенности состояния вашего питомца, все изменения симптомов, которые вы отметили, и периодически просматривать записи, анализируя динамику заболевания. Часто при повторной консультации мои клиенты уверяют, что в состоянии их питомцев не произошло никаких перемен, хотя при более подробном расспросе выясняется, что перемены есть, иногда даже значительные. Если происходят какие-то изменения, то первоначальное состояние легко забывается. По этой же самой причине иногда мои клиенты считают, что состояние их кошки или собаки улучшилось, однако я вижу, что это не так. Мы все склонны приукрашивать действительность и выдавать желаемое за реальный факт. Мне это свойственно в той же мере, что и всем остальным, — это я обнаружил, когда пытался проанализировать динамику заболевания у одной из моих кошек. Как оказалось, без соответствующих записей очень трудно вспомнить все особенности течения заболевания. Ваши записи окажут вам неоценимую помощь и в том случае, если вам потребуется проконсультировать вашего питомца у ветеринара-гомеопата.

Все изменения состояния вашего питомца следует фиксировать в специальном блокноте или дневнике, при легких заболеваниях можно использовать для записей обычный календарь. Непременно следует записывать даты приема, дозы и потенции гомеопатических средств; методом проб и ошибок рано или поздно вам удастся подобрать соответствующий режим. В дневнике следует отмечать также и температуру у вашего питомца. При измерении температуры старайтесь держать градусник в течение минимального времени, чтобы не усиливать у животных ощущение дискомфорта (у животных, как и у детей, можно измерять температуру в подмышечной ямке. Ректальная температура будет выше на один градус по Фаренгейту). Необходимо уравновесить вашу потребность в получении информации с потребностью вашего питомца в комфорте, так как комфортные условия и хорошее состояние психики представляют собой мощные факторы выздоровления.

Не забывайте, что при оценке динамики состояния вашего питомца одним из наиболее важных факторов является оценка состояния психоэмоциональной сферы; во многих случаях улучшение этих симптомов происходит раньше, чем улучшение локальных симптомов. Порядок улучшения симптомов описывает закон излечения Геринга, в соответствии с которым симптомы улучшаются в порядке, обратном времени их появления. Если вы наблюдаете именно такой порядок улучшения симптомов, то можно успокоиться — выздоровление вашего питомца идет так, как положено.

Однако отсутствие изменений состояния вашего питомца после приема гомеопатического препарата означает, что следует либо подобрать другое средство для лечения, либо проконсультироваться с ветеринаром-гомеопатом. При развитии тяжелого состояния необходима ветеринарная помощь, причем то лекарство, которое вы назначали, в этом случае надо отменить или заменить другим. Ответная реакция организма обычно развивается после приема двух-трех доз выбранного средства при условии, что интервал между приемами определен правильно. Если ответной реакции не отмечается, то следует отменить лекарство и подобрать другое; в некоторых случаях гомеопатическое лечение можно продолжать даже на фоне обычной терапии.

Правило «две-три дозы» применимо для всех состояний; если вы назначаете гомеопатическое средство в соответствии с правилами, изложенными в таблице, то после приема двух-трех доз лекарства уже вполне можно оценить изменения состояния вашего питомца. Если улучшение малозаметное, то следует выждать в течение некоторого времени, особенно в случае вялотекущих заболеваний. Частая непродуманная смена гомеопатического препарата является одной из самых распространенных ошибок, которые в гомеопатии допускают новички; однако со временем к вам непременно придет понимание того, как долго следует ждать ответной реакции.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 5

Если вы убедились, что состояние вашего питомца позволя-

ет проводить самостоятельное гомеопатическое лечение его заболевания в домашних условиях, то вам следует предпринять ряд последовательных действий.

*** Выявление симптомов, ведение записей, анализ симптомов**

Проанализируйте полную картину симптомов вашего питомца с момента начала заболевания. Рассматривайте не только основной симптом, но и все другие сопутствующие симптомы. Особенно важно оценить изменения поведения. Постарайтесь представить себе цельный образ болезни; обратите самое пристальное внимание на те особенности, которые отличают заболевание вашего питомца от подобных заболеваний у других животных. Постарайтесь выявить индивидуальные отличия.

*** Выбор гомеопатического средства и составление плана лечения**

После того как вы получите более или менее полное представление о заболевании, вам следует прочитать соответствующую главу данной книги. Обратите особое внимание на раздел, в котором описываются дополнительные методы лечения и состояния, требующие специальной ветеринарной помощи. Постарайтесь подобрать соответствующее гомеопатическое средство и подтвердите правильность вашего выбора, изучив описание данного препарата в главе *Materia Medica*. Не забывайте, что гомеопатические лекарства очень специфичны; следует подбирать средство с учетом всех индивидуальных особенностей вашего пациента. В картине выбранного вами препарата должен присутствовать не только основной симптом заболевания, но и все сопутствующие симптомы.

*** Дозы, потенции, повторные приемы средства**

Выбор потенции и частоты повторных приемов гомеопатического средства следует проводить на основе представленной в данной главе таблицы. Для самостоятельного лечения вашего питомца в домашних условиях подходят любые потенции ниже 30С; частота повторных приемов зависит от выбранной вами потенции. При отсутствии положительной динамики заболевания дальнейшее применение данного средства нецелесообразно.

*** Наблюдение за состоянием вашего питомца**

Непрерывно записывайте все особенности течения заболевания, фиксируйте все симптомы, которые указывают на улучшение состояния. Особенно важно, если параллельно с улучшением физических симптомов улучшается состояние психоэмоциональной сферы. Если в течение некоторого времени вы не отмечаете положительной динамики, то следует повторно проанализировать случай и подобрать при необходимости другое лекарство. Однако не следует торопиться с назначением другого препарата, так как для формирования ответной реакции организма требуется определенное время. В некоторых случаях после начала лечения может наблюдаться кратковременное ухудшение состояния, вслед за которым наступает улучшение.

*** Обращение за ветеринарной помощью**

Если после начала гомеопатического лечения вы не отмечаете улучшения состояния вашего питомца, то непременно обратитесь за помощью или к традиционному ветеринару, или, если есть такая возможность, к специалисту по ветеринарной гомеопатии.

Кожные покровы и уши



Общий обзор
Функции кожи
Кожные инфекции и высыпания
Кожный зуд
Участки раздражения кожи
Воспаление сальных желез (акне)
Парша
Укусы и ужаливания
Ожоги пламенем и кипятком
Дерматомикоз
Заболевания ушей
Ушные клещи
Лисохвост и инородные тела
Ушные гематомы
Укусы насекомых (мух и moskitов)

ОБЩИЙ ОБЗОР

Помимо заболеваний кожных покровов у животных в данной главе рассматриваются некоторые распространенные заболевания наружного уха и слухового прохода. В сущности, гистологическое строение кожи и наружного уха практически одинаковое, так как эти ткани развиваются из одного и того же эмбрионального зачатка. Кроме того, симптомы хронических заболеваний и на коже, и в области наружного уха проявляются аналогичным образом. Кожные покровы, представляющие собой внешнюю оболочку тела, поражаются обычно на ранних стадиях хронических болезней. Особенности строения и функции кожи позволяют организму в течение достаточно длительного времени ограничивать и сдерживать развитие болезни, даже несмотря на постепенное ухудшение хронического заболевания. Не следует забывать, что с точки зрения гомеопатии различные симптомы являются проявлением одного и того же хронического заболевания организма, причем кожные покровы обычно поражаются в первую очередь. Прежде чем приступить к чтению данной главы, я бы порекомендовал читателям прочесть главу 2 «Природа болезни», в которой мы достаточно подробно говорили о том, что по сути своей кожные заболевания являются видимым проявлением глубоких серьезных хронических болезней.

Организм обычно пытается ограничить проявление хронической болезни менее важными для жизни органами, которые могут выдерживать значительные нагрузки, тем самым предохраняя от поражения более важные органы. Кожные покровы, в том числе наружное ухо, полностью удовлетворяют этим требованиям. Кожа представляет собой нечто вроде «склада отходов» хронической болезни – именно поэтому кожные покровы обычно поражаются на ранних стадиях развития болезни. В то же время, несмотря на неприглядный внешний вид, даже серьезное поражение кожи, как правило, не представляет собой непосредственной опасности для жизни организма в целом.

Важно понять, что почти все заболевания кожи и наружного уха представляют собой видимые внешние проявления хронических болезней организма. Лечение этих заболеваний также должно проводиться соответственно – не как изолирован-

ных локальных болезней, а как симптомов хронического заболевания. Заболевания с подобной симптоматикой обычно протекают достаточно длительно и тяжело — несмотря на то, что они ошибочно принимаются за заболевания «всего лишь» кожи. Кроме того, часто внешний вид животных не соответствует общему состоянию их здоровья. Во многих случаях отмечается внезапное появление кожных симптомов — однако на самом деле заболевания, внешним проявлением которых является поражение кожи, развиваются исподволь, постепенно и в течение длительного времени и содержат в себе значительный заряд «болезнетворной энергии». Кожные симптомы при хроническом заболевании можно сравнить с вершиной айсберга; основная «масса болезни» остается скрытой от глаз. Эта «масса болезни» обладает значительной инерцией — именно поэтому лечение кожных заболеваний длительное и является сложной задачей даже для опытных гомеопатов. Многие традиционные ветеринары считают кожные болезни животных настоящим «проклятием» своей работы. Неэффективность традиционного лечения животных с кожными заболеваниями явилась одной из основных причин, которая побудила меня изучать холистическую медицину, в том числе гомеопатический метод лечения.

Для ветеринаров и всех тех, кто действительно привязан к своим питомцам, кожные заболевания представляют собой источник постоянной фрустрации из-за демонстративности их внешних проявлений и чувства значительного дискомфорта, который испытывают эти страдальцы. Процесс излечения кожных заболеваний занимает длительное время и требует как огромного терпения, так и значительных материальных затрат, особенно в тех случаях, когда животные (в основном собаки) страдают от жесточайшего кожного зуда. Полное излечение некоторых кожных заболеваний возможно только за 2–3 года постоянного и упорного лечения, несмотря на то, что при правильном лечении и коррекции питания улучшение можно отметить уже через месяц-два. Правильное питание является одним из важнейших компонентов лечения при всех кожных заболеваниях, а при наличии кожного зуда питание в некоторых случаях имеет решающее значение. По моему убеждению, полное излечение животных с такими заболеваниями возможно только при сбалансированном питании, включающем нату-

ральные продукты и сырое мясо. Помимо питания на процесс излечения влияет множество факторов, в том числе эмоциональные стрессы, наличие в окружающей среде аллергенов, токсинов и т. п.

Вопреки установившемуся мнению аллергия представляет собой прежде всего хроническое заболевание, одним из проявлений которого является повышенная чувствительность к разнообразным аллергенам. Сущностью заболевания является сверхактивность иммунной системы, вследствие которой и развивается необычная реакция организма по отношению к потенциальным аллергенам, которые всегда находятся в окружающей среде. Например, при развитии у собак аллергии на блошиные укусы вовсе даже не блохи и их слюна являются причиной аллергии; причина кроется в нарушении функции иммунной системы собак и развитии предрасположенности организма к аллергии. В этом случае блохи вследствие их повсеместной распространенности являются просто удобным поводом для проявления этой аллергической предрасположенности. На функцию иммунной системы и, следовательно, на развитие аллергических реакций оказывает влияние огромное количество факторов — неполноценное питание, вакцинации, частые стрессы, токсические воздействия и т. п. При наличии аллергии организм не способен должным образом реагировать на лечение — именно поэтому в процессе лечения следует избегать воздействия аллергенов на организм. Если у собак аллергия на слюну блох — следовательно, необходимо принять меры по полному истреблению кожных паразитов; если у собаки аллергия на какой-либо пищевой продукт — следовательно, этот продукт должен быть полностью исключен из пищи и т. п. Следует стремиться к полному исключению контакта с аллергенами до тех пор, пока функция иммунной системы полностью не нормализуется.

В соответствии с рядом исследований¹ и на основании моего опыта я могу утверждать, что во многих случаях пусковым моментом развития кожных заболеваний является вакцинация. Сенсибилизация (т. е. повышение чувствительности) иммунной системы и ее искусственная стимуляция в результате вакцинации создают благоприятные условия для развития аллергии и аутоиммунных поражений кожи. На практике часто

встречаются случаи начала кожных заболеваний у животных в возрасте 6–8 месяцев – именно в этот период проводится наибольшее количество прививок. Кроме того, ухудшение течения аллергии у животных отмечается как раз через 1–3 месяца после периода интенсивной вакцинации (более подробно в гл. 16 «Вакцинация»).

Как «человеческие» врачи, так и ветеринары повсеместно отмечают усиление роли токсинов и загрязнений воздуха в развитии хронических заболеваний. Это явление не может не привлечь внимание общественности, однако эксперты, как правило, не придают особого значения влиянию факторов окружающей среды на развитие хронических болезней, несмотря на огромное число очевидных и задокументированных доказательств. Токсины легко проникают в организм и буквально разрушают иммунную систему, что приводит к развитию аллергии и других хронических заболеваний. По моему глубокому убеждению, тот воздух, которым дышим мы и вместе с нами наши животные, оказывает на живые существа такое же токсическое воздействие, как и вакцинация и неполноценное питание, препятствуя излечению всех хронических заболеваний, в том числе и заболеваний кожи.

Помимо всех перечисленных выше причин на возникновение и течение заболеваний кожи у животных оказывают влияние многочисленные эмоциональные стрессовые факторы. Раньше считалось, что кошки могут вполне комфортно жить в небольших помещениях, годами не выходя на улицу. Однако в действительности кошки подвержены воздействию стрессовых факторов не меньше, чем другие животные, особенно при длительном пребывании в одиночестве в закрытых помещениях. Подобный хронический эмоциональный стресс кошка может испытывать также и из-за обилия в доме своих сородичей, которые лишают ее «собственного» жизненного пространства. Собаки также могут испытывать состояние психоэмоционального стресса в тех случаях, когда они много времени проводят в одиночестве в условиях запертой небольшой квартиры, когда их не выгуливают в достаточной степени, лишая необходимой физической нагрузки – одним словом, когда об эмоциональном состоянии животных не особенно-то и заботятся. Для лечения последствий эмоционального стресса у собак некоторые вете-

ринары используют антидепрессанты, в частности препарат прозак — однако я убежден, что никакое, даже самое современное лекарство не заменит теплого и внимательного отношения к своим питомцам.

Поскольку большинство кожных заболеваний (в том числе и заболеваний ушей) возникает вследствие внутренних причин, местное применение лекарственных препаратов всегда связано с определенным риском. Лишь в некоторых случаях местное применение легких аллопатических препаратов, которые облегчают течение заболевания и не подавляют симптомы, является оправданным. Сильные аллопатические лекарства способствуют подавлению симптомов — в ответ на подавление кожных проявлений организм перемещает симптомы болезни с кожи на более глубокий уровень, что, как правило, приводит к очень серьезным последствиям. К подавлению кожных симптомов и углублению болезни приводит местное применение таких аллопатических препаратов, как мази с антибиотиками и стероидами, специальные шампуни, содержащие серу или мази на основе дегтя. Однако гораздо более рискованно применение аллопатических пероральных или инъекционных препаратов. С точки зрения гомеопатии подавление кожных симптомов представляет собой важнейший фактор ухудшения хронического заболевания, а основной причиной подавления симптомов является, безусловно, применение сильных аллопатических лекарств. Кроме того, потенциальной способностью подавления кожных симптомов обладает любой метод лечения при его неправильном применении, в том числе и гомеопатический.

В заключение данного раздела мне хотелось бы дать несколько советов по лечению кожных заболеваний у животных. Самостоятельно лечить кожные заболевания у ваших питомцев с помощью гомеопатических средств, руководствуясь лишь книгами, мне представляется совершенно бесполезной затеей. Выбор подобного средства при кожных заболеваниях — исключительно сложная задача, которую может решить только лишь врач-гомеопат с достаточно большим опытом работы. Только профессиональный гомеопат может адекватно оценить ответную реакцию организма на назначение того или иного гомеопатического средства. В типичных случаях самостоятельное лечение приведет только лишь к кратковременному облег-

чению симптомов — однако кожные симптомы имеют тенденцию к возобновлению, несмотря на повторные назначения гомеопатических препаратов. Кроме того, частые приемы гомеопатических средств потенциально могут привести к подавлению кожных симптомов и ухудшению течения болезни, хотя это и маловероятно при назначении низких разведений. Если же вы не наблюдаете облегчения симптомов после назначения подобного (как вам кажется!) средства в соответствии с принципами гомеопатии (см. гл. 3 «Природа излечения»), то, несомненно, вам следует обратиться к опытному врачу-гомеопату или ветеринару-гомеопату. В таких случаях *не следует продолжать прием выбранного вами гомеопатического средства из-за опасности замаскировать симптомы — это ненамного лучше аллопатического лечения.*

Я совершенно не имею в виду, что кожные заболевания нельзя лечить гомеопатическим методом; я вовсе не думаю, что ваше лечение будет неэффективным. Просто я знаю по своему опыту, что многие случаи кожных заболеваний представляют собой сложную задачу даже для опытных гомеопатов. В этой главе мы рассмотрим гомеопатическое лечение ряда несложных кожных заболеваний и поговорим о некоторых гомеопатических средствах. Однако в большинстве случаев я настоятельно рекомендую вам все же проводить лечение по назначениям ветеринара-гомеопата.

ФУНКЦИИ КОЖИ

Кожные покровы прежде всего представляют собой своеобразный барьер, который защищает внутреннюю среду организма от внешних воздействий. Именно кожные покровы определяют индивидуальность и очертания тела животных, являясь границей между организмом и внешним миром. Волосистой покров защищает тело от разнообразных травм и является прекрасным изолирующим материалом. Сальные железы продуцируют особый секрет, который является «смазочным» материалом как для волосистого покрова, так и для самой кожи, обеспечивая их защиту от воды и воздействия различных раздражающих химических веществ. Эти же железы функциони-

руют как органы выделения, что в какой-то степени роднит кожу с печенью, кишечником и почками. Фактически заболевания кожи могут привести к обострению заболеваний всех органов выделения, так как в этом случае на печень, почки и кишечник ложится дополнительная нагрузка. Однако при развитии, например, почечной или печеночной недостаточности дополнительная нагрузка падает на кожные железы.

Кожа обеспечивает не только очертания тела, но и внешний вид животных в целом, что дает возможность провести их визуальную идентификацию. Особый секрет сальных желез позволяет животным идентифицировать друг друга по запаху. Таким образом, собственное представление о себе и у человека, и у животных формируется во многом благодаря строению и функции кожных покровов. По предположениям некоторых исследователей, кожные болезни у людей являются следствием их сниженной самооценки; вернее было бы сказать, что кожные болезни являются следствием сниженной самозащиты. Возможно, что именно в этом кроется основная причина кожных высыпаний после вакцинации — организм не может более защищать свои границы, и полчища микробов внедряются во внутреннюю среду организма через пораженную кожу. Действительно ли некоторые психосоматические болезни развиваются по подобному сценарию или нет — вопрос спорный; однако у людей наличие такого механизма развития болезней вполне очевидно. Я предполагаю, что аналогичный механизм развития болезней вполне возможен и у животных.

КОЖНЫЕ ИНФЕКЦИИ И ВЫСЫПАНИЯ

Инфекция и высыпания в области кожных покровов, подобно другим кожным симптомам, отражают попытки организма избавиться от болезни. В большинстве случаев инфекции кожных покровов вызываются теми же бактериями, которые обычно вполне мирно уживаются со своим организмом-хозяином. Чаще других встречается стафилококковое (*Staphylococcus aureus*) поражение кожи — однако этот же вид бактерий можно обнаружить на коже практически всех животных. Усиленное размножение стафилококков начинается тогда, когда по той

или иной причине нарушается целостность кожных покровов. Почему же стафилококковое поражение кожи развивается у одних животных и не развивается у других? Ответ на этот вполне закономерный вопрос содержится в поздних трудах Л. Пастера: «Микроб – ничто; среда его обитания – все». Просто в какой-то момент организм предоставляет бактериям особо благоприятные условия для размножения и ускоренного роста их популяции. Примерно то же самое происходит, когда мы расчищаем участок леса. Вскоре весь расчищенный участок оплетает ежевика – ведь это мы предоставили ей особые условия и возможность неограниченного роста.

Таким образом, инфекция развивается только в тех случаях, когда организм, образно говоря, предоставляет ей такую возможность. Именно поэтому лечение кожных инфекций антибиотиками представляет собой достаточно сложную задачу. Без изменения внутренней среды организма инфекция будет возвращаться снова и снова; антибиотики могут улучшить состояние пациента за счет уменьшения популяции бактерий и снижения их «агрессивных намерений», однако *только усиление иммунной системы организма позволит добиться полного излечения.*

Кожный зуд

Кожный зуд у домашних животных является, очевидно, основной и одной из самых частых причин обращения к ветеринару; кожный зуд не только источник страданий для самих животных, но и источник постоянных мучений для всех членов семьи, в которой они живут. Наблюдать, как ваш питомец чешется дни и ночи напролет – сущее испытание даже для самых ярых приверженцев гомеопатического метода лечения. Конечно, гомеопатические средства помогают при выраженном кожном зуде, но, к огромному сожалению, их действие проявляется слишком медленно. Единственный надежный способ избавить вашего питомца от кожного зуда заключается в назначении гомеопатических конституциональных и антивакцинозных средств. Однако следует запомнить, что *в тех случаях, когда ваша кошка или собака уже получают такие средства, назначение других гомеопатических препаратов противопоказано.*

Особенности наблюдения за животными, страдающими кожным зудом

Во всех случаях длительно существующего зуда животным следует провести специальное обследование у ветеринара с целью исключения тяжелых заболеваний. Особенно важно обследовать щенков, страдающих зудом, так как зуд может быть одним из симптомов парши. Кроме того, при наличии зуда следует осмотреть животных на наличие кожных паразитов (блох, клещей и т. п.).

Следует немедленно обратиться к ветеринару в следующих случаях:

- если на фоне зуда у животных отмечается потеря аппетита или заторможенность,
- если вслед за развитием зуда у вашего щенка общий зуд появился и у вас.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару в следующих случаях:

- если зуд отмечается в течение двух недель и более,
- если развивается воспаление кожи с образованием гнойных ран или корочек,
- если зуд и кожное поражение постепенно распространяются по телу.

Пока не начнет работать гомеопатическое средство, кожный зуд у животных можно облегчить применением некоторых местных препаратов. Иногда хороший эффект с уменьшением зуда отмечается при применении ванн или аппликаций с толокном или настоем конского щавеля. Высушенный конский щавель продается в большинстве аптек. Для приготовления настоя следует залить одну столовую ложку сухого сырья двумя стаканами кипятка, остудить, процедить и применять полученный раствор для орошения кожи и промывания поверхностных ран. Кроме того, можно использовать настой алоэ, календулы или настой зеленого чая.

В некоторых случаях зуда временный, но выраженный эффект приносит голодание в течение короткого времени. Одной из причин облегчения состояния в подобных случаях является

благотворное влияние голодания на функцию кишечника; нормализация функции кишечника, в свою очередь, приводит к уменьшению элиминации ряда токсических продуктов через кожу. Если общее состояние вашего питомца удовлетворительное и нет признаков слабости, то можно попробовать ограничить его в еде, предлагая лишь мясной бульон и мед (или патоку) в течение двух-трех дней (мед или патока дадут организму необходимое количество калорий). Кроме того, животным с зудом полезно один раз в неделю устраивать «голодный день».

При зуде полезен пероральный прием витамина Е (*vit. E*, 5–10 мг/фунт веса ежедневно), витамина С (*vit. C*, 10 мг/фунт 2–3 раза в день), пикногенола (*Pycnogenol*, 1 мг/фунт 2–3 раза в день) и масла семян льна (четверть или половина чайной ложки на 10 фунтов веса животных 1–2 раза в день). Льняное масло обеспечивает организм ненасыщенными жирными кислотами; эти же необходимые вещества содержатся в рыбе, семенах тыквы и молодых овощах. Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты (в частности, омега-3 жирные кислоты) содержатся в ряде специальных пищевых добавок. Ненасыщенные жирные кислоты способствуют проникновению и накоплению в коже ионов кальция – именно благодаря ионам кальция происходит уменьшение зуда. Поэтому не следует забывать, что в пище животных, страдающих зудом, должно содержаться достаточное количество кальция.

Купание у одних животных облегчает зуд, у других – усиливает; кроме того, животные по-разному реагируют на температуру воды. Следует опытным путем установить те физические факторы, которые облегчают состояние вашего питомца. В некоторых случаях эта информация может оказаться весьма ценной при назначении подобного гомеопатического средства. Для купания животных лучше использовать шампуни без кондиционера, с минимальным количеством ингредиентов в их составе. Я бы порекомендовал вам вначале испытать шампунь на своих собственных волосах. Если после мытья этим шампунем волосы становятся чистые, мягкие и пушистые, без каких-либо дополнительных наслоений, то можно попробовать вымыть этим шампунем вашего питомца. Кстати, детские шампуни не такие уж мягкие, как кажется на первый взгляд. После применения шампуня необходимо тщательно промыть шерсть у вашего пи-

томца — остатки шампуня могут спровоцировать вспышку сильнейшего кожного зуда и усилить сухость кожи.

Если вы решили применить какие-либо противозудные аллопатические препараты (может быть, вы просто страдаете при виде постоянных мучений вашего питомца!), то по крайней мере постарайтесь избежать применения гормональных препаратов типа преднизона или преднизолона. В подобных случаях меньше вреда принесет назначение антигистаминного препарата бенадрил (*Benadryl*). Старайтесь избегать инъекционных стероидных препаратов типа *Depo-Medrol*, так как они угнетают функцию собственных надпочечников организма. Иногда кошкам с кожными заболеваниями по незнанию назначается овабан (*Ovaban*, синоним — *Megestrol acetate*) — необходимо запомнить, что *данный препарат никогда не следует применять у кошек*, так как он провоцирует возникновение диабета, злокачественных новообразований молочных желез и ряда других тяжелых заболеваний.

Гомеопатические средства для облегчения кожного зуда

Не следует назначать средства для облегчения зуда в тех случаях, когда животные уже получают какое-либо гомеопатическое (конституциональное) средство. Назначайте средства для облегчения зуда только на короткий период времени или чередуйте их. Постоянное применение гомеопатических препаратов может ухудшить состояние животных подобно тому, как это происходит при назначении сильнодействующих аллопатических препаратов. Если в течение нескольких недель ежедневное применение гомеопатических средств не приносит видимого результата, то следует обратиться за помощью к профессионалу-гомеопату.

Apis mellifica

Apis представляет собой гомеопатическое средство, приготовленное из пчелиного яда. Данное средство применяется при интенсивном зуде в сочетании с жжением, причем зуд сопровождается отеком и гиперемией кожи, а также чувством жара, что в целом напоминает картину пчелиного укуса. В некоторых случаях отек может быть генерализованным, кожа при

этом приобретает белый цвет. Возможны также случаи покраснения кожи в сочетании с интенсивным зудом. Зуд обычно усиливается в ночное время. Холодный воздух и купание уменьшают зуд и отек, однако при воздействии этих факторов чувство жара усиливается.

Arsenicum album

Ощущение жжения является характерным для картины симптомов данного средства. Вначале у животных с симптомами *Arsenicum* отмечаются сухость и шелушение кожи в сочетании с зудом, однако при сохранении зуда быстро развивается воспаление кожи с гнойным отделяемым. В некоторых случаях кожный зуд не сопровождается какими-либо высыпаниями. Типичным симптомом у животных этого типа является беспокойство, особенно после полуночи. Обычно такие животные зябкие, однако (парадоксальное явление!) кожный зуд уменьшается при воздействии тепла.

Formica rufa

Данное гомеопатическое средство готовится из красных муравьев – таким образом, легко себе представить характерные особенности зуда, при которых назначение *Formica rufa* является эффективным. Зуд сопровождается покраснением кожи и ощущением жжения, кожа выглядит как будто обожженная крапивой. В слюне красных муравьев содержится муравьиная кислота, за счет которой и развивается зуд. Термин «формикация» (*formication*) или «ощущение ползания мурашек», который раньше использовался в медицине, обозначает специфическое ощущение, как будто по коже какого-либо участка тела разом ползает куча муравьев.

Характерными хроническими симптомами картины данного средства являются также подагра и артриты различной локализации, в основном на правой стороне тела. Если на фоне зуда у вашей собаки отмечаются эти симптомы, то целесообразно подумать о назначении именно *Formica rufa*. Подобно животным с симптомами *Arsenicum* у животных данного типа зуд облегчается от тепла, однако в отличие от *Arsenicum* зуд уменьшается после полуночи.

Ledum palustre

Ledum представляет собой главное гомеопатическое средство при лечении колотых ран и, следовательно, считается полезным при зуде, причиной которого являются укусы блох. Зуд усиливается от тепла, особенно при согревании животных, и облегчается при воздействии холодного воздуха и купания в холодной воде.

Растение багульник, из которого готовится *Ledum*, вызывает появление на коже сыпи, напоминающей сыпь от контакта с ядовитым плющом — следовательно, *Ledum* может излечивать подобную сыпь. При контакте с этими растениями (например, во время прогулки) сыпь на коже у животных возникает редко, однако их семена животные случайно могут принести домой. Назначение *Ledum* эффективно при неравномерной бугристой сыпи красно-белого цвета (как от ядовитого плюща).

Любопытно, что в гомеопатии *Ledum* применяется также и при ревматическом поражении суставов, а в аллопатической медицине для лечения поражений суставов используется пчелиный яд. Следовательно, можно выявить определенную взаимосвязь между заболеваниями суставов и кожи. Ревматоидный артрит, как и большинство кожных заболеваний, имеет аутоиммунный характер. Таким образом, наличие у пациента заболеваний кожи может быть косвенным указанием на возможность заболевания суставов в будущем.

Mezereum

Мне приходилось наблюдать хороший эффект при назначении данного средства животным, у которых кожный зуд не сопровождался другими симптомами. Иногда несчастные создания испытывают буквально неистовый зуд, однако кожа у них выглядит практически нормальной, лишенной каких-либо высыпаний. Зуд усиливается ночью при согревании и при купании в теплой воде; вспышка зуда может спровоцироваться простым прикосновением к коже. Состояние *Mezereum* может возникать после вакцинации.

Rhus toxicodendron

Данное средство готовится из ядовитого плюща. При контакте этого растения с кожей появляется характерная сыпь,

которая сопровождается настолько выраженным зудом, что тот, кто хоть раз испытал это ощущение, никогда его не забудет! В легких случаях появляется неравномерная бугристая сыпь и сильнейший зуд, в тяжелых — образуются пузыри на коже и зуд становится нескончаемым и мучительным вплоть до непереносимого. При воздействии тепла или теплых ванн зуд вначале усиливается, но позже может уменьшиться. Зуд облегчается при продолжающемся движении — именно поэтому животные с симптомами данного средства постоянно перемещаются с места на место, не в силах успокоиться.

Данное средство, так же как и *Ledum*, назначается при заболеваниях суставов и болезнях кожи в сочетании с зудом. Характерной особенностью является улучшение болей в суставах при постоянном движении.

Silicea (Silica)

Silicea является главным средством при поражениях кожи, особенно связанных с вакцинацией. Кожная сыпь часто сопровождается нагноением, что часто приводит к формированию и рецидивам абсцессов. Зуд не столь интенсивный, как у перечисленных выше средств, однако имеет постоянный характер. Животные с симптомами данного средства обычно зябкие и слегка апатичные.

Silicea является глубоко действующим средством, поэтому не следует часто или в течение длительного времени пользоваться им самостоятельно, без указаний ветеринара-гомеопата. В настоящее время назначение данного средства полезно большинству животных из-за значительного объема необходимых вакцинаций.

Urtica urens

Данное гомеопатическое средство готовится из крапивы жгучей. Зуд, характерный для *Urtica urens*, напоминает зуд *Formica rufa*, так как в крапиве содержится муравьиная кислота. Особенностью зуда *Urtica urens* является жжение и ощущение ужаливания. Зуд обычно очень сильный, облегчается при растирании и расчесывании пораженного участка. Усиление зуда отмечается при физической нагрузке, а в покое состояние животных улучшается. На коже возможно возникнове-

ние зудящих пятен красного цвета.

Кроме кожных заболеваний данное средство эффективно при воспалении мочевого пузыря с постоянными позывами к мочеиспусканию, при подагре и артритах, которые чередуются с кожными высыпаниями.

Участки раздражения кожи

Участки раздражения кожи возникают у собак (реже у кошек) в теплое время года, когда обычно появляются симптомы аллергии на укусы блох, пыльцу растений и т. п. Основным симптомом заболевания является сильнейший зуд, который заставляет собак расчесывать зудящий участок вплоть до образования болезненных поверхностных ран, лишенных шерсти. Эти раны быстро инфицируются с образованием корочек и гнойного отделяемого с неприятным запахом. После образования поверхностных ран зуд не уменьшается, поэтому собаки часто расчесывают участки раздражения кожи до крови, несмотря на выраженные болевые ощущения.

Особенности наблюдения и ухода за животными с участками раздражения кожи

Образование поверхностных ран в области участков раздражения кожи не представляет собой опасности для жизни животного, однако эти раны иногда имеют значительные размеры и трудно поддаются лечению. При назначении подобного гомеопатического средства, однако, заживление этих ран происходит удивительно быстро. Традиционное назначение антибиотиков мне представляется нецелесообразным в большинстве случаев, так как при правильном уходе и лечении поверхностные инфицированные раны обычно заживают без применения сильнодействующих медикаментов, к которым относятся и антибиотики.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару, если отмечается выраженная болезненность в области раны, быстрое увеличение ее размеров и отсутствие положительной динамики в течение двух-трех дней после назначения гомеопатических средств.

Первым мероприятием при лечении поверхностных ран, которые образуются вследствие раздражения и расчесывания кожи, является удаление остатков шерсти в области раны и по

ее периферии. За счет гнояного отделяемого остатки шерсти приклеиваются ко дну раны и склеиваются между собой, образуя плотные корки, что в итоге способствует дальнейшему развитию инфекции. Для стрижки шерсти лучше всего пользоваться электрической машинкой, однако необходимо часто прочищать лезвие и следить за тем, чтобы нагретое лезвие не травмировало чувствительную кожу. В некоторых случаях стрижка шерсти может даже способствовать дальнейшему увеличению участка раздражения кожи, поэтому это мероприятие следует проводить очень аккуратно. Можно также пользоваться ножницами, но с большой осторожностью – вероятность травматизации кожи увеличивается. Для животных стрижка шерсти вокруг раны – процесс болезненный и крайне неприятный, однако это мероприятие является необходимым шагом в лечении поверхностных ран. Я бы порекомендовал до удаления шерсти оросить рану раствором прополиса, так как прополис снижает местную болевую чувствительность и несколько облегчает неприятные ощущения.

После удаления шерсти можно приступать к систематическому промыванию поверхностных ран. Для этой цели я обычно использую настойку лесного ореха, обладающую антисептическими и вяжущими свойствами. В состав этой настойки входит некоторое количество спирта, но обычно спирт не резко усиливает жжение и болевые ощущения, а за счет вяжущего действия удаётся относительно безболезненно удалить корочки – и процесс заживления ран идет намного быстрее. Кроме того, в состав настойки входит *Aloe vera*, также обладающий антисептическими свойствами; комбинация этих средств представляется мне весьма удачной и эффективной при местном применении. Возможно промывание ран также кипяченой водой и мягким (неедким) мылом, однако мыло не обладает вяжущими свойствами и трудно смывается с поверхности раны; в целом эта манипуляция для животных весьма болезненна. Для промывания ран можно пользоваться также йодсодержащими аптечными препаратами, но это достаточно грубый метод лечения.

После промывания ран следует наложить повязку с настоем *Calendula* или *Hypericum*, обладающими мягким антибактериальным действием. Для повязок лучше пользоваться настоем этих средств, приготовленным в домашних условиях, а не офи-

цинальными настойками, в состав которых входит значительное количество спирта. Промывание ран следует проводить по мере необходимости, но не менее трех раз в день; после каждого промывания ран следует накладывать повязку с антисептическими средствами. Промывание ран настойкой лесного ореха проводится один раз в день; более частое применение данного лекарства может привести к раздражению ран.

Гомеопатические средства при лечении участков раздражения кожи

Apis mellifica

См. описание средства в разделе «Зуд». Для данного препарата характерна отечность участков раздражения кожи и чрезвычайная чувствительность к прикосновению (как при пчелиных укусах). Цвет этих участков может варьировать от различных оттенков красного до белого.

Belladonna

Для данного средства характерно внезапное начало и быстрое развитие симптомов (на фоне длительно существующего кожного зуда процесс формирования поверхностных ран происходит очень быстро — буквально за одну ночь). Участки раздражения кожи ярко-красные и блестящие; у животных с симптомами *Belladonna* обычно развивается жар, тахикардия, раздражительность и беспокойство. Агрессивность и расширение зрачков наблюдаются только в тяжелых случаях. Кожные покровы у собак с симптомами *Belladonna* горячие на ощупь; они не переносят тепло и обычно испытывают сильную жажду — в отличие от животных с симптомами *Apis*, для которых жажда не характерна. Однако в некоторых случаях животные с картиной *Belladonna* также не испытывают жажды.

Graphites

Для данного средства характерно липкое раневое отделяемое желтоватого или медового цвета и трещины по периферии кожных ран. Участки раздражения обычно локализуются в области кожных складок или суставных поверхностей на конечностях. Животные с симптомами данного средства обычно

зябкие, однако тепло ухудшает их состояние, усиливая зуд и высыпания. Типичный симптом *Graphites* – избыточный вес животных.

Hepar sulphuris calcareum

Симптомы данного средства напоминают симптомы *Graphites* – участки раздражения также обычно располагаются в области кожных складок и сопровождаются раневым отделяемым, имеющим чрезвычайно зловонный запах. Участки раздражения кожи, как правило, очень болезненны – именно поэтому животные с симптомами *Hepar sulphuris calcareum* боятся любых прикосновений и, защищаясь, могут даже проявлять агрессию. В типичных случаях эти животные зябкие; воздействие тепла облегчает их состояние.

Mercurius (vivus или solubilis)

У животных с симптомами данного средства часто отмечается углубление поверхностных ран, которые образуются на месте участков раздражения кожи, вплоть до формирования изъязвлений с инфицированным отделяемым зеленоватого цвета и желтоватыми корочками. На поверхностных ранах могут образовываться мелкие гнойнички, что сопровождается увеличением региональных лимфоузлов. У животных с симптомами *Mercurius* обычно выражена раздражительность, особенно при попытке осмотреть раны – эти животные никому не доверяют, считая окружающих своими врагами. Поражение кожи нередко сопровождается слюнотечением и диареей. Картина симптомов *Mercurius corrosivus* чаще отмечается у особей мужского пола.

Nitricum acidum

Обычно участки раздражения кожи у животных с симптомами данного средства склонны к изъязвлению и выглядят как сырое мясо. Раны легко кровоточат и чрезвычайно болезненны, что напоминает раны *Hepar sulphuris*. Люди обычно описывают боли при такого типа ранах как «боли от занозы». Одним из типичных симптомов является раздражительность этих животных именно из-за сильной болезненности в области ран. В целом раздражительность характерна для большинства гомеопатических средств, которые назначаются при лечении

участков раздражения кожи. Для ран *Nitricum acidum* характерно ухудшение от воздействия холода и улучшение от применения теплых компрессов.

Rhus toxicodendron

Типичными симптомами животных *Rhus* является зуд в области участков раздражения кожи (а не боль, как у большинства средств) и неровная, бугристая раневая поверхность. Отмечается утолщение и сухость кожи с участками шелушения, а также инфицирование поверхностных ран. Зуд уменьшается при воздействии горячей воды на участок раздражения и усиливается при воздействии холодной воды. Кроме того, обычно движение уменьшает зуд, поэтому животные с симптомами данного средства постоянно перемещаются с места на место. Участки раздражения кожи обычно сочетаются с тугоподвижностью суставов, которая уменьшается при движении.

Воспаление сальных желез (акне)

Воспаление сальных желез обычно наблюдается у кошек оранжевой или желтой окраски (и реже у кошек с шерстью другого цвета). Воспаление чаще всего локализуется в области подбородка и представляет собой один из симптомов глубокого хронического заболевания. По моему мнению, данное заболевание следует лечить не самостоятельно, а по назначениям профессионального гомеопата. Начальные симптомы этого заболевания часто напоминают симптомы образования поверхностных ран в области участков раздражения кожи — именно поэтому на ранней стадии вполне оправданно назначение гомеопатических средств, описанных в разделе «Участки раздражения кожи», и выполнение общих рекомендаций по уходу за ранами. Даже если вам удалось успешно вылечить воспаление сальных желез вашего питомца, то после ликвидации симптомов острого воспаления все же следует обратиться к гомеопату для лечения лежащего в основе хронического заболевания.

Одним из важных факторов излечения данного заболевания является полноценное питание животных. Кроме того, иногда отмечается выраженное раздражение кожи подбородка у кошек при кормлении из посуды, сделанной из некоторых видов пластмасс. Несколько раз мне приходилось наблюдать, как

простая смена пластмассовой посуды на керамическую или стеклянную приводит к удивительно быстрому и полному излечению. Для кормления ваших питомцев можно также использовать посуду из нержавеющей стали, однако следует быть осторожными и не покупать для этой цели дешевые миски — иногда в состав сплавов, из которых делают дешевую посуду, входят примеси тяжелых металлов, обладающие токсическим действием.

Парша

Термин «парша» ошибочно применяется для описания собак неопрятного вида и с плохим состоянием здоровья. На самом деле парша представляет собой заболевание кожи, которое вызывается двумя видами клещей. Первый вид клещей известен под названием «чесоточный клещ»; обычно поражение кожи чесоточными клещами отмечается у бродячих щенков, однако отмечены случаи заболевания и взрослых особей. Данное заболевание чрезвычайно контагиозно, поэтому при общении с такими животными необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Основным симптомом поражения кожи чесоточными клещами является постоянный жестокий зуд; зуд возникает из-за того, что клещи прокладывают ходы в толще кожи, что вызывает постоянное раздражение пораженных участков. Чаще всего инвазия клещами наблюдается в околоушных областях и на коже передней брюшной стенки, причем участки пораженной кожи обычно холодные на ощупь. Животные постоянно расчесывают зудящие участки, особенно уши, вплоть до образования ран и корочек, причем расчесывание провоцируется даже легким прикосновением к коже. Возможна транзиторная инвазия людей этим типом клещей, однако в толще кожи человека они не размножаются. Обычно заболевание у людей ограничивается несколькими укусами, наличием ограниченных гиперемизированных участков и зудом. Специального лечения у людей не требуется.

Традиционное лечение парши, вызванной чесоточными клещами, заключается в погружении животных в водный раствор сильнодействующих инсектицидов. Однако, по моему мнению, следует по возможности избегать такого метода «лечения» и вначале попробовать более безопасные средства. Прежде всего

необходимо полноценное питание заболевших животных с достаточным количеством свежего мяса и витаминов. Эффективным методом местного лечения является смазывание пораженных участков кожи смесью лавандового и миндального масла в соотношении 1:10². Кроме того, весьма эффективны компрессы из настоя конского щавеля, которые следует накладывать ежедневно в течение 2–3 недель. После улучшения состояния можно постепенно уменьшить количество процедур до 2–3 раз в неделю. Если же эти средства не помогают, то, прежде чем перейти к применению сильных инсектицидов, можно попробовать вымыть животных с шампунем, в составе которого имеется пиретрин (*Pyrethrin*).

Второй тип парши, или демодекоз, называется также фолликулярной или красной паршой. Чаще всего данным типом парши поражаются собаки в возрасте 9–12 месяцев, причем поражение локализуется равномерно по всему телу. Основной причиной этого заболевания является нарушение функции иммунной системы. Мне приходилось множество раз наблюдать симптомы демодекоза у собак породы чау-чау. Кроме того, ко мне на прием неоднократно приводили собак, у которых стремительное ухудшение состояния и распространение парши происходило вскоре после вакцинации, так как введение в организм животных любых вакцин приводит к выраженному угнетению иммунитета. Первые признаки демодекоза появляются обычно на коже в области глазниц и постепенно распространяются на область головы и другие участки тела. В области поражения отмечается легкий зуд, выпадение шерсти и гиперемия кожи. У большинства собак заболевание купируется самостоятельно по мере их роста и укрепления иммунной системы.

Тем не менее у некоторых собак самостоятельного излечения не происходит; постепенно поражение распространяется по всей поверхности кожи и приводит к значительному ухудшению здоровья, угнетению иммунитета и нарушению функции жизненно важных органов и систем организма. Такой тип течения болезни называется генерализованным демодекозом и представляет собой чрезвычайно тяжелое состояние, требующее специального лечения. В особо тяжелых случаях приходится прибегать к эвтаназии.

При традиционном лечении демодекоза применяются более

сильные инсектициды, чем при парше первого типа. Все эти средства значительно подавляют иммунитет — возможно, что именно по этой причине лечение часто бывает неудачным. По моему мнению, основой лечения демодикоза является укрепление иммунной системы за счет полноценного питания и применения витаминов (см. раздел «Особенности наблюдения и лечения животных, страдающих зудом»). Хорошими иммуностимуляторами растительного происхождения являются настои эхинацеи, астрагала и кошачьего когтя. Собакам весом до 25 фунтов назначается четверть «человеческой дозы», собакам весом 25–50 фунтов — половина «человеческой», а более крупным животным — полная «человеческая» доза настоя этих трав. Максимальный эффект достигается при чередовании настоев трав, причем каждое из этих средств следует применять 2–3 недели. Кроме того, при необходимости настои календулы, конского щавеля и эхинацеи используются для местного применения.

Лечение случаев генерализованного демодикоза достаточно длительное — от нескольких недель до нескольких месяцев — и проводится на фоне полноценного питания, витаминотерапии и применения растительных средств, укрепляющих иммунитет. В этом разделе описываются некоторые гомеопатические средства для лечения демодикоза. Наиболее эффективное лекарство можно подобрать опытным путем, чередуя их, однако, не следует забывать, что одновременное назначение нескольких гомеопатических средств недопустимо. При гомеопатическом лечении данного заболевания общие симптомы не имеют особого значения, так как в основе заболевания лежит местное поражение кожи. Если вам трудно сразу определить нужное средство, то целесообразно начать лечение с назначения *Silicea*, затем попробовать *Sulphur* или *Psorinum*. Однако в тех случаях, когда ваши назначения не дают желаемого результата, следует обратиться к ветеринару-гомеопату.

Гомеопатические средства при лечении парши

Psorinum

Данное средство готовится из чесоточного клеща — возбудителя чесотки у людей. По моему мнению, данное средство эффек-

тивно при парше обоих видов. У собак с симптомами данного средства обычно отмечается чрезвычайно сильный специфический запах, жирная кожа и зябкость. *Psorinum* следует назначать в разведении 30С один раз в неделю. В некоторых гомеопатических аптеках данное средство продается только по рецепту.

Silicea (Silica)

Нередко при лечении парши назначение данного средства является необходимым, что связано с его антивакцинозным действием — как известно, вакцинация угнетает функцию иммунной системы. В некоторых случаях назначение *Silicea* целесообразно чередовать с назначением *Psorinum* и *Sulphur*, причем следует применять данное средство до тех пор, пока оно работает, а затем назначать следующее.

Sulphur

При инвазии кожными паразитами применение *Sulphur* также вполне оправданно. Собаки с симптомами данного средства обычно неопрятные и грязные, однако не в такой степени, как собаки с симптомами *Psorinum*. Как правило, они и менее зябкие; типичным симптомом является выраженная жажда.

Укусы и ужаливания

Укусы пауков, а также ужаливания пчелами и осами наблюдаются у кошек и собак достаточно редко. Обычно эти укусы проходят без последствий и без специального лечения, однако в отдельных случаях может потребоваться помощь ветеринара. Особенно опасно быстрое развитие отека мягких тканей при укусах и ужаливаниях в области морды (см. раздел «Аллергические реакции» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях»).

Особенности наблюдения за животными при укусах и ужаливаниях

В случаях быстрого нарастания отека мягких тканей в области укуса или ужаливания, а также при развитии нарушений дыхания вашему питомцу необходима немедленная помощь ветеринара, так как отек дыхательных путей может привести к смертельному исходу. Такое встречается достаточ-

но редко, однако не следует забывать о таком грозном осложнении. До прихода ветеринара или до отъезда в ветеринарную лечебницу можно дать вашему питомцу одно из средств, перечисленных в данном разделе. Можно также назначить антигистаминный препарат бенадрил (*Benadryl*) в дозе 1–2 мг/фунт веса животного. *Однако не забывайте, что эти средства не заменяют экстренной ветеринарной помощи.*

Старинным народным средством для облегчения отека и болезненности после укусов и ужаливаний является кашлица из табачных листьев — листья табака надо мелко растолочь, залить небольшим количеством воды и приложить кашлицу к месту укуса. Настой одуванчика при пероральном применении действует как диуретик, способствуя уменьшению отека.

Гомеопатические средства при укусах и ужаливаниях

Apis mellifica

Данное средство готовится из пчелиного яда. Картина симптомов *Apis* напоминает картину симптомов пчелиного укуса. Оно часто рекомендуется как средство первой помощи при пчелиных укусах, однако, по моему мнению, работает далеко не во всех случаях. Тем не менее при типичной картине пчелиного укуса следует подумать о его назначении, особенно когда укус сопровождается развитием ненапряженного отека, ярко-красной окраской области отека с белой каймой по границе отека тканей. Кроме того, назначение данного средства эффективно при отекаемости тканей лицевого черепа и выраженном отеке по периферии ран.

Arnica montana

Мне не приходилось применять данное средство при пчелиных или осиных укусах, однако, по словам известного гомеопата Маргарет Тайлер, «одна капля настойки *Arnica*, нанесенная на место осинового укуса, сразу же ликвидирует все симптомы»³.

Cantharis

Следует подумать о назначении данного средства при выраженном воспалении и образовании пузырей в области укуса,

что в целом напоминает по внешнему виду ожоговую поверхность.

Carbolicum acidum

У животных с симптомами данного средства помимо местных проявлений отмечаются выраженные общие симптомы на укусы насекомых в виде слабости, развития коллаптоидного состояния, отека морды и дыхательных нарушений. Часто подобное состояние сочетается с выраженным зудом и высыпаниями на коже всего тела.

Lachesis

У животных с симптомами *Lachesis* область укуса обычно очень болезненна и приобретает темно-багровый цвет. Данное средство полезно при старых укусах без тенденции к излечению, когда присоединяется инфекция или отмечается кровоточивость места укуса с истечением темной багровой крови. По моему убеждению, *Lachesis* и *Ledum* являются наилучшими гомеопатическими препаратами при пчелиных укусах; кроме того, вполне оправданно назначение этих средств при укусах пауков.

Ledum palustre

Ledum является главным гомеопатическим средством при лечении колотых ран, к которым, в сущности, и относятся укусы и ужаливания. Область укуса обычно холодная на ощупь, однако холодные компрессы улучшают симптомы. По моему глубокому убеждению, именно *Ledum palustre* следует назначать при укусах и ужаливаниях в качестве первоочередного средства, несмотря на то, что картина симптомов может указывать на иное гомеопатическое лекарство.

Tarentula cubensis

Данное средство готовится из яда кубинского паука. Назначение *Tarentula cubensis* показано при укусах пауков и ужаливаниях насекомыми в тех случаях, когда область укуса приобретает темно-красный цвет и развивается вторичная инфекция. Характерной особенностью является выраженная болезненность области укуса при прикосновении. В целом симптомы *Tarentula cubensis* во многом схожи с симптомами *Lachesis*,

однако боли у *Tarentula* намного интенсивнее. Не следует путать данное средство с *Tarentula hispanica*.

Ожоги пламенем и кипятком

Особенности наблюдения за животными с ожоговой травмой

Во всех случаях ожогов, особенно при значительной площади поражения, следует безотлагательно обращаться за ветеринарной помощью. В зависимости от глубины поражения кожи различаются ожоги трех степеней (В отечественной комбустиологии принята четырехстепенная классификация ожогов. — *Прим. перев.*). При ожогах первой степени поражается поверхностный слой кожи, основным симптомом поражения является гиперемия обожженного участка. При ожогах второй степени основным симптомом поражения является образование тонкостенных пузырей. При ожогах третьей степени поражаются глуболежащие слои кожи с образованием толстостенных пузырей, которые самопроизвольно вскрываются с обнажением дермы и образованием открытых ожоговых ран. Ожоги первой и второй степени небольшой площади вполне допустимо лечить самостоятельно, однако при глубоких ожогах или значительной площади поражения необходим осмотр ветеринара. Лечение ожоговых ран теми препаратами, которые предложит вам ветеринар, целесообразно проводить на фоне назначения одного из гомеопатических средств, описанных в данном разделе.

Характерным симптомом ожога является острое воспаление пораженных слоев кожи вследствие воздействия термического агента и некоторых биологически активных веществ, которые поступают в ткани из разрушенных клеток. В зоне ожога отмечается усиление кровотока, благодаря которому в пораженные ткани поступает значительное количество питательных веществ и клетки иммунной системы — именно так организм стремится ускорить процесс заживления ожоговой раны. При оказании первой помощи при ожогах традиционно принято орошение ожоговой поверхности холодной водой — это уменьшает боли, однако в некоторых случаях значительно ухудшает симптомы и провоцирует более тяжелое течение ожоговой травмы. В соответствии с основным принципом гомеопатии, сформули-

рованным Ганеманом, — «подобное лечится подобным» — при оказании первой помощи следует провести орошение ожоговой поверхности не холодной, а допустимо горячей водой. На первый взгляд это кажется просто невозможным, однако мне неоднократно приходилось наблюдать, что орошение ожоговой поверхности горячей водой при оказании первой помощи намного эффективнее, несмотря на кратковременное усиление болей. Дело в том, что при воздействии горячей воды происходит активизация кровообращения в зоне ожога и стимуляция процессов заживления ран. Можете испытать данный метод на себе — однако только при солнечном ожоге или ожоге иной этиологии небольшой площади.

Гомеопатические средства для лечения ожогов

Arsenicum album

Данное средство более подходит для лечения состояний с ощущением жжения, чем для реальных ожогов. Тем не менее назначение *Arsenicum* при ожогах эффективно в тех случаях, когда картина симптомов у животных с ожоговой травмой соответствует триаде основных симптомов данного средства (зябкость, беспокойство и жажда). В области ожоговых ран отмечается значительный отек, воспаление и сильная болезненность. В некоторых случаях целесообразно применение данного средства при глубоких ожоговых ранах. У животных *Arsenicum* часто отмечается сильнейшая вялость, которая не соответствует тяжести ожоговой травмы. Характерным симптомом *Arsenicum* является улучшение состояния после местного применения теплых аппликаций.

Cantharis

При ожогах пламенем или кипятком у животных в первую очередь следует подумать о назначении именно этого препарата; особенно эффективно назначение *Cantharis* сразу же после ожоговой травмы, до образования пузырей — однако и после образования пузырей прием данного средства вполне оправдан. Положительный эффект данного средства отмечается также и при солнечных ожогах, поэтому назначать *Cantharis* можно при ожогах кончиков ушей у кошек (однако кошки с поражениями

такого типа скорее нуждаются в назначении конституционального лекарства для снижения чувствительности кожи). Характерным симптомом данного препарата является выраженное напряжение при мочеиспускании и гиперсексуальное поведение. У животных с симптомами *Cantharis* холодная вода обычно уменьшает боли в ожоговой ране (см. раздел «Особенности наблюдения за животными с ожоговой травмой»).

Causticum

Обычно данное средство назначается при общем плохом состоянии здоровья, однако в некоторых случаях ожоговой травмы его назначение вполне целесообразно. Симптоматике *Causticum* соответствуют длительно незаживающие, старые ожоговые раны, которые то заживают за счет рубцевания, то открываются вновь. Животные с симптомами данного средства обычно зябкие, вялые и медлительные — возможно, что эти симптомы обусловлены длительным существованием ожоговой раны.

Urtica urens

При местном применении при ожогах первой степени настоем крапивы (*Urtica urens*) способствует быстрому уменьшению боли и ликвидации воспалительной реакции. Пероральное применение гомеопатического средства *Urtica urens* также является эффективным. У животных с симптомами данного препарата отмечается зуд и выраженная болезненность в области ожоговых ран.

Дерматомикоз

Дерматомикоз представляет собой поражение кожных покровов, вызванное грибками. В типичных случаях отмечается поражение кожи в виде участков округлой формы с полным отсутствием шерсти; у животных в зоне поражения наблюдается легкий зуд и образование корочек на поверхности сухой кожи. Дерматомикоз является контагиозным заболеванием, поэтому при общении с такими животными необходимо предпринимать некоторые меры предосторожности (обычно достаточно хорошо вымыть руки с мылом). У людей дерматомикоз проявляется в виде гиперемизированных зудящих участков кожи, по-

крытых корочками. Из-за возможности заражения диагноз данного заболевания у вашего питомца следует подтвердить при микроскопическом исследовании.

Дерматомикоз может быть как локальным заболеванием, так и признаком системных болезней. При локальном процессе у животных обычно поражается небольшой участок кожи, причем дерматомикоз как правило хорошо поддается лечению. Если же дерматомикоз является признаком системного заболевания, то, как правило, отмечается множественное поражение кожи — в этих случаях необходимо достаточно длительное лечение с назначением конституциональных средств. У кошек, живущих в питомниках, инфекции подобного рода отмечаются достаточно часто — возможно, вследствие эмоциональных стрессов, близкородственного скрещивания (что неизбежно приводит к слабости иммунной системы), неполноценного питания, вакцинации или сочетания всех перечисленных факторов. При дерматомикозе как симптоме хронического заболевания лечение лучше доверить профессионалу-гомеопату. Мне несколько раз удалось добиться хорошего эффекта при назначении *Thuja* — если у вашего питомца дерматомикоз представляет собой один из симптомов хронического заболевания, то попробуйте назначить это средство в разведении 30С один раз в неделю в течение трех недель. Факт воздействия *Thuja* при дерматомикозе подобного типа представляется мне очень интересным — данное лекарство обладает выраженным антивакцинозным воздействием, следовательно, логично предположить, что одной из причин развития дерматомикоза у животных могут быть вакцинации.

Если поражение дерматомикозом ограничивается небольшим участком кожи, то можно попробовать местное лечение. Не следует забывать о мерах предосторожности при лечении вашего питомца (кстати, кошки страдают дерматомикозом значительно чаще собак). Хорошим противогрибковым действием обладает масло чайного дерева (*Tea tree oil*). В некоторых случаях это средство может вызвать раздражение кожи, поэтому его следует применять в составе смеси для местного применения (пол-унции оливкового масла, 200 МЕ витамина Е и половину чайной ложки масла чайного дерева). Данная смесь наносится на пораженный участок кожи один раз в день в тече-

ние трех-шести недель. Следует отметить, что у высококачественных сортов масла чайного дерева раздражающее действие выражено значительно меньше. При ограниченных поражениях кожи данную смесь можно применять и у людей. В некоторых случаях хороший эффект отмечается при местном применении настойки *Calendula* или при чередовании настойки *Calendula* с маслом чайного дерева. До начала лечения обязательно надо выстричь шерсть по периферии очага поражения, так как именно в этой зоне наиболее активно идет процесс размножения грибка.

Если местное лечение не приносит желаемого результата (на фоне назначения *Thuja* или без этого средства) и процесс распространяется дальше, то непременно следует обратиться за помощью к профессионалу-гомеопату.

ЗАБОЛЕВАНИЯ УШЕЙ

Большинство заболеваний наружного уха у животных, так же как и большинство кожных заболеваний, представляют собой внешние проявления глубоких хронических болезней. В подобных случаях местное лечение приносит лишь временное облегчение. По мнению традиционных ветеринаров, причиной заболеваний наружного уха и образования серных пробок является инфекция; на самом же деле бактериальное поражение наружного уха у животных встречается достаточно редко — только в тех случаях, когда имеется значительная слабость иммунитета. Возбудителями воспалительных заболеваний уха являются те же самые бактерии или грибки, которые в норме всегда живут на коже организма-хозяина. Однако у здоровых животных никогда не происходит «бесконтрольного» размножения микроорганизмов и значительного увеличения их общей массы — иначе все представители животного мира постоянно страдали бы от воспалительных заболеваний различных органов.

Местное лечение заболеваний наружного уха может облегчить симптомы, но никогда не приводит к полному излечению. Эффективное местное лечение возможно только в тех случаях, когда воспалительный процесс ограничен областью травмы наружного уха или областью внедрения инородного тела (напри-

мер, колючек лисохвоста). Как и при лечении кожных заболеваний, невозможность излечить заболевания уха только с помощью местных средств вызывает у врачей-ветеринаров чувство фрустрации и разочарования. Кроме того, отмечается несомненная связь между заболеваниями уха и болезнями головного мозга. Подавление симптомов заболевания уха может закончиться развитием заболевания головного мозга, а возобновление выделений из уха может привести к излечению заболевания головного мозга. При повторном подавлении выделений из уха может вновь развиться заболевание головного мозга (см. описание заболевания у Долли в гл. 3 «Природа излечения»).

По моему мнению, при всех заболеваниях ушей у животных (за редким исключением легких случаев) следует обращаться к профессионалу-гомеопату, так как обычно эти симптомы представляют собой проявление глубоких и серьезных хронических болезней — несмотря на то, что на первый взгляд заболевание ушей у вашего питомца может показаться чем-то временным и не представляющим никакой опасности. Если же вы пропустили при чтении первую часть данной главы, то, наверное, все же следует ее прочесть — именно там объясняется, почему заболевания кожи и ушей имеют между собой так много общего.

Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями ушей

Промывание ушей отварами и настоями некоторых растительных средств поможет организму животных избавиться от чрезмерного количества микроорганизмов в области ушной раковины и слухового прохода и, возможно, от некоторых токсинов. Плотные и большие серные пробки можно попробовать растворить, применяя масляные смеси. Я обычно рекомендую применять смесь из половины унции оливкового масла, 200 МЕ витамина Е и четверти чайной ложки масла чайного дерева — это хорошее средство для ухода за ушами у животных, обладающее свойствами слабого антисептика. Однако в редких случаях при повышенной чувствительности к маслу чайного дерева возможно раздражение кожи ушей. Можно также применять отвар чеснока или медвежьих ушек (бот. *Verbascum*). Кроме того, можно использовать другие смеси с оливковым маслом или просто оливковое масло, закапывая их перед купанием, чтобы вода не

проникала в наружный слуховой проход. Если серные пробки не такие уж плотные, то можно промывать уши у животных слабым раствором уксуса (5–25% – или меньшей концентрации при раздражении кожи ушей). Этим же раствором можно промывать уши после купания – раствор также обладает слабым антисептическим и антигрибковым действием. Эффективным является промывание ушей раствором *Hypericum*, так как это средство также обладает слабым антисептическим действием, успокаивает боли и раздражение кожи.

Следует избегать применения растворов, в состав которых входят сильные антисептики или антибиотики, а также мазей и растворов, содержащих стероидные препараты. Все эти сильные средства, особенно стероиды, способствуют подавлению симптомов.

Ушные клещи

Поражение наружного уха клещами более характерно для кошек, однако изредка встречается и у собак. Инвазия клещами сопровождается настолько сильным зудом, что котята и взрослые животные безжалостно расчесывают уши вплоть до образования ран. Зуд и расчесывание кожи провоцируется даже легким прикосновением или попыткой наложения какого-либо местного средства. Из-за малых размеров без специальной лупы рассмотреть клещей невозможно, поэтому при первом подозрении на инвазию клещами животных необходимо показать ветеринару. Симптомами этого заболевания являются постоянный зуд и выделение из наружного слухового прохода значительного количества темно-коричневой ушной серы. Однако я рекомендую все же провести обследование у ветеринара, так как при некоторых других заболеваниях ушей у животных могут развиваться те же симптомы.

При инвазии ушными клещами необходимо в основном местное лечение. Избавиться от клещей эффективно помогает масло орегано – половина чайной ложки масла орегано смешивается с 0,5–1 унцией оливкового масла и настаивается в течение 24–48 часов. Эффективно также закапывание в уши настоя конского щавеля. Для приготовления этого настоя полную чайную ложку сухого сырья нужно залить 100 мл кипятка, охладить и затем процедить полученный раствор; в оба уха за-

капывается по полной пипетке настоя 1–2 раза в день. Настой конского щавеля обладает свойством значительно уменьшать зуд⁴. Можно чередовать применение масла орегано с закапыванием настоя конского щавеля. Я не рекомендую при этом заболевании применять смесь масла чайного дерева с оливковым маслом из-за его раздражающего действия на воспаленные ткани ушной раковины.

Если клещевая инвазия сохраняется несмотря на местное лечение, то чаще всего это свидетельствует либо о глубоких нарушениях иммунитета у кошки, либо о реинфекции при контакте с другими животными с тем же заболеванием. В подобных случаях необходимо осмотреть и вылечить всех животных в доме. Если же источник повторного инфицирования обнаружить не удалось, то, следовательно, ваша кошка нуждается в лечении глубоких хронических нарушений иммунитета. Попробуйте в качестве первого шага назначить ей *Sulphur*; однако, если эффекта не отмечается, следует обратиться за помощью к профессионалу-гомеопату.

Лисохвост и инородные тела наружного слухового прохода

Лисохвостом называется определенный вид луговой травы, распространенный в основном в западных штатах; семена лисохвоста, снабженные колючками, запутываются в шерсти домашних и диких животных и переносятся на значительные расстояния. В редких случаях, внедряясь в наружный слуховой проход, колючки вызывают раздражение кожи слухового прохода, интенсивные боли и развитие воспаления с присоединением вторичной бактериальной инфекции. Возможна даже пенетрация колючек в область барабанной перепонки. Колючки лисохвоста могут внедряться в кожу в области носа и глаз, где также быстро развивается воспалительная реакция. Кроме того, выраженные болевые ощущения возникают у животных при проникновении колючек лисохвоста в межпальцевые промежутки. Следует тщательно осматривать кожные покровы и уши животных после прогулки по местам произрастания этой травы и удалять все колючки с шерсти до того, как они внедрятся в кожу. Осмотр ушей животных надо провести при первых признаках выделений или болезненности. Удаление колю-

чек, внедрившихся в кожу, не следует производить самостоятельно – потребуется помощь ветеринара и, возможно, местная анестезия. Некоторые гомеопатические средства обладают способностью удалять инородные тела, какими фактически и являются семена лисохвоста, *однако не следует подменять осмотр и помощь ветеринара гомеопатическим лечением* – в данном случае гомеопатические средства помогут лишь облегчить состояние вашего питомца.

Myristica sebifera

Myristica является замечательным средством для удаления внедрившихся инородных тел. Назначение данного препарата а во многих случаях помогает организму своими силами, «без ножа» избавиться от инородных тел, в том числе от заноз и от колючек лисохвоста. Уникальные свойства *Myristica* позволили гомеопатам называть его «гомеопатическим скальпелем».

Silicea (Silica)

Silicea является главным гомеопатическим средством для удаления заноз и иных типов инородных тел, причем приобрести его гораздо легче, чем *Myristica*, так как оно представляет собой одно из наиболее распространенных гомеопатических лекарств. Способность удаления инородных тел является одним из удивительных и замечательных свойств *Silicea*.

Ушные гематомы

Ушные гематомы – достаточно редкое заболевание; внезапно, без видимой причины слуховой проход у животных заполняется кровью. Чаще страдают собаки, однако пару раз я наблюдал подобное и у кошек. Обычно считается, что ушные гематомы возникают либо вследствие инфекций в области наружного слухового прохода, либо из-за интенсивного сотрясения ушей, от которого повреждаются сосуды ушной раковины. Однако в настоящее время ушные гематомы рассматриваются чаще как аутоиммунное заболевание – бич XX в. При аутоиммунных процессах клетки иммунной системы атакуют ткани и органы своего собственного организма – в данном случае венозные кровеносные сосуды ушных раковин, что приводит к нарушению целостности сосудистой стенки, ее разрыву и кровоте-

чению в полость слухового прохода. Кроме того, при образовании ушных гематом нарушается физиологический процесс образования тромба в области поврежденной сосудистой стенки. Таким образом, основной причиной образования ушных гематом является слабость иммунной системы и склонность к кровотечениям. В некоторых случаях интенсивное встряхивание ушами действительно может стать поводом для разрыва сосуда; однако истинная причина этого заболевания заключается в изначальной слабости сосудистой стенки. Возможно, что действительная причина болезни станет понятнее, если мы зададим себе простой вопрос: «Почему гематома в области слухового прохода возникла именно у этой собаки?» На самом деле ушные гематомы представляют собой проявление глубоких хронических болезней, у практически здоровых животных самопроизвольный разрыв сосуда вряд ли возможен (см. раздел «Кожные инфекции и высыпания на коже» в данной главе и в гл. 2 «Природа болезни»).

Часто симптомы локальных нарушений на самом деле представляют собой внешние проявления глубоких хронических болезней. Именно поэтому при возникновении ушных гематом я рекомендую назначение конституциональных средств. Традиционное лечение данного заболевания заключается в удалении крови из наружного слухового прохода и ушивании кровоточащего сосуда специальным «матрасным» швом. При гематомах небольшого объема в некоторых случаях можно обойтись и без операции, однако при разрыве сосуда большого диаметра, конечно, необходимо хирургическое вмешательство. Разобраться в том, какое именно лечение следует назначить в каждом конкретном случае, вам поможет профессионал-гомеопат. В данном разделе приводится список гомеопатических средств для лечения ушных гематом. Однако не следует забывать, что необходимо обратиться к ветеринару или ветеринару-гомеопату в тех случаях, когда не происходит быстрого улучшения состояния вашего питомца.

Belladonna

Состояние, соответствующее данному средству, развивается всегда внезапно и сопровождается ощущением жара. У собак *Belladonna* быстро, без видимой причины происходит заполне-

ние наружного слухового прохода кровью, при этом ушная раковина со стороны поражения становится гиперемированной и горячей на ощупь. Развитие данного состояния у собак обычно сочетается с выраженным беспокойством, раздражительностью и вспышками агрессивного поведения, причем при эпизодах агрессии может наблюдаться расширение зрачков. Характерной особенностью данного средства является преобладание правостороннего поражения.

Crotalus horridus

Данное средство готовится из яда гремучей змеи. Для большинства средств, приготовленных из яда змеи, в том числе и для *Crotalus*, характерна склонность к кровотечениям. У животных с симптомами этого препарата преимущественно поражается правое ухо. Для животных с симптомами *Crotalus* характерна общая слабость, вялость и склонность к тяжелым хроническим заболеваниям. Как правило, данное лекарство назначается старым животным.

Lachesis

Lachesis готовится из яда змеи сурукуку, обитающей в Южной Америке. Для этого средства также характерна склонность к кровотечениям, однако в отличие от *Crotalus horridus* преобладает левостороннее поражение. Ухо со стороны поражения обычно приобретает темный или синеватый оттенок. Симптомы данного препарата ухудшаются обычно во время сна — нередки случаи, когда ушная гематома образуется у собак *Lachesis* ночью.

Millefolium

Millefolium представляет собой малое средство, основным показанием для которого является кровотечение. Мне удалось успешно применять данное лекарство у практически здоровых собак с ушными гематомами, когда не требовалось назначения конституционального средства.

Phosphorus

При возникновении ушных гематом у животных прежде всего следует подумать о назначении данного средства, так как

именно *Phosphorus* является главным препаратом при кровотечениях любого типа. Собаки с симптомами *Phosphorus* обычно худые, общительные, громкоголосые, с выраженной жаждой и чувством голода. Типично левостороннее поражение. Изливающаяся кровь обычно имеет ярко-красный цвет в отличие от *Crotalus horridus* и *Lachesis*, для которых характерно истечение темной крови. В некоторых случаях цвет крови в составе гематомы можно определить только после хирургического вмешательства.

Укусы насекомых (мух и москитов)

Обычно от укусов насекомых животные страдают в условиях влажного жаркого климата, способствующего процветанию популяций мух и москитов. Кроме того, в таком климате обычно отмечается медленное заживление ран и участков раздражения кожи у животных, а также обильное раневое отделяемое, привлекающее насекомых. Чаще всего многочисленные укусы насекомых отмечаются в области кончиков ушей у собак, при этом уши становятся болезненные, отекающие, гиперемизированные, собаки страдают от чувства постоянного зуда и жжения. Лечение подобных ран обычно сводится к применению местных средств для заживления ран и репеллентов. Я рекомендую применять для местного лечения мазь с *Calendula*, *Aloe vera* или разведенное масло чайного дерева (см. раздел «Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями ушей»). В качестве репеллента можно использовать лаванду и листья эвкалипта.

В некоторых случаях многочисленных укусов насекомых эффективно назначение гомеопатического препарата *Caladium seguinum*, которое ускоряет заживление ран в области укусов насекомыми и способствует развитию устойчивости к укусам.

Полость рта, десны и зубы



Функции

Воспаление десен и воспалительные процессы полости рта

Ретенционная подъязычная киста (ранула)

Абсцессы и кариозное разрушение зубов

ФУНКЦИИ

Полость рта представляет собой начальный отдел пищеварительного тракта, через который в организм поступает пища; кроме того, в полости рта начинается процесс пищеварения. Первоначальный «контакт» с пищей у животных происходит за счет зубов – резцов и клыков. Для травоядных животных наибольшее значение имеют резцы – небольшого размера остро заточенные зубы в переднем отделе полости рта, с помощью которых травоядные срезают различные виды растительной пищи и отправляют ее в рот. Для хищников более важны клыки – именно с помощью клыков хищники удерживают пойманную добычу и наносят ей глубокие смертельные колотые раны. Экспериментально доказано, что расстояние между клыками у хищников соответствует расстоянию между шейными позвонками их потенциальных самых крупных жертв; хищники вонзают клыки в шею пойманной жертве и моментально повреждают ее спинной мозг. Именно за счет особого расположения сильных клыков одиночные хищники могут расправиться с добычей, которая в некоторых случаях крупнее их самих.

Как кошки, так и собаки используют зубы еще и для ухода за шерстью – при помощи резцов они освобождают шерсть от кожных паразитов (блох, клещей, вшей) и от инородных тел (различных колючек и, например, от игл дикобраза). Кроме того, зубы у хищников представляют собой грозное оружие, которое используется как для защиты, так и для нападения на конкурентов.

Если при помощи клыков хищники добывают себе пропитание, то при помощи моляров и премоляров (т. е. больших и малых коренных зубов) происходит фрагментация добычи на куски соответствующего размера. Собаки способны проглатывать достаточно крупные куски (волчий голод!), кошки же должны несколько измельчить пищу перед проглатыванием, однако ни один из этих хищников не следует рекомендациям стоматологов «одно жевательное движение на один зуб». Для этих хищников подобная рекомендация выглядит скорее как «одно жевательное движение на каждый клык». Фактически и кошки, и собаки разжевывают только кости; сырые кости являются необходимым компонентом их питания, так как за счет сырых костей

поддерживается баланс кальция в организме. Сырые кости хищники просто раздавливают своими сильными зубами на мелкие осколки; пищеварительные соки довершают начатое. Почему же при употреблении отломков сырых костей у хищников не бывает осложнений? Осложнения при поедании костей у хищников действительно бывают крайне редко, в основном при употреблении вареных костей в виде длинных узких костных отломков. Сырые кости, которые хищники раздавливают на отдельные фрагменты, никогда не имеют такого вида. Кроме того, в естественных условиях хищники поедают кости в последнюю очередь, когда желудок уже заполнен — это в значительной степени защищает слизистую оболочку желудка и кишечника от травматизации, пока не начнется воздействие на проглоченные кости пищеварительных соков.

Очевидно, что для хищников состояние зубов и десен имеет особое значение. За тысячи лет эволюции у них выработалась собственная программа поддержания зубов и десен в соответствующем «рабочем» состоянии. Основой этой программы является сырая пища и разгрызание сырых костей. Никакие специальные «косточки для собак» или «собачьи галеты» не могут заменить полноценной нагрузки на десны и зубы при поедании сырой пищи. Вопреки расхожему мнению сухая пища для домашних животных не способствует укреплению десен и зубов, а также не предотвращает образование зубного камня. Основным фактором здоровья десен и зубов является нормальная функция иммунной системы, которой способствует здоровая пища и отсутствие стрессов, ослабляющих защиту организма — т. е. отсутствие вакцинаций, избыточного применения аллопатических лекарств и отсутствие токсинов, поступающих в организм в составе неполноценной пищи.

Полость рта, особенно пространство между зубами и деснами, является областью контакта организма с микробами внешней среды. В норме бактерии населяют желудочно-кишечный тракт на всем его протяжении, включая и полость рта, но здоровым животным эти бактерии не приносят ни малейшего вреда. Именно иммунная система не дает возможности бактериям проникнуть во внутреннюю среду организма (в определенном смысле пищеварительный тракт является также «наружной системой», так как прямо сообщается с внешней сре-

дой). В составе слюны находятся два компонента, обладающие противобактериальными свойствами и подавляющие рост бактерий. Первый компонент — ионы тиоцианата (*thiocyanate ions*), которые быстро уничтожают бактерии, особенно при поступлении внутрь бактериальной клетки. Вторым компонентом — лизоцим, представляющий собой особый фермент со множеством полезных свойств. За счет лизоцима лизируются мелкие частицы пищи, которые остаются в ротовой полости и являются питательной средой для бактерий; лизоцим обладает свойством разрушать бактериальные клетки и замедлять их размножение; наконец, лизоцим облегчает ионам тиоцианата доступ внутрь клетки¹. Таким образом, распространенное мнение о целительных свойствах слюны вполне оправданно.

При ослаблении по той или иной причине функции иммунной системы начинается процесс проникновения бактерий внутрь организма, причем инвазия начинается именно с десен. Гиперемия десен или гиперемизированная кайма на деснах на уровне зубов указывают на глубину бактериальной инвазии, так как организм с целью защиты инициирует в области инвазии воспалительный процесс. При дальнейшем ослаблении функции иммунной системы развивается воспалительный процесс десен (гингивит) со всеми присущими воспалению симптомами.

Назначение антибиотиков на короткий период времени может уменьшить воспалительную реакцию и помогает ликвидировать бактерии, однако антибиотики не могут обеспечить длительную защиту. Если не происходит восстановления функции иммунной системы и ее укрепления, то инвазия бактерий продолжается; кроме того, у бактерий паразитично быстро возникает резистентность ко всем типам антибиотиков. Антибиотики сами по себе являются факторами ослабления иммунной системы, таким образом, косвенно способствуя прогрессу воспалительного процесса в области десен. Клинические наблюдения и эксперименты подтверждают, что антибиотики приносят организму лишь кратковременную пользу, причем требуется частая смена антибиотиков и коррекция доз. В конце концов антибиотики совершенно перестают «работать» и воздействовать на бактерии, а организм ослабляется до такой степени, что полностью утрачивает способность бороться с инфекцией — в этом случае развивается процесс активного воспаления в полости рта.

Необходимым компонентом антибиотикотерапии, который часто недооценивается клиницистами, является укрепление иммунной системы организма – только таким путем организм может успешно победить развитие инфекции.

Образование зубного камня начинается с образования налета на поверхности зубов за счет прилипания остатков пищи. В присутствии бактерий этот процесс значительно ускоряется. Если этот налет не удаляется примерно за 24 часа, то происходит его уплотнение и формирование зубного камня, который постепенно увеличивается в размерах. Разгрызание хищниками костей представляет собой эффективный способ естественного очищения зубов от налета до того, как он спрессуется в зубной камень. При жевании сухого корма любого типа просто не создается такой силы трения, которая позволила бы полностью удалить с зубов все пищевые остатки. Кроме того, в состав сухого корма входит значительное количество углеводов, способствующих образованию избыточного налета на зубах. Естественным растворителем зубного налета является слюна; кроме того, слюноотделение способствует орошению зубов и препятствует росту бактериальной микрофлоры.

Несомненно, что неполноценное питание способствует возникновению заболеваний зубов и десен у животных; можно выделить несколько аспектов этого воздействия. Во-первых (самое основное), в составе неполноценной «готовой» пищи значительно повышено количество углеводов, в том числе сахара, которые являются прекрасной питательной средой для размножения бактерий. Во-вторых, неполноценная пища просто не в состоянии поддерживать деятельность иммунной системы организма на должном уровне. В-третьих, потребление недоброкачественных ингредиентов, которые содержатся в составе «готовой» пищи, способствует развитию дегенеративных процессов в тканях. Этот аспект, кстати, часто недооценивается. Особенно чувствительны к качеству пищи десны животных, однако мне нередко приходится видеть начальные стадии воспаления десен у вроде бы совершенно здоровых особей. На подобные предупреждающие сигналы необходимо обращать самое пристальное внимание – вполне возможно, что начальные стадии гингивита указывают на некоторое неблагополучие в организме и возможность развития хронического заболевания.

Кошки особенно подвержены заболеваниям десен. По моему убеждению, основной причиной этого явления у кошек является недоброкачественная пища². Симптомы воспаления десен у кошек в виде гиперемии, отечности и изъязвлений напоминают симптомы цинги, которая раньше была типичной болезнью моряков в дальних плаваниях. У людей причиной цинги обычно считается дефицит витамина С — именно поэтому на повышение содержания этого витамина в пище организм реагирует столь чудесным образом. Однако, по моему мнению, цинга у моряков в долгих плаваниях возникала не только из-за дефицита витамина С, но и из-за того, что пища на кораблях раньше просто не могла сохраниться в течение долгого времени. При отсутствии холодильников и морозильных камер и мясо, и крупы быстро портились. Известно, что в испорченных продуктах содержится огромное количество свободных радикалов, вызывающих деструкцию тканей. Витамин С представляет собой антиоксидант мощного действия, нейтрализующий свободные радикалы. Таким образом, на развитие цинги дефицит витамина С оказывал и прямое, и опосредованное действие.

В процессе эволюции организм представителей семейства кошачьих приспособился к потреблению свежееубитой добычи и одновременно с этим утратил способность к детоксикации ряда вредных веществ. Возможно, что чувствительность кошек к пище обусловлена именно этим фактором. Не исключено, что сильнейшее воспаление десен у кошек и есть своеобразное проявление цинги. Однако в ответ на увеличение содержания в пище витамина С в организме кошек не развивается такая изумительная по скорости реакция, как у людей, — возможно, из-за того, что у человека процессы детоксикации развиты значительно лучше, чем у кошек. Кроме того, иммунная система кошек ослаблена воздействием вакцинации. При развитии воспалительных процессов в области рта у кошек помогают гомеопатические средства, однако даже с помощью гомеопатии лечить эти болезни у кошек очень трудно. Гораздо легче эти заболевания предупредить — поэтому и щенков, и котят необходимо с раннего возраста приучать к полноценной пище на основе сырого мяса и значительно уменьшить число прививок. Сочетание этих превентивных мер поможет значительно улучшить состояние зубов и десен и у кошек, и у собак.

ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛОСТИ РТА

Особенности наблюдения и лечения при гингивите и воспалительных процессах полости рта

Гингивит развивается медленно и постепенно, в течение нескольких месяцев и даже лет, поэтому на быстрое его излечение рассчитывать не приходится. В предыдущем разделе мы уже обсуждали, что решающее значение для сохранения здоровья десен у животных имеет полноценное питание. Свежее питание на основе сырого мяса является также и мощным фактором излечения воспалительных процессов полости рта. Целесообразно назначение антиоксидантов, однако ни антиоксиданты, ни какие-либо другие лекарственные средства не заменяют полноценного и разумного пищевого рациона. При развитии гингивита животным следует назначить *витамин С* с биофлавоноидами (*bioflavonoids*) в дозе 10 мг/фунт веса 2–3 раза в день и *витамин Е* в дозе 5–10 мг/фунт веса один раз в день. Одним из мощных биофлавоноидов является пикногенол (*Pycnogenol*), который в некоторых случаях оказывает чрезвычайно эффективное действие (0,5–1 мг/фунт). Полезно также назначение коэнзима *Q 10* (*Coenzyme Q 10*) в дозе 1–3 мг/фунт один раз в день. Наиболее эффективным является назначение масляного раствора коэнзима *Q 10*, однако доза масляного раствора должна быть несколько меньше, чем доза этого лекарства в виде капсул.

Как уже говорилось, гингивит чрезвычайно трудно поддается лечению, даже с помощью гомеопатических средств. Особенно трудно лечить гингивит у кошек, которые гораздо чаще собак страдают этим заболеванием. Некоторые ветеринары даже предлагают удалять у кошек все зубы для того, чтобы открыть «карманы» между зубами и деснами — именно в этих карманах находится очаг постоянной инфекции. На мой взгляд, это варварский метод; такое решение можно принять только от полнейшего отчаяния и неэффективности всех примененных методов лечения. Теоретически, конечно, подобная радикальная санация ротовой полости в некоторых случаях может быть эффективной, так как в итоге у бактерий просто не будет условий для неограниченного роста и инвазии организма. Однако об эф-

фективности данного метода можно говорить лишь условно, поскольку вряд ли стоит считать хорошим результатом лечения полное отсутствие зубов. На практике данный радикальный метод, однако, тоже часто не приносит желаемого результата, поэтому лучшим методом при подобных формах гингивита у кошек является все же упорное и длительное гомеопатическое лечение.

Наибольшее внимание, естественно, следует обращать на предупреждение заболеваний десен у домашних животных. При появлении первых признаков гингивита, даже в виде единичного небольшого участка гиперемии десен, вполне разумным решением будет обращение к ветеринару-гомеопату для назначения конституционального лечения. Выбор средства в данной ситуации может быть сложным, так как во многих случаях гиперемия краев десен может быть единственным симптомом. По мере прогрессирования заболевания прогноз становится все более и более серьезным — следовательно, необходимо обращать внимание именно на профилактические меры. Я не могу не подчеркнуть еще раз необходимость полноценного питания домашних животных. Если развитие гингивита сопровождается появлением зубного камня, то следует провести очищение (санацию) зубов. При небольших наслоениях вполне допустимо обойтись без общей анестезии, однако при значительных наслоениях необходим общий наркоз. Эта процедура представляет собой стрессовый фактор для животных, поэтому не следует очищение зубов проводить чаще, чем это необходимо. Несмотря на то, что современные анестетики достаточно безопасны, частая анестезия способствует ослаблению организма — таким образом, решение о проведении очищения зубов вашего питомца с общей анестезией должно быть обоснованным и взвешенным.

При развитии гингивита у вашего питомца я бы порекомендовал вам обратиться к ветеринару-гомеопату. Некоторые гомеопатические средства помогают облегчить состояние, особенно в острый период. Для выбора правильного подобного средства вам *следует обратить внимание на следующие особенности течения заболевания*:

- Отмечается ли болезненность десен?
- Ухудшается ли состояние после еды?
- Нет ли кровоточивости десен? Если есть, то не принимает

ли кровоточивость характер профузного кровотечения?

- Не отмечается ли изъязвлений слизистой оболочки полости рта, в том числе языка и твердого или мягкого нёба?
- Не отмечается ли зловонного запаха изо рта?
- Нет ли гнойного отделяемого?

Примечание. Наличие изъязвлений слизистой оболочки полости рта может быть симптомом нарушения функции почек. Животные с подобными симптомами нуждаются в полном ветеринарном обследовании.

Гомеопатические средства при гингивите и воспалительных процессах полости рта

Arsenicum album

Назначение данного средства показано у животных в основном в тех случаях, когда гингивит сочетается с почечной недостаточностью, при этом отмечается выраженная болезненность десен и сильный запах изо рта. Воспалительный процесс сопровождается сильной кровоточивостью и изъязвлениями слизистой оболочки ротовой полости. Для животных с симптомами этого средства типична жажда, однако пьют они маленькими глотками. Типично также желание холодной воды, однако при сильном воспалении питье резко усиливает болезненность в области зубов и десен, поэтому животные часто подходят к миске с водой, однако пьют воду фактически маленькими глотками. Отмечаются также другие симптомы *Arsenicum* – ухудшение после полуночи, беспокойство, зябкость и боязнь незнакомых людей. Как правило, отмечается преимущественно правостороннее поражение.

Arum triphyllum

Данное гомеопатическое средство готовится из корня ариземы трехлисточковой; *Arum triphyllum* представляет собой эффективное средство при выраженном воспалении десен. Экстракт корня этого растения обладает выраженным раздражающим действием на слизистую оболочку полости рта; следовательно, гомеопатическое средство из корня этого растения помогает при сильном воспалении ротовой полости. Ключевым

симптомом данного препарата являются трещины в уголках рта. Из-за сильной болезненности десен животные с трудом могут есть и пить. На слизистой оболочке всей полости рта, в том числе на языке и небе, могут отмечаться изъязвления, язык часто имеет красно-свекольную окраску. Отмечается повышенная саливация и сильный запах изо рта; типична также склонность к преимущественно левостороннему поражению.

Borax

Вопреки распространенному мнению, что *Borax* эффективен при множественных изъязвлениях полости рта, мне не удалось практически отметить большой пользы от его назначения. Ключевым симптомом данного средства является страх при движении вниз — например, при прыжках с высоты, при движении вниз по лестнице и т. п. Животные с симптомами этого средства плохо переносят поездки в автомобиле, особенно по пересеченной местности, а также воздушный транспорт. Для животных *Borax* типична повышенная чувствительность к внезапному шуму, особенно выстрелам из ружья, даже сделанным на далеком расстоянии. Типична также раздражительность и непоседливость; обычно все симптомы улучшаются после 23 часов.

В типичных случаях отмечается изъязвление слизистой оболочки языка и по внутренней поверхности щек, а также белый налет на слизистой оболочке полости рта, как при афтозном стоматите. (Кстати, Кларк считает простым, но очень эффективным методом лечения афтозного стоматита употребление в пищу большого количества земляники или клубники)³. У животных с симптомами данного средства часто отмечается болезненность во время мочеиспускания и дефекации, при этом они могут взвизгивать от боли.

Carbo vegetabilis

Эффективность назначения данного средства при гингивите обусловлена тем, что в целом симптомы *Carbo vegetabilis* соответствуют состоянию дегенерации вследствие ослабления жизненной силы. Именно в области десен эти признаки появляются в большинстве случаев в первую очередь. У животных с симптомами этого средства воспаление десен сопровождается кровоточивостью, причем кровь обычно темного цвета. Отмечается по-

холодание слизистой оболочки полости рта, а также конечностей. Десны отекают и отстают от зубов, причем часто из этих карманов отмечается отхождение гноя. Характерным симптомом является синеватый цвет десен — при появлении этого симптома следует прежде всего подумать именно о назначении либо *Carbo vegetabilis*, либо *Lachesis*. Отмечается также повышенная саливация и неприятный запах изо рта.

Животные *Carbo vegetabilis* склонны к избыточному весу и отхождению значительного количества кишечных газов; для них характерны вялость и медлительность. Слабость часто приводит к состоянию коллапса. Несмотря на общее похолодание тела, у них выражено желание свежего воздуха — поэтому их часто можно застать сидящими под вентилятором или около входной двери. Общее состояние их здоровья свидетельствует о наличии глубокого хронического заболевания, поэтому их излечение требует обычно длительного времени.

Kali chloricum

Данное средство, как и *Arsenicum*, часто показано тем животным, у которых основной фокус болезни сосредоточен в почках. Для животных с симптомами данного препарата характерен отек и синюшный оттенок слизистой оболочки полости рта, изъязвления сероватого цвета, отек и похолодание языка. Воспалительный процесс вследствие глубокого нарушения кровообращения склонен к деструкции и развитию некроза тканей, одним из признаков которого является зловонный запах изо рта. Общее состояние таких животных тяжелое.

Сопутствующими симптомами часто являются диарея и прерывная рвота с примесью зеленовато-черной слизи в рвотных массах. Отмечается неустойчивость психоэмоционального состояния, при котором приступы депрессии сменяются эпизодами живости. Если вы не сможете найти *Kali chloricum*, то вместо него можно назначать одну из «тканевых солей Шусслера» — *Kali muriaticum*. Многие авторы считают действие этих средств во многом сходным, если не совершенно одинаковым; кроме того, *Kali muriaticum* более распространенное лекарство и продается в любой гомеопатической аптеке.

Kali phosphoricum

Как и у всех средств группы калия, у *Kali phosphoricum* имеется тропность к заболеваниям носа и ротовой полости. Характерными симптомами данного средства являются разрыхление десен и их отставание от зубов, а также легко возникающая кровоточивость десен (характерная для всех средств *Phosphorus*). Часто отмечается налет горчичного цвета на языке и парез языка, вследствие которого животные испытывают трудности при еде и питье. Для этого средства, как и для большинства препаратов для лечения гингивита, характерен зловонный запах изо рта; у животных *Kali phosphoricum* запах он напоминает запах падали. Утром у этих животных отмечается выраженная сухость слизистой оболочки и прилипание языка к нёбу.

У животных *Kali phosphoricum* часто отмечается слабость и состояние подавленности; это средство чаще назначается животным молодого возраста, особенно в период прорезывания зубов.

Kreosotum

Основным показанием для назначения данного средства являются жгучие выделения раздражающего характера. Обычно считается, что данное средство, подобно *Borax*, чрезвычайно эффективно при заболеваниях полости рта, однако мне не удалось достичь таких замечательных результатов при его назначении. Показанием для назначения *Kreosotum* является болезненное прорезывание зубов, при котором боль настолько сильная, что мешает спать. Зубы быстро разрушаются, темнеют и становятся хрупкими, причем сразу же после прорезывания на них образуются пятна черного цвета. Десны у животных *Kreosotum* синеватого цвета, рыхлые и легко кровоточат. Отмечается также гнилостный запах изо рта. Для данного средства характерно преимущественно левостороннее поражение.

Для животных с симптомами данного средства типичны приступы беспокойства, возникающие примерно в 3 часа утра, во время которых животные даже повизгивают. Кроме того, повизгивание отмечается и при дефекации. Ключевым симптомом данного средства является рвота через несколько часов после еды.

Mercurius (vivus, solubilis)

Лечение с помощью ртути, в основном в составе каломели, являлось основой конвенциональной медицины в течение многих лет. Ртуть назначалась до той поры, пока у пациента не начиналась сильнейшая саливация. Препараты ртути в аллопатических дозах оказывали выраженное влияние на состояние полости рта, в том числе десен и зубов, и вследствие лечения у пациентов отмечалось массивное разрушение и выпадение зубов. Нечто подобное случилось с Дж. Вашингтоном, у которого лечение сифилиса препаратами ртути закончилось выпадением почти всех зубов, после чего ему сделали протезы обеих челюстей (скорее всего эти протезы все же не были деревянными). Одним из инициаторов такого лечения был Бенджамин Раш, соавтор Декларации независимости и впоследствии известный американский врач-аллопат.

У гомеопатического средства *Mercurius* также отмечается выраженная тропность к заболеваниям полости рта. Ключевым симптомом данного средства является воспаление десен и профузная саливация, причем слюнотечение отмечается даже во сне. У животных с симптомами этого средства отмечается разрыхление, гиперемия и выраженная болезненность десен в сочетании с легко возникающей кровоточивостью. Зубы расшатываются и самопроизвольно выпадают. Характерны выделения желтого цвета из всех естественных отверстий; язык часто покрыт желтым налетом, с отпечатками зубов. Симптомы со стороны полости рта часто сочетаются с явлениями ринита и выделениями из носа. Характерно гнойное отделяемое желто-зеленого цвета со зловонным запахом.

Животные с симптомами данного средства чувствительны как к жаре, так и к холоду («ртутный термометр»). Отмечается зловонный запах не только из полости рта, но и запах от тела. Для *Mercurius* характерна также диарея с выраженными тенезмами. Общее состояние животных *Mercurius* тяжелое, так как отмечается поражение многих систем организма. Типично ухудшение симптомов при заходе солнца и улучшение по мере приближения утра; ночью эти животные нередко беспокойны. Животные *Mercurius* с трудом подчиняются дисциплине; при попытках принуждения они становятся злобными и могут укусить.

Muriaticum acidum

Общими для всех кислот симптомами являются слабость, раздражающие выделения, воспалительные процессы слизистых оболочек и снижение способности к самостоятельному выздоровлению. *Muriaticum acidum* не является исключением; основные симптомы этого средства сосредоточены вокруг системы пищеварения, особенно полости рта. Характерными симптомами у животных *Muriaticum acidum* являются воспаление и глубокое изъязвление слизистой оболочки ротовой полости и сухой, грубый и неповоротливый язык темно-красного цвета, покрытый серовато-белым налетом.

У животных *Muriaticum acidum* отмечается странный симптом, весьма необычный для хищников — отвращение к мясной пище; кроме того, часто отмечается диарея водянистого характера, причем фекалии раздражают область ануса, вызывая боль и повышенную чувствительность. Одновременно с диареей возникает мочеиспускание — часто из-за того, что мочеиспускание затруднено и облегчается при натуживании во время отхождения стула. У животных с симптомами этого средства выражена вялость, но в сочетании с раздражительностью. Они предпочитают находиться дома, так как на свежем воздухе отмечается ухудшение симптомов.

Natrum muriaticum

Данное средство-полихрест готовится из поваренной соли и представляет собой натриевую соль соляной кислоты. Симптомы данного препарата во многом схожи с симптомами *Muriaticum acidum*, особенно в отношении раздражения и изъязвления слизистых оболочек. Десны обычно воспаленные, болезненные, легко кровоточат; пенистая слюна скапливается у края языка. Саливация более выражена утром. У животных *Natrum muriaticum*, как и у животных *Muriaticum acidum*, отмечается тяжесть и неповоротливость языка. На языке могут возникать мелкие пузырьки, болезненные при соприкосновении с пищей.

У животных этого типа почти всегда выражена сильная жажда и непереносимость жары, особенно жаркого солнца. Они довольно замкнуты и не любят проявлений внимания и ласки. У них часто возникают заболевания вследствие горя,

особенно после смерти или отъезда одного из членов семьи, где они живут. У них выражено чувство голода, однако едят эти животные немного — или вследствие чувства горя, или из-за воспалительных процессов в полости рта. Как правило, у животных *Natrum muriaticum* выражено желание соленой пищи, особенно соленой рыбы.

Nitricum acidum

У данного средства, как и у всех кислот, выражена тропность к слизистым оболочкам; для этого препарата характерны раздражение и изъязвления слизистой оболочки мочеиспускательного канала, полости рта, глаз, носа и ануса. Изъязвления достаточно болезненные, как от занозы или горячей проволоки, локализуются в области мягкого нёба и внутренней поверхности щек. На языке часто отмечается продольная борозда по срединной линии и пустулезные высыпания по краям языка.

У животных с симптомами данного средства выражено желание жирной и соленой пищи; они весьма раздражительны, даже злобны и опасны — легко поддаются на провокацию, кусают сильно и до крови. Часто отмечается зябкость. В целом животные *Nitricum acidum* не такие слабые, как другие животные с симптомами кислот, однако быстро утомляются, особенно эмоционально.

Phosphorus

Для данного средства характерно воспаление десен в основном вокруг резцов, причем резцы могут самопроизвольно выпасть в раннем возрасте. Характерны также кровоточивость десен даже при легком прикосновении и кровоточащие изъязвления по внутренней поверхности щек.

Для животных *Phosphorus* характерны жажда, зябкость, дружелюбие, желание внимания, громкий голос и пугливость. Обычно у этих животных изящное телосложение; часто возникает рвота.

Syphilinum

Данное средство относится к группе нозодов и продается только по рецептам профессиональных гомеопатов. Я реко-

мендую применять *Syphilinum* только по назначению ветеринара-гомеопата. Это средство глубокого действия, эффективное при выраженном воспалении в сочетании с изъязвлениями слизистой оболочки полости рта.

Многие симптомы *Syphilinum* напоминают симптомы *Mercurius*, особенно раздражительность и ухудшение состояния на закате. Типично поражение слизистых оболочек, костей и зубов, причем зубы быстро разрушаются и самопроизвольно выпадают. В некоторых случаях отмечаются симптомы пареза языка и обильная саливация во время сна.

РЕТЕНЦИОННАЯ ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КИСТА (РАНУЛА)

Ранула, или подъязычная ретенционная киста, представляет собой заполненное полупрозрачной жидкостью кистозное образование, которое располагается в подъязычной области. Причина возникновения ранулы неизвестна. Ранула развивается при обструкции выводного протока подъязычной слюнной железы. На основании собственного практического опыта могу сказать, что это заболевание чаще встречается у собак, при этом вследствие отека у животных могут быть затруднения при еде и питье жидкости. Часто первыми симптомами заболевания у животных являются постоянные движения языком и жевательных мышц. В некоторых случаях требуется хирургическое лечение, однако чаще заболевание проходит самостоятельно.

Гомеопатические средства при ретенционной подъязычной кисте

Локальные симптомы ранулы не представляют собой каких-либо специфических особенностей, поэтому при выборе подобного средства следует принять во внимание сопутствующие симптомы, общее и психоэмоциональное состояние животного. Симптомам этого заболевания у вашего питомца может соответствовать одно из средств, описанных в данной главе, но перед назначением препарата непременно прочтите его описание в *Materia Medica*.

Calcareo carbonica, Fluoricum acidum, Mezereum

См. далее, раздел «Абсцессы и разрушение зубов».

Mercurius, Natrum muriaticum, Nitricum acidum, Syphilinum

См. выше, раздел «Гингивит и воспалительные процессы в полости рта».

Thuja occidentalis

Область подъязычной кисты может быть синевато-красного цвета; под языком отмечается усиление венозного рисунка. См. также раздел «Абсцессы и кариозное разрушение зубов».

АБСЦЕССЫ И КАРИОЗНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ЗУБОВ

Абсцессы и разрушение зубов, как и гингивит, развиваются вследствие неспособности организма продуцировать необходимую иммунную ответную реакцию. Основное различие заключается в том, что при гингивите и изъязвлениях слизистой оболочки полости рта отмечается гиперактивность иммунной системы, а абсцессы и кариес развиваются вследствие недостаточности функции иммунной системы. При гингивите воспалительный процесс в некоторых случаях приобретает настолько выраженный характер, что создается впечатление, будто весь избыток активности иммунной системы буквально выплескивается в виде воспаления. Однако при ослаблении иммунной системы выраженная ответная реакция становится невозможной, приобретая замедленный и коварный характер. Именно поэтому при абсцессах наблюдается образование полости, которая заполняется гноем, состоящим из фрагментов бактерий, лейкоцитов и некротизированных тканей — организм не в силах одномоментно справиться с инфекцией за счет интенсивного воспаления и вынужден постепенно ликвидировать инфекцию за счет формирования ограниченной гнойной полости. Если в дальнейшем сохраняется достаточная сила иммунной защитной реакции, то абсцесс самопроизвольно вскрывается, опорожняется и заживает в течение нескольких дней. Однако у животных в большинстве случаев, особенно

при развитии абсцессов в области челюстей, воспаление приобретает вялотекущий и постоянный характер.

Можно выявить несколько причин кариозного разрушения зубов. Одной из них является наличие постоянного воспаления и инфекции в области десен, так как при воспалении выделяются биологически активные химические вещества, воздействующие на ткани зуба; подобным эффектом обладают также некоторые продукты жизнедеятельности бактерий. У некоторых животных с врожденной недостаточностью жизненной силы отмечается неполноценное формирование тканей зуба, в том числе зубной эмали, вследствие чего зубы становятся подверженными раннему кариесу. Кроме того, некоторые вирусы, в том числе вирус чумы у собак, также оказывают влияние на формирование неполноценной зубной эмали, поэтому у щенков, которые перенесли чуму, часто отмечается ранний кариес.

Гомеопатическое лечение может замедлить или даже остановить развитие кариеса, однако не в силах восстановить пораженные ткани зуба. Однако в подобной ситуации требуется назначение конституционального лечения, что выходит за рамки данной книги. Поэтому основное внимание мы сосредоточим на тех средствах, которые помогают организму справиться с инфекцией, таким образом предотвращая дальнейшее разрушение зубов; однако кратко рассмотрим и те средства, которые могут применяться при кариесе вследствие нарушения развития зубов.

Особенности наблюдения и лечения при абсцессах и кариозном разрушении зубов

В большинстве случаев развитие абсцессов в области челюстей происходит на фоне вялотекущего воспалительного процесса, поэтому прежде всего требуются мероприятия по укреплению иммунной системы животных. Во многих случаях антибиотики, которые постоянно прописываются при состояниях такого рода, не приостанавливают вялотекущее воспаление и рецидивы абсцессов. Постоянное вялотекущее воспаление в области челюстей может вызвать развитие вторичного эндокардита с поражением клапанов сердца и почечной недостаточности. Именно поэтому в случаях хронического воспаления в полости рта и рецидивов абсцессов требуется ветеринарное об-

следование и лечение. Иногда абсцессы полости рта протекают остро и требуют неотложной ветеринарной помощи. Во всех случаях воспалительных процессов в полости рта требуется очищение зубов от наслоений зубного камня, так как это мероприятие способствует уменьшению воспаления (см. раздел «Особенности наблюдения и лечения при гингивитах и воспалительных процессах полости рта», где изложена более подробная информация об очищении зубов от зубного камня). В случаях выраженного воспаления с абсцедированием иногда требуется удаление пораженного зуба.

Фитопрепараты эхинацеи, кошачьего когтя и желтокорня канадского способствуют укреплению иммунной системы, что позволяет организму успешнее справляться с инфекцией. Обратите внимание на применение желтокорня канадского – этот фитопрепарат следует применять только при сильном воспалении и не более двух недель у собак и одной недели у кошек. Эхинацея намного безопаснее, поэтому ее можно применять как у кошек, так и у собак в течение двух-четырех недель, а кошачий коготь – в течение одного-двух месяцев. Однако при применении всех фитопрепаратов у животных необходимо соблюдать определенные меры предосторожности – все фитопрепараты следует назначать в виде прерывистых курсов, периодически давая отдых организму. Как и при гингивите, при абсцессах и при наличии постоянного воспалительного процесса полости рта целесообразно назначение *витаминов С, Е*, коэнзима *Q 10* и пикногенола (дозы этих лекарств описаны в разделе «Особенности наблюдения и лечения при гингивитах и воспалительных процессах полости рта»).

В следующих случаях требуется немедленное обращение в ветеринарную лечебницу:

- при развитии у животных слабости и вялости,
- при развитии выраженного отека, достигающего уровня орбиты,
- при развитии выраженного воспаления и сильных болей – особенно в сочетании с заторможенностью,
- если температура повышается до 103° по Фаренгейту.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару, если:

- необходима оценка степени тяжести состояния вашего пи-

томца и оценка состояния воспалительного процесса,

- абсцесс не разрешается за 1–3 недели. Если состояние вашего питомца на фоне абсцесса продолжает ухудшаться, то это показание для экстренного обращения к ветеринару.

Постарайтесь определить *сопутствующие симптомы*, которые могут оказать влияние на ваш выбор гомеопатического средства:

- Есть ли болезненность в области абсцесса?
- Не отмечается ли зловонный запах гнойного отделяемого (конечно, при всех абсцессах гной имеет специфический запах, однако в некоторых случаях запах особенно выражен)?
- Нет ли раздражительности и слабости? Легко ли пугается, часто ли вздрагивает?

Острый абсцесс корня зуба

Если в целом состояние вашего питомца неплохое, то острый абсцесс в области челюсти можно попытаться лечить с помощью гомеопатических средств и лекарств, способствующих усилению иммунной системы, не назначая антибиотики. При применении подобного гомеопатического средства происходит самопроизвольное вскрытие и опорожнение полости абсцесса, и заживление в целом занимает такое же время, как и при назначении антибиотиков, однако при этом не происходит угнетения иммунной системы. Практически во всех случаях заживление за счет естественных сил организма предпочтительнее, чем заживление под воздействием сильных аллопатических лекарств.

Гомеопатические средства при абсцессах в области корней зубов

Calcareo carbonica

Calcareo carbonica, как и вся группа средств *Calcareo*, является основным средством при дефектах развития организма, в том числе и при нарушении развития костной ткани. В типичных случаях животные данного типа вялые, медлительные, ширококостные и ленивые; у них часто отмечается избыточный вес и неуклюжая походка. Обычно наблюдается нарушение остеогенеза, позднее прорезывание зубов и частые перело-

мы костей. У животных этого типа часто отмечаются вялотекущие абсцессы в области челюстей в сочетании с увеличением подчелюстных лимфоузлов.

Животные *Calcareo carbonica* чрезвычайно чувствительны к холодной и сырой погоде. Иногда обнаруживается зловонный запах выделений организма, запах изо рта и ушей. Как правило, эти животные боятся любых изменений в их жизни и привыкают к определенному распорядку дня. По характеру они обычно дружелюбные и благодушные.

Heccla lava

Данное средство готовится из вулканического пепла, обнаруженного на горе Гекла в Исландии. Было отмечено, что у овец, которые пасутся на склонах этой горы, часто возникают экзостозы в области челюстей. Это явление объясняется тем, что вулканический пепел имеет тропность к развитию заболеваний этой области. Именно поэтому гомеопатическое средство *Heccla lava* назначается при доброкачественных и злокачественных опухолях челюстей. Назначение данного препарата при абсцессах корней зубов также целесообразно, так как при этом происходит как разрастание, так и разрушение костной ткани. В типичных случаях абсцессы челюстей сочетаются с увеличением подчелюстных лимфоузлов, причем как область абсцесса, так и лимфоузлы болезненны при прикосновении. Отмечается преимущественно правостороннее поражение.

Hepar sulphuris calcareum

Назначение данного средства облегчает течение простых абсцессов примерно у трети кошек и собак, что вполне сравнимо с эффективностью назначения *Silicea*. Животные с симптомами данного препарата обычно раздражительные и зябкие; область абсцесса у них чрезвычайно болезненна при прикосновении. Такое сочетание раздражительности и болезненности делает этих животных весьма «опасными пациентами», так как они могут и укусить, и поцарапать даже при легком прикосновении к области абсцесса. Типичен также особо зловонный запах гнойного отделяемого из полости абсцесса.

Mercurius (vivus, solubilis)

Назначение данного средства эффективно не только при воспалительных процессах, но и при абсцессах полости рта (естественно, при соответствии других симптомов — см. раздел «Гингивит и воспалительные процессы полости рта»). Гнойное отделяемое обычно едкое и вызывает раздражение кожи при соприкосновении с ней.

Обратите особое внимание — симптомы *Mercurius* во многом сходны с симптомами *Silicea*, поэтому никогда не следует назначать эти лекарства друг за другом. Если же возникает необходимость в подобном назначении, то между этими препаратами следует назначить *Sulphur* или *Hepar sulphuris*, в противном случае возможно усиление симптомов заболевания.

Phosphorus

Одним из свойств *Phosphorus* является тропность к заболеваниям нижней челюсти. Поэтому, хотя *Phosphorus* и не является главным средством при абсцессах, его назначение может быть весьма эффективным при абсцессах нижней челюсти, особенно если абсцесс сочетается с кровоточивостью. Назначение данного препарата особенно полезно тем животным, у которых отмечаются и другие симптомы *Phosphorus* — например, когда животные легко пугаются и вздрагивают.

Pyrogenium

О назначении данного средства следует подумать при рецидивирующих абсцессах в области челюстей, которые сопровождаются выраженным перифокальным воспалением с деструкцией тканей и чрезвычайной болезненностью. В некоторых случаях у таких животных отмечается генерализация инфекции и развитие крайне тяжелого состояния. Для данного средства типичны зябкость и настолько сильные боли, особенно в области спины, что животные постоянно находятся в движении, не в силах найти себе удобное положение.

Silicea (Silica)

Silicea представляет собой главное средство при абсцессах. Симптомами, которые указывают на данное лекарство, являются слабость, снижение реактивности, зябкость и чувстви-

тельность к шуму. Гнойное отделяемое в типичных случаях не имеет раздражающего характера и не такое зловонное, как у *Hepar sulphuris* или *Mercurius*. Для данного препарата характерна также повышенная хрупкость и неполноценность развития зубов (как у животных *Calcareo*), однако животные *Silicea* тонкокостные и изящного телосложения.

Гомеопатические средства при кариозном разрушении зубов

Примечание. Как мы уже говорили, гомеопатические средства не обладают способностью восстанавливать разрушенные в результате кариеса зубы, однако могут замедлить или остановить дальнейшее прогрессирование кариеса.

Calcareo carbonica

См. раздел «Гомеопатические средства при абсцессах в области корней зубов».

Calcareo fluoric

Назначение гомеопатических препаратов, содержащих фтор, показано при разрушении костей и зубов, так как фтор обладает способностью восстанавливать содержание кальция как в костной ткани, так и в ткани зубов. У животных с симптомами данного средства отмечается выраженное нарушение образования зубной эмали; кроме того, зубы у них легко крошатся. Лимфоузлы увеличены, часто каменистой плотности. Вследствие неправильного усвоения пищи и неполноценности рациона у этих животных выражено нарушение питания. Обычно эти животные слабые, тощие и костлявые; часто отмечаются признаки рахита.

Fluoricum acidum

Отмечается позднее прорезывание зубов и их раннее разрушение, особенно в области шейки зубов. Животные с симптомами этого средства обычно слабые и болезненные, однако не переносят жару. Отмечаются значительные дегенеративные изменения, причем даже молодые животные могут выглядеть старше, чем на самом деле.

Mezereum

Данное средство показано при быстром разрушении корней зубов. Часто отмечается сочетание разрушения зубов вследствие кариеса и сильный кожный зуд без видимых признаков заболеваний кожи.

Thuja occidentalis

Состояние *Thuja* характеризуется склонностью к кариозному разрушению зубов в области шейки и повышенной чувствительностью зубов. У животных с симптомами этого средства отмечается обилие бородавок, которые могут располагаться даже в полости рта; кроме того, типичны заболевания мочевыводящих путей. Шеечный кариес, типичный для данного препарата, чаще встречается у кошек. *Thuja*, как и *Mezereum*, является главным средством для лечения заболеваний, связанных с вакцинацией. Настолько ли далеким от действительности кажется предположение, что вакцинация так же сказывается на раннем развитии кариеса у кошек, как и неполноценное питание?

Система пищеварения



Пища и питание

Функции

Регургитация и рвота

Диарея

Запор

Вздутие живота (метеоризм)

ПИЩА И ПИТАНИЕ

Мне всегда нравилось выражение «Мы – то, что мы едим»; это относится к кошкам и собакам в той же степени, что и к человеку. От неполноценной пищи прежде всего страдает система пищеварения; другие органы – печень, поджелудочная железа, почки, кожа – поражаются вторично. Поражение печени и поджелудочной железы в данном случае связано с непосредственным участием этих органов в процессе переваривания пищи; поражение почек и кожи (и печени) обусловлено той функцией, которую они выполняют, т. е. функцией выделения. Как у людей, так и у животных наилучшим источником питательных веществ, витаминов и ферментов является натуральная пища, так как витамины и ферменты чрезвычайно чувствительны к нагреванию и легко разрушаются при термической обработке.

С точки зрения традиционной китайской медицины несомненная польза натуральной пищи обусловлена наличием в ней энергии *Ци* (см. гл. 2 «Природа болезни»). Пища, лишенная энергии *Ци*, обеспечивает питательными веществами только лишь физическое тело, а жизненная сила каждого живого существа поддерживается и укрепляется за счет энергии *Ци*, заключенной в натуральной пище. В 30-е годы д-р Френсис Поттенджер провела интересный эксперимент, который наглядно иллюстрирует данное положение. Рацион питания трех групп кошек был одинаковый и состоял из мяса, молока и рыбьего жира. Кошки первой группы получали сырое мясо и сырое молоко. Кошки второй группы получали вареное мясо и сырое молоко, а кошек третьей группы кормили сырым мясом и пастеризованным молоком. Через некоторое время д-р Поттенджер отметила, что кошки первой группы все как одна похорошели и приобрели весьма цветущий вид, а у кошек второй и третьей групп появились признаки недостатка питания. Кроме того, д-р Поттенджер отметила еще одно на первый взгляд совершенно невероятное явление: все растения в вольере, где содержались кошки первой группы, тоже похорошели и разрослись, а в вольерах кошек второй и третьей групп все растения вытянулись и стали длинными и тонкими. Химический анализ пищи всех трех групп кошек, несомненно, показал бы одинаковое содержание питательных веществ, однако созда-

валось впечатление, что при термической обработке пища утрачивала какие-то очень важные свойства. Эти «важные свойства» и есть энергия *Ци*. Недостаток энергии *Ци* у кошек сразу же отразился и на состоянии растений в их вольерах!

В процессе эволюции хищники приспособились к получению основной части питательных веществ (а представители семейства кошачьих – всех питательных веществ) при поедании свежееубитой добычи. Это имеет решающее значение для поддержания их здоровья. Все попытки заставить хищников питаться вегетарианской пищей приводят лишь к тому, что у них развиваются признаки недоедания. И если собаки еще как-то могут приспособиться к недостаточному количеству мяса в их рационе, то кошки – облигатные хищники – должны для поддержания своего здоровья получать практически полностью мясное питание.

Будучи вегетарианцем уже в течение достаточно долгого времени, я полностью разделяю точку зрения, что люди не должны употреблять в пищу других животных. Однако стараться сделать хищников вегетарианцами, по моему мнению, совершеннейшая глупость. Мне приходилось множество раз наблюдать признаки нарушения питания у тех кошек и собак, которых (из лучших побуждений, естественно!) ограничивали в потреблении натуральной пищи. Представьте на миг, что вы превратились в питомца вашей кошки, что она заботится о вашем здоровье и хочет побаловать вас чем-нибудь «вкусненьким». Чем же она вас угостит? Конечно, свежепойманной мышкой! Этот благородный жест у вас скорее всего вызовет недоумение – люди не привыкли есть подобную добычу. Я думаю, что такое же чувство недоумения испытывает и ваша кошка, когда вы пытаетесь накормить ее кашкой из злаков. Если вам трудно по какой-либо причине кормить кошку или собаку свойственной им пищей, то, может быть, вам лучше завести травоядных домашних питомцев, например хомячков?

ФУНКЦИИ

Как у собак, так и у кошек заболевания системы пищеварения – явление достаточно распространенное. Одной из основ-

ных функций желудочно-кишечного тракта является защитная — система пищеварения представляет собой мощный барьер, препятствующий попаданию токсинов, бактерий и вирусов во внутреннюю среду организма. По значению защитной функции пищеварительная система уступает только кожному покрову, а общая площадь слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта вполне сопоставима с общей площадью кожи. Фактически организм любого живого существа представляет собой полый цилиндр соответствующих размеров, снаружи защищенный кожей, а изнутри — слизистой оболочкой пищеварительного тракта.

В норме на поверхности кожного покрова, во всех порах и волосяных фолликулах находится огромное количество разнообразных микроорганизмов. На внутренней поверхности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, во всех складках и карманах также «проживает» огромная популяция микроорганизмов и простейших. Здоровый организм и микрофлора кишечника сосуществуют в гармонии, причем микроорганизмы выполняют ряд полезных функций, помогая процессу пищеварения и вырабатывая некоторые витамины, в частности витамины группы В. Даже пресловутая кишечная палочка *Esh. coli* является постоянным обитателем кишечника практически любого живого существа на земле. Гармонические взаимоотношения заканчиваются, как только развивается какое-либо заболевание организма-хозяина — в ответ на это сразу же начинается усиленное размножение бактерий.

Основной функцией системы пищеварения являются разделение пищи на полезную и «бесполезную» части, соответствующая обработка полезной составляющей и усвоение питательных веществ. Первоначальная обработка пищи начинается в ротовой полости путем ее пережевывания с добавлением слюны, хотя у кошек и собак процесс жевания выражен лишь в минимальной степени. Плотноядные просто разрывают пищу на куски и сразу же их проглатывают. Исключением является разгрызание костей и пережевывание сухой пищи. По сути дела, процесс разгрызания костей полезен для организма любого хищника и крайне редко приводит к каким-либо осложнениям. Однако сухая пища в целом не приносит никакой пользы, особенно организму кошек, и никоим образом не мо-

жет заменить разгрызание костей как метода укрепления и очищения зубов и десен.

Собственно процесс переваривания пищи начинается в полости рта, где пища измельчается в присутствии слюны, содержащей определенное количество слизи и фермент птиалин (по строению он напоминает амилазу – фермент, под воздействием которого происходит расщепление углеводов). В желудке в присутствии соляной кислоты и ферментов, а также за счет периодических сокращений гладкой мускулатуры съеденная пища превращается в пищевую кашу – субстрат, вполне пригодный для дальнейшей обработки в тонком кишечнике. В отличие от организма человека соляная кислота в организме хищников вырабатывается только во время еды. В процессе эволюции у хищников выработалась привычка наедаться до отвала, когда предоставляется такая возможность, а потом отдыхать, пока не появится потребность поймать очередную добычу и съесть ее. Полное голодание в перерывах между поеданием значительного количества высококалорийной мясной пищи, несомненно, приносит пользу организму хищников – их пищеварительный тракт успевает отдохнуть и полностью освободиться от всех пищевых остатков. У людей обычно не бывает подобного периода полного отдыха между приемами пищи; вполне возможно, что пищевые остатки, обладающие канцерогенными свойствами, способствуют развитию злокачественных новообразований толстого кишечника. Кроме того, у хищников нет необходимости в постоянной выработке соляной кислоты в желудке. Таким образом, прерывистый режим питания хищников является существенным фактором сохранения их здоровья.

Из желудка пищевая каша поступает в тонкий кишечник, где процесс дальнейшего расщепления пищи происходит под воздействием желчи, поступающей из печени и желчного пузыря, и целого ряда ферментов. Желчь и фермент липаза, который содержится в панкреатическом соке, необходимы для расщепления жиров; расщепление углеводов происходит под воздействием амилазы; для расщепления белков необходим трипсин. Амилаза и трипсин, так же как и липаза, вырабатываются в поджелудочной железе. Кроме того, в процессе переваривания пищи принимают активное участие бактерии, населяющие тонкий и толстый кишечник; бактерии помогают

трансформировать пищу в ингредиенты, которые легко усваиваются организмом. Процесс усвоения (ассимиляции) питательных веществ из предварительно обработанной в желудке пищи начинается в верхних отделах тонкого кишечника и в основном заканчивается к тому моменту, когда пищевая кашица перемещается в толстый кишечник.

Основная функция толстого кишечника заключается в накоплении твердых пищевых остатков с их последующей эвакуацией. Важной составной частью процессов, происходящих в толстом кишечнике, является реабсорбция (т. е. обратное всасывание) воды и солей. Реабсорбция воды и солей значительно усиливает эффективность водно-солевого обмена.

У здоровых животных потребление пищи и воды происходит в соответствующих количествах и в определенном темпе. По той же причине эвакуация пищевых остатков и выделение жидкости также подчиняются заданному ритму и происходят в соответствующих объемах. В основном выделение (экскреция) жидкости происходит через почки, однако часть жидкости выделяется в составе каловых масс, определяя их мягкую консистенцию.

Заболевания системы пищеварения проявляются в неспособности желудочно-кишечного тракта полностью или частично выполнять свойственные ему функции. При нарушении прохождения пищи по верхним отделам желудочно-кишечного тракта возможна регургитация, т. е. удаление непереваренной пищи через рот вскоре после кормления. Если же пища достаточно долго находилась в желудке или верхних отделах кишечника и уже подверглась определенной обработке, то процесс удаления такой частично обработанной пищи называется рвотой. Возможна слишком быстрая или слишком медленная эвакуация содержимого толстого кишечника. При слишком быстром пассаже кишечного содержимого по толстому кишечнику нарушается реабсорбция воды, что приводит к диарее. При замедленном пассаже кишечного содержимого происходит чрезмерная реабсорбция воды, в результате чего каловые массы становятся сухими и твердыми — развивается запор. Как при диарее, так и при запоре в каловых массах может присутствовать слизь, кровь или непереваренные пищевые остатки; дефекация может сопровождаться тенезмами, т. е. сильным

натуживанием, или отхождением обильного количества кишечных газов; в некоторых случаях каловые массы приобретают несвойственный им запах. Неполюценное питание и нарушенное пищеварение также могут быть причиной раздражающих выделений из прямой кишки, что в некоторых случаях сопровождается воспалением в области ануса.

РЕГУРГИТАЦИЯ И РВОТА

В некоторой степени регургитация и рвота могут считаться нормальным явлением как у кошек, так и у собак. Эти виды животных обладают способностью произвольного сокращения гладкой мускулатуры верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что позволяет им вовремя избавиться от недоброкачественной пищи. Это явление типично скорее для собак, чем для кошек, так как и у норных, и у охотничьих собак больше возможностей съесть потенциально опасную пищу. У кошек регургитация и рвота также играют определенную защитную роль. В отличие от других видов животных у кошек ограничена способность разрушения токсических субстанций, поступающих в организм в составе недоброкачественной пищи. Таким образом, у кошек риск отравлений намного больше, чем, например, у собак; если бы кошки не обладали способностью произвольно избавляться от содержимого желудка, то, вероятно, этот вид вообще не смог бы существовать. (По этой же причине кошки плохо реагируют на многие лекарства. Например, для них чрезвычайно токсичен ацетаминофен (тайленол) — кошкам никогда нельзя назначать этот препарат). У кошек чрезвычайно развито чувство вкуса и обоняния, которые также выполняют определенную защитную функцию, предохраняя их от поедания испорченной пищи. В процессе эволюции у данного вида выработался определенный стереотип — поедать только свежееубитую добычу. Кошки, как правило, очень разборчивы и привередливы в еде — таким образом их организм защищается от попадания внутрь токсических продуктов. К сожалению, большинство видов готовых кормов для кошек содержат значительные количества именно таких токсичных для них ингредиентов.

Таким образом, употребление готовых консервированных пищевых смесей приводит у кошек и собак к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях простое изменение диеты и полный отказ от употребления готовых «коммерческих» кормов значительно улучшает состояние животных. Именно сырое необработанное мясо содержит ферменты, которые способствуют пищеварению и во многих случаях помогают ликвидировать как заболевания ЖКТ, так и последствия плохого усвоения питательных веществ, что и является наиболее частой причиной как рвоты, так и диареи у собак и кошек.

Особенности наблюдения за животными при регургитации и рвоте

Если у вашего питомца отмечается *регургитация или рвота*, то прежде всего *следует оценить тяжесть его состояния, ответив на следующие вопросы:*

- Это единичный случай, или рвота и регургитация возникают периодически?
- Из чего состоят рвотные массы? Есть ли в составе рвотных масс остатки переваренной или непереваренной пищи, слизь, примесь крови или желчи?
- Нет ли необычного запаха у рвотных масс?
- Не отмечается ли у вашего питомца вялости и слабости?
- Нет ли признаков обезвоживания? (Для проверки степени обезвоживания у животных надо приподнять и сразу же отпустить складку кожи на спине. Если кожная складка быстро расправляется, то обезвоживания нет. Если кожная складка сразу не расправляется, а остается на некоторое время, то это указывает на обезвоживание. При возможности сравните с кожной складкой у здорового животного).

Следует немедленно обратиться к ветеринару:

- если у вашего питомца выражена слабость или обезвоживание,
- если рвота отмечается более 2–4 раз в день, особенно если рвота продолжается более трех дней,
- если в рвотных массах вы заметили примесь крови (от ярко-

красного до черного цвета) или рвотные массы имеют зловонный запах,

- если рвота продолжается несмотря на «голодную» диету.

Не откладывайте обращение к ветеринару надолго:

- если рвота или регургитация бывают у вашего питомца чаще одного раза в неделю,
- если рвота сохраняется после коррекции питания или после домашнего лечения,
- если в рвотных массах вы раза два заметили примесь желчи.

Оценив тяжесть состояния, *постарайтесь определить факторы, которые способствуют возникновению приступа рвоты:*

- Есть ли связь между кормлением вашего питомца и возникновением рвоты? Не возникает ли рвота после обильной еды? Через какое время после еды случается рвота?
- Не было ли случаев поедания вашим питомцем испорченной пищи или пищевых отходов?
- В какое время суток чаще всего возникает рвота – утром, днем, вечером или ночью?
- Не предшествует ли приступу рвоты беспокойство или стрессовая ситуация?

Острый приступ рвоты

Если после приступа рвоты состояние вашего питомца не производит впечатление тяжелого и сохраняется активность, то лучше всего оставьте его без еды примерно на сутки – пусть желудок успокоится и вернется в нормальное состояние. Через 4–8 часов предложите ему небольшое количество мясного бульона (одна столовая ложка для кошек и маленьких собак, 30–120 мл для собак среднего роста и примерно 250 мл для собак крупных пород) дважды с интервалом 15–30 мин. Конечно, лучше приготовить бульон из свежего мяса; не следует предлагать вашему питомцу консервированный бульон. Если после первой порции бульона рвота повторилась, то подождите еще часа 3–4 и еще раз предложите соответствующее количество бульона. Если же у вашего питомца аппетит отсутствует, то лучше всего подождать с кормлением до следующего утра. Через сутки после приступа рвоты можно предложить неболь-

шое количество мясного бульона с крупами (одну столовую ложку кошкам и собакам небольшого роста, 30–120 мл собакам среднего роста и примерно 250 мл крупным собакам). Бульон надо сварить из свежего мяса с добавлением белого риса, измельченного проса или измельченных овсяных хлопьев (соотношение мяса и крупы какого-либо вида — один к двум). Если после кормления рвота возобновилась, то опять следует дать вашему питомцу поголодать и затем начать кормление с простого мясного бульона.

Диетическое питание (мясной бульон с крупами) целесообразно продолжать в течение суток, а затем, если состояние вашего питомца улучшилось и аппетит нормализовался, можно вернуться к обычному рациону. Конечно, домашних животных лучше кормить свежеприготовленной пищей; если же это невозможно по какой-либо причине, то постарайтесь, чтобы свежеприготовленные продукты составляли хотя бы 50% рациона. При наличии у вашего питомца каких-либо нарушений со стороны ЖКТ следует постепенно, в течение нескольких недель перейти на свежеприготовленную домашнюю пищу и полностью отказаться от консервированных и готовых кормов. Однако резкий переход от готовых кормов к домашней пище не рекомендуется — подобное кардинальное изменение питания может спровоцировать расстройства пищеварения. Особенно осторожно и постепенно (не более 25% объема пищи за одну неделю) следует менять рацион ослабленных или старых животных, так как они обычно чрезвычайно остро реагируют на любые изменения.

Приступы рвоты хронического характера

Животным с частыми приступами рвоты надо обязательно провести обследование для выяснения причины этого явления. Пока приступы рвоты полностью не прекратились, животных должен лечить и наблюдать ветеринар-гомеопат. Рекомендуется изменить питание и полностью перейти на кормление свежеприготовленной домашней пищей, отказавшись от всех видов консервированных и готовых кормов для кошек и собак. В большинстве случаев такое изменение питания благотворно сказывается на функции желудочно-кишечного тракта.

Гомеопатические средства при регургитации и рвоте

Arsenicum album

Большое гомеопатическое средство при рвоте и диарее. *Arsenicum* применяется при лечении как легких случаев, так и тяжелых состояний с непосредственной угрозой для жизни. Для *Arsenicum* характерна триада симптомов – беспокойство, зябкость и жажда. В типичных случаях жажда утоляется небольшим количеством жидкости, однако некоторым животным требуются весьма значительные количества воды. У животных с симптомами данного средства часто сразу же после питья возникает регургитация и отрыжка. Для *Arsenicum* характерно одновременное начало приступа рвоты и диареи. В некоторых случаях развивается выраженная слабость вплоть до коллапса, что сопровождается снижением кожной температуры. Тошнота может быть настолько сильной, что животные *Arsenicum* не переносят ни вида, ни запаха пищи. В некоторых случаях отмечается жажда без желания пить жидкости – тогда можно заметить, как животные раскачивают головой из стороны в сторону, стоя над миской с водой. Рвотные массы имеют зловонный запах, иногда напоминающий запах фекалий (фекалоидная рвота). Рвотные движения могут быть весьма болезненными – в некоторых случаях это можно заметить у кошек, которые непосредственно перед рвотой издают специфическое мяуканье.

Arsenicum полезен при парвовирусной инфекции у собак, а также представляет собой главное средство при различных отравлениях (например, при пищевом отравлении или поедании отбросов).

Bismuthum

В Периодической системе элементов Д.И. Менделеева висмут принадлежит к той же группе, что и мышьяк. Основные симптомы этих средств во многом схожи, однако симптомы *Bismuthum* выражены намного сильнее. Ключевым симптомом данного средства является боль в области желудка. Часто животные с симптомами данного препарата буквально льнут к своим опекунам. У них выражено желание холодной жидкости, однако после питья сразу же начинается рвота. *Bismuthum* назначается достаточно

редко, однако может быть полезным при болях в области желудка различной этиологии, в том числе и при злокачественных новообразованиях.

Ferrum metallicum

У животных с симптомами данного средства отмечается регургитация сразу же после еды, часто без предшествующей тошноты. В некоторых случаях наблюдается совершенно атипичное для хищников отвращение к мясу. Кроме того, для животных *Ferrum metallicum* характерно чередование периодов повышенного и сниженного аппетита. Часто у животных данного типа отмечается анемия с бледностью десен и головные боли пульсирующего характера. У них обычно твердый, неуступчивый характер («как железо»); этим животным не нравится, когда их заставляют делать что-либо против их воли (этот психический симптом достаточно часто встречается при головной боли). Именно из-за сильных головных болей животные данного типа часто избегают ласки и особенно поглаживаний по голове.

Iresacuanha

При приступах рвоты именно *Iresacuanha* представляет собой наиболее эффективное гомеопатическое средство. Ключевыми симптомами данного препарата являются тошнота и рвота в сочетании с нарушениями дыхания. Ощущение тошноты очень тягостно и не облегчается после рвоты. Состояние *Iresacuanha* может развиваться вследствие переедания и употребления высококалорийной пищи. Рвота во время кормления у маленьких щенков и котят также является симптомом *Iresacuanha*. У пациентов с симптомами данного средства в рвотных массах часто можно обнаружить примесь крови.

Nux vomica

Nux представляет собой одно из основных гомеопатических средств при отравлениях у животных, в частности при отравлениях пищевыми отбросами. Кроме того, назначение данного препарата полезно при рвоте, диарее или запоре, если эти симптомы являются следствием токсического действия некоторых аллопатических препаратов. Это лекарство применяется дале-

ко не во всех случаях рвоты, как можно было бы предположить по его названию (*Nux vomica* – «рвотный орех»). Животные с симптомами *Nux* обычно зябкие и раздражительные. Возможно, их раздражительность является следствием спастических болей, а также неукротимой, болезненной рвоты и диареи. Животные с симптомами данного лекарства часто испытывают облегчение после рвоты; от переедания их состояние ухудшается.

Phosphorus

Для *Phosphorus* характерна скорее регургитация, чем рвота. Животные с симптомами *Phosphorus* часто срыгивают пищу и питье после согревания их в желудке. Регургитация более характерна для кошек после торопливого поедания сухой пищи большими кусками, так как голод – обычное ощущение животных *Phosphorus*. Ощущение голода обычно сопровождается жаждой, причем животные данного типа предпочитают пить холодную воду. Животные с симптомами *Phosphorus* чаще всего худощавые, громкоголосые и дружелюбно настроенные.

Pulsatilla

У этого средства отмечаются два характерных симптома – отсутствие жажды и рвота непереваренной пищей спустя несколько часов после еды. Животные с симптомами данного препарата жаждут внимания и ласки, постоянно находясь рядом. Несмотря на общую зябкость, животные *Pulsatilla* не переносят тепла, жарких помещений и стремятся на свежий воздух. Обычно животные этого типа – милейшие и приятные существа, согревающие наши души.

Veratrum album

Симптомы данного средства во многом напоминают симптомы *Arsenicum*. Для *Veratrum* характерны выраженная тошнота, жестокая неукротимая рвота, развитие коллаптоидного состояния и снижение кожной температуры. Животные с симптомами данного препарата, подобно животным *Phosphorus*, испытывают сильный голод и жажду с желанием холодной воды. Выпитая вода немедленно извергается наружу, после чего появляются позывы к рвоте. Отмечается сильная болез-

ненность рвотных движений; рвота часто сопровождается диареей. Начало заболевания, как правило, внезапное, с быстрым развитием коллаптоидного состояния и похолоданием тела. Слизистые оболочки, особенно десны, быстро приобретают синюшный оттенок вследствие обезвоживания и нарушения кровообращения. Животные *Veratrum* нуждаются в неотложной ветеринарной помощи, однако в критических ситуациях назначение данного средства на фоне интенсивной терапии может принести значительную пользу. Животные с симптомами данного лекарства часто бывают чрезвычайно раздражительными — если у них еще остались силы. Назначение *Veratrum* при пищевых отравлениях в некоторых случаях также бывает очень полезным.

ДИАРЕЯ

За счет жидкого стула, так же как и с помощью рвоты, организм стремится быстро избавиться от токсических субстанций и негодных продуктов. В большинстве случаев после удаления из организма подобных веществ диарея самопроизвольно прекращается. Причиной острой диареи у кошек и собак является поедание пищи, содержащей токсины, а также обсемененной бактериями, вирусами (парвовирус у собак, вирус панлейкопении у кошек) и некоторыми видами паразитов (гельминты, *Giardia*). Причиной острой диареи может стать также применение целого ряда аллопатических препаратов, токсичных для собак и кошек, — таким образом организм также старается как можно быстрее удалить их во внешнюю среду.

Случаи диареи при хронических заболеваниях представляют собой системное нарушение и указывают на недостаточность механизма иммунной защиты в организме. Можно выявить множество причин диареи при хронических заболеваниях, однако одной из самых важных является неправильное и неполноценное питание. Кроме того, возможно возникновение хронической диареи при повторных вакцинациях против вирусных инфекций, вызывающих диарею, за счет развития хронической формы этого заболевания (см. гл. 16 «Вакцинация»).

Особенности наблюдения за животными с диареей

Если у вашего питомца появилась *диарея*, прежде всего *постарайтесь оценить тяжесть состояния, ответив на следующие вопросы:*

- Это единичный случай или приступы диареи периодически повторяются?
- Как часто у вашего питомца бывает жидкий стул?
- Как выглядят каловые массы? Нет ли в фекалиях примеси крови (ярко-красного или черного цвета), большого количества слизи, непереваренных остатков пищи? Какой цвет у каловых масс?
- Нет ли признаков дегидратации (обезвоживания – см. раздел «Рвота»)?
- Нет ли слабости и вялости?
- Не выражено ли натуживание при дефекации?

Необходимо немедленно обратиться к специалисту-ветеринару:

- если выражена слабость и есть симптомы обезвоживания,
- если в каловых массах имеется примесь крови ярко-красного или черного цвета,
- если жидкий стул отмечается более 6–8 раз в день.

Не следует откладывать надолго обращение к ветеринару:

- если диарея у вашего питомца продолжается более трех-четырех дней,
- если диарея сохраняется после домашнего лечения или после коррекции питания,
- если эпизоды диареи повторяются каждый месяц,
- если отмечается потеря веса или ухудшается состояние кожи и шерсти.

После определения тяжести состояния *постарайтесь выявить факторы, которые способствуют возникновению жидкого стула:*

- Не отмечается ли диарея после еды или после употребления определенных пищевых продуктов?
- Нет ли связи с поеданием испорченной пищи или пищевых отходов?

- Не предшествовал ли диарее стресс или эпизод выраженного беспокойства?
- В какое время суток чаще всего возникает диарея?

Острая диарея

Если на фоне диареи состояние вашего питомца не ухудшается, нет выраженной слабости и вялости и сохраняется активность, то простое изменение питания может ускорить выздоровление. Предложите ему пищу, состоящую из вареного мяса, смешанного с кашей (рисовой или из проса) в соотношении 1:2 (одна часть мяса и две части каши). Голодание в течение 24 часов также часто ускоряет выздоровление. На следующий день после суточного голодания предложите вашему питомцу свежий (не консервированный) мясной бульон; затем до нормализации стула кормите его смесью вареного мяса и каши какого-либо вида в соотношении 1:2. После нормализации стула можно вернуться к прежнему рациону. Кошки обычно отказываются есть каши, поэтому соотношение вареного мяса и вареных круп у них целесообразно изменить и давать им две части мяса и одну часть каши. Можно также кормить вашего питомца детским питанием, однако вначале следует убедиться, что в его составе нет лука (у животных употребление в пищу лука может вызвать анемию). Полезным растительным средством при диарее является свежесваренная кора вяза — порошок коры вяза продается в большинстве магазинов здоровой пищи.

При развитии признаков слабости и обезвоживания следует немедленно обратиться к ветеринару, так как в подобных случаях чаще всего необходимо медикаментозное лечение.

Хроническая диарея

При хронической диарее прежде всего следует (по возможности) провести вашему питомцу полноценное обследование для выявления причины заболевания. Старайтесь избегать назначения антибиотиков — на самом деле при хронической диарее достаточно редко возникают показания для их применения, однако назначаются они часто. Если обнаружена гельминтная инвазия, то целесообразно провести дегельминтизацию достаточно эффективными аллопатическими средствами или специальными сборами трав (см. книгу д-ра Питкерна по дегельмин-

тизации – гл. «Дополнение»). Если обнаружена и микроскопически подтверждена паразитарная инфекция *Giardia*, то одним из эффективных методов лечения является назначение отвара из семян грейпфрута в течение 10–14 дней. Для улучшения иммунитета лечение можно дополнить назначением гомеопатических средств. Если вы сочтете необходимым назначение антибиотиков, то проведите курс пенициллина G – этот препарат достаточно эффективный, однако значительно менее токсичный, чем флагил (метронидазол). В традиционной ветеринарии, однако, флагил назначается гораздо чаще несмотря на свои токсические свойства.

Изменение питания при хронической диарее, так же как и при хронической рвоте, во многих случаях помогает полностью избавить вашего питомца от этого заболевания. В первый месяц–два лечения рекомендуется назначение ферментных препаратов, так как во многих случаях хронической диареи организм животных просто неспособен полноценно переваривать пищу. Эти пищевые ферменты можно приобрести как в обычных аптеках, так и в специализированных магазинах для животных. Нет необходимости применять пищевые ферменты, предназначенные специально для животных – «человеческие» ферментные препараты оказывают точно такое же действие. Наилучшими являются препараты, приготовленные из панкреатического сока животных (амилиза, липаза, трипсин), однако назначение препаратов аналогичного действия, изготовленных из растительного сырья (папаин, бромелайн и т. п.), также эффективно. Перед назначением препаратов данной группы вашим домашним животным следует убедиться, что в их составе нет искусственно синтезированных химических соединений.

Обратите особое внимание на изменение питания вашего подопечного и постарайтесь постепенно перейти от готовых кормов и консервированных видов специальной пищи к полноценной пище, приготовленной в домашних условиях. В некоторых случаях для подобного кардинального изменения питания может потребоваться до полугода – поэтому вам надо запастись необходимым терпением. Если ваш питомец страдает каким-либо воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта, то процесс перехода на полноценную домашнюю пищу может быть даже более длительным. В хронических слу-

чаях диареи лечение целесообразно проводить по назначениям профессионала-гомеопата, однако не следует забывать, что иногда может понадобиться лечение и наблюдение традиционного врача-ветеринара.

Гомеопатические средства для лечения диареи

Aloe

Для данного средства характерен жидкий стул с обилием газов, причем позывы к дефекации иногда бывают настолько сильными и внезапными, что животные часто не успевают выбежать на улицу или добраться до своего туалета. Кроме того, дефекация и мочеиспускание часто происходят одновременно. Отмечается воспаление в области заднего прохода с ощущением жжения. Диарея обычно появляется рано утром, заставляя животных просыпаться. Обычно у животных данного типа утром плохое настроение, однако к вечеру они становятся гораздо веселее. Характерна также легкая утомляемость.

Arsenicum album

Жидкие каловые массы у животных *Arsenicum* часто необычайно зловонные; их запах напоминает запах гниющего мяса. Каловые массы нередко черного цвета и/или водянистого характера; отмечается раздражение слизистой оболочки прямой кишки и анального отверстия, что приводит к воспалительным явлениям и гиперемии ануса. Диарея обычно сопровождается сильным натуживанием, вследствие чего в некоторых случаях отмечается выпадение прямой кишки. Часто диарея и рвота происходят одновременно. Животные с симптомами данного средства часто меняют положение тела, но это не приносит им желаемого облегчения. В целом типичная для *Arsenicum* триада симптомов (беспокойство, жажда и зябкость) сохраняется до тех пор, пока не разовьется сильная слабость. При некоторых заболеваниях, например при парвовирусном энтерите, слабость может быть выраженной.

Baptisia

Для *Baptisia* характерно стремительное развитие симптоматики с быстрым истощением и упадком сил. Подобное состоя-

ние развивается при некоторых острых кишечных инфекциях у собак, в частности при парвовирусном энтерите. При соответствии симптомов вашего питомца картине данного средства следует немедленно начать прием *Baptisia* и сразу же в экстренном порядке обратиться в ветеринарную клинику. У животных с симптомами данного препарата, как правило, отмечается водянистый темный стул с примесью крови и зловонным запахом; часто диарея сочетается со рвотой. Отмечается быстрое развитие слабости и вялости, выраженная жажда и полное отсутствие аппетита. Характерным симптомом, указывающим на *Baptisia*, является темная окраска десен.

Chamomilla

Ключевым симптомом *Chamomilla* является диарея в период прорезывания зубов, при этом каловые массы имеют травянисто-зеленый цвет и зловонный запах. Каловые массы у животных с симптомами данного средства обладают раздражающим действием, поэтому часто отмечается воспаление и раздражение анального отверстия. Характерными психическими симптомами животных *Chamomilla* является раздражительность, повышенная чувствительность к внешним воздействиям и беспокойство, которое часто сочетается с поскуливанием. Состояние таких животных облегчается лишь при постоянном ношении их на руках и непрерывном поглаживании. Обычно у животных с симптомами данного препарата отмечается избыток внутреннего тепла и жажда.

China (Cinchona) officinalis

Характерным симптомом животных *China* является резкая общая слабость при потере любых биологических жидкостей, в том числе и жидких каловых масс при диарее. Каловые массы обычно желтого цвета, содержат примесь крови и остатки непереваренной пищи; жидкий стул часто сочетается со вздутием живота. Часто отмечаются боли в животе спастического характера. Область живота чувствительна к прикосновению, причем легкое прикосновение бывает более болезненным, чем грубое надавливание. Диарея с подобными симптомами чаще всего возникает в летний период. У щенков и котят показанием для назначения *China* является диарея после прекращения

грудного вскармливания. Характерной особенностью является у взрослых животных сочетание диареи с заболеваниями почек. Со стороны психической сферы у животных данного типа преобладают слабость и апатия.

Colocynthis

Для животных с симптомами данного средства характерно наличие желеобразной слизи в жидких каловых массах. Диарея появляется после каждого приема пищи и питья, пусть даже в незначительных количествах. Диарея сопровождается вздутием живота. В каловых массах отмечаются включения белого цвета. Любое заболевание кишечника, как правило, сопровождается сильнейшими болями в животе, из-за которых животные стараются лечь на живот или свернуться в клубок, поскольку сгибание туловища или надавливание на живот облегчают боль. Резкая боль в животе, заставляющая их стонать и повизгивать, может возникнуть даже при легком прикосновении.

Croton tiglium

Характерным симптомом данного средства является стул желтого цвета, который буквально выбрасывается фонтаном. Кроме того, у животных с симптомами *Croton tiglium* часто возникают внезапные позывы к дефекации, напоминающие таковые у животных *Aloe*. Однако в отличие от животных *Aloe* стул отличается «взрывным» характером и выбрасывается с гораздо большей силой. Симптоматика данного препарата часто соответствует (и, следовательно, излечиваются им) инфекционные поражения кишечника, вызываемые кокцидиями. Возможно сочетание диареи и кожной сыпи, напоминающей сыпь при отравлении ядовитым плющом (*Croton tiglium* часто показан при отравлении ядовитым плющом).

Lycorodium clavatum

Характерным симптомом *Lycorodium* является сочетание патологии кишечника и почек у одной и той же особи, причем симптомы этих заболеваний могут как чередоваться, так и проявляться одновременно. Характерно также резкое вздутие живота за счет скопления кишечных газов. Разумнее всего воспитать у животных этого типа правильную привычку поки-

дать помещение, чтобы освободиться от газов. Данное средство чаще всего назначается именно при хронической диарее. Причиной поноса у животных с симптомами *Lycorodium* обычно являются заболевания печени. В целом животным данного типа не нравится избыток внимания, однако они всегда стараются находиться в одной комнате со своим опекуном.

Mercurius (solubilis или vivus)

У животных с симптомами данного средства почти всегда отмечаются тенезмы и натуживание при дефекации. Натуживание особенно выражено после отхождения каловых масс, что связано с ощущением неполного опорожнения прямой кишки. В жидких каловых массах часто содержится примесь слизи и крови. Позывы на стул могут сочетаться с позывами к мочеиспусканию.

Mercurius corrosivus

Картина данного средства напоминает *Mercurius solubilis*, однако отличается большей выраженностью симптомов. Тенезмы и натуживание при дефекации становятся постоянными, а в каловых массах обнаруживаются обрывки слизистой оболочки кишечника. Назначение *Mercurius corrosivus* чаще требуется особям мужского пола.

Natrum sulphuricum

Характерным симптомом *Natrum sulphuricum* является диарея, которая внезапно появляется рано утром (в 5–6 часов или сразу же после пробуждения). Кроме того, типично усиление диареи в сырую холодную погоду. Диарею в утренние часы, так же как и некоторые другие симптомы *Natrum sulphuricum*, могут спровоцировать холодная пища, холодное питье и употребление овощей. У животных с симптомами этого средства обычно грустный характер; у них нередко обнаруживаются заболевания печени, что также соответствует лекарственной картине *Natrum sulphuricum*.

Nux vomica

В анамнезе животных с симптомами *Nux vomica* часто (но не всегда) встречаются указания на чрезмерное употребление ал-

лопатических препаратов. Возможно чередование запора и диареи; каждый раз при дефекации отмечаются выраженные неотложные позывы. Эти позывы настолько характерны, что их отсутствие позволяет исключить *Nux vomica* из списка предполагаемых средств при лечении заболеваний кишечника. Развитие диареи *Nux vomica* часто провоцируется перееданием или употреблением неполноценной пищи (в том числе и пищевых отходов). У животных с симптомами данного средства отмечаются раздражительность и повышенная чувствительность к шуму.

Phosphoricum acidum

Особенным симптомом данного средства является обильный многократный жидкий стул водянистого характера, содержащий непереваренные остатки пищи. Каловые массы почти не имеют запаха. Многократный жидкий стул не приводит к развитию слабости у животных, что является весьма необычным. Дело в том, что при других состояниях слабость — характерный симптом картины *Phosphoricum acidum*. Кроме того, диарея у животных *Phosphoricum acidum* часто развивается вследствие испуга или состояния тревоги.

Phosphorus

В отличие от *Phosphoricum acidum* диарея у животных *Phosphorus*, как правило, приводит к развитию выраженной слабости. Каловые массы имеют зловонный запах. Подобные симптомы *Phosphorus* очень похожи на симптомы *Arsenicum*. Ключевыми симптомами *Phosphorus* являются кровотечения и выбухание ануса, причем нередко отмечается его зияние. Отмечается также болезненность области заднего прохода. Животные с симптомами данного средства обычно своенравные, нервные, громкоголосые и требовательные как к пище, так и к ласке.

Podophyllum

Данный препарат полезен во многих случаях диареи, особенно при легких ее формах. Часто используется как средство первой помощи. Типичным симптомом *Podophyllum* является диарея в утренние часы и оформленный стул вечером. Обычно в

каловых массах содержится значительное количество слизи. В некоторых случаях каловые массы водянистые и извергаются фонтаном; стул такого характера может появляться после купания животного. При диарее постоянного характера возможно выпадение прямой кишки; в подобных случаях каловые массы приобретают гнилостный запах. Усиление диареи отмечается в жаркую погоду — в отличие от утренней диареи *Natrum sulphuricum*, которая усиливается в сырую холодную погоду. У животных с симптомами данного средства диарея нередко чередуется с другими патологическими состояниями.

Pulsatilla

У животных с симптомами *Pulsatilla* отмечается изменчивый характер стула. В некоторых случаях возможно чередование диареи и запора. Часто жидкий стул появляется сразу же после кормления животных или усиливается по ночам. У неположенных особей женского пола возможно возникновение диареи во время течки. Животные *Pulsatilla*, как правило, не испытывают жажды (необычный симптом при диарее) и стремятся больше времени проводить на свежем воздухе. Обычно у животных данного типа очень привязчивый характер.

Sulphur

Животные *Sulphur*, как и животные *Natrum sulphuricum* и *Podophyllum*, хуже чувствуют себя в утренние часы, просыпаясь от позывов к дефекации. Каловые массы обычно имеют раздражающий характер, вследствие чего развивается воспаление перианальной области с гиперемией и ощущением жжения, которое сменяется мучительным зудом. Животные с симптомами данного средства часто испытывают сильную жажду, однако равнодушны к пище. Обычно они ленивы, неопрятны и предпочитают прохладу.

Veratrum album

Диарея у животных с симптомами *Veratrum* (так же как и рвота *Veratrum*) обычно протекает очень тяжело и быстро приводит к развитию общей слабости, коллапсу и снижению кожной температуры. Характерно, что рвота и диарея нередко появляются одновременно. Натуживание при многократной де-

фекации приводит к быстрому упадку сил. Типично внезапное начало диареи и стремительное ухудшение состояния. Животные с подобными симптомами нуждаются в неотложной ветеринарной помощи, на фоне которой можно назначать соответствующие гомеопатические средства.

ЗАПОР

При запоре отмечается замедленное продвижение кишечного содержимого по толстому кишечнику. Между тем продолжается реабсорбция воды из кишечного содержимого, начатая в тонком кишечнике — именно поэтому при запоре каловые массы становятся плотными, сухими и эвакуируются через анальное отверстие с большим трудом. Кроме того, по мере накопления каловых масс толстая кишка растягивается и увеличивается в объеме, что создает дополнительные трудности при дефекации. Характерно, что во многих случаях толстая кишка остается в перерастянном состоянии и после эвакуации каловых масс, что способствует хронизации процесса.

Развитию запора способствуют многочисленные факторы, в том числе состав пищи, режим питания и отсутствие соответствующей двигательной активности животных. Регулярные прогулки активизируют функцию кишечника, поэтому запор более характерен для малоподвижных особей. Однако наибольшее значение для возникновения запора имеет неправильное питание, при котором в пищевом рационе животных содержится незначительное количество клетчатки. Это явление особенно характерно для кошек, которым требуется преимущественно мясная пища; обычно кошки отказываются от овощей, каш из различных видов злаков и других продуктов, содержащих клетчатку. Дикие представители семейства кошачьих или одичавшие сородичи домашних кошек съедают свежееубитую добычу, так что шерсть съеденных животных способствует регулярному опорожнению кишечника.

Вполне подходящим источником кальция для хищников являются сырые кости, однако у некоторых животных их употребление в пищу вызывает ряд нарушений. Сырые кости могут быть лишь полезным и хорошим дополнением к пита-

нию кошек и собак, но никак не основной пищей — их чрезмерное употребление может привести к нежелательным последствиям для организма. Существует потенциальная опасность повреждения кишечной стенки острыми краями костных отломков, однако в основном это касается вареных костей; в любом случае польза от поедания костей перевешивает риск случайной травматизации кишечника. Разгрызание костей способствует поддержанию здорового состояния зубов и десен как у кошек, так и у собак; немаловажное значение имеет тот факт, что у хищников этот процесс снижает вредное влияние стрессовых факторов.

Среди других факторов, способствующих развитию запора у кошек и собак, следует отметить хроническую перенасыщенность различными традиционными лекарствами, повышенную чувствительность к соединениям алюминия и, возможно, вакцинацию. Если возникает подозрение, что у вашего питомца повышена чувствительность к соединениям алюминия, то не следует готовить ему пищу в алюминиевой посуде и кормить из алюминиевой миски.

Особенности наблюдения за пациентами с запором

Если вы считаете, что у вашего питомца *запор*, то прежде всего *постарайтесь правильно оценить его состояние, ответив на следующие вопросы:*

- Вы уверены, что это действительно запор? Сильное натуживание при дефекации при пустой прямой кишке симулирует симптомы запора, поэтому, прежде чем предпринимать какие-либо меры лечебного характера, следует убедиться в правильности ваших предположений.
- Это единичный случай или подобное происходило раньше?
- Имеется ли сильное натуживание при дефекации? Не происходит ли это постоянно?
- Отходят ли при попытках дефекации каловые массы?
- Есть ли в каловых массах примесь крови, слизи? Какие-либо другие примеси?
- Отмечается ли рвота, потеря аппетита или вялость?

Следует немедленно обратиться к ветеринару:

- если в каловых массах имеется примесь крови или значи-

тельное количество слизи,

- если натуживание при дефекации постоянное и явное,
- если отсутствие стула сочетается с вялостью и рвотой,
- если вы не уверены в правильности оценки состояния вашего питомца, принимая натуживание при пустой прямой кишке за симптом запора.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару:

- если после домашнего лечения явления запора не разрешаются за 1–2 дня,
- если запор повторяется достаточно часто.

Острый запор

При запоре полезно голодание в течение некоторого времени, особенно если ваш питомец пьет достаточное количество жидкости. Предложите ему немного мясного бульона или даже бульона из тунца для усиления потребления жидкости. Различные виды растительного масла обладают легким слабительным действием – небольшое его количество вполне можно добавить в пищу. Подобное же действие оказывают пресервы из тунца с добавлением масла (однако не следует давать животным в течение длительного времени консервы из тунца). Не следует также вливать натуральное масло животным прямо в полость рта – равномерно распределяясь по слизистой оболочке, оно не вызывает глотательного рефлекса; именно поэтому масло может просто стечь в трахею, что часто приводит к развитию тяжелой (или фатальной) пневмонии. Кроме того, следует избегать назначения вашим питомцам (особенно кошкам) слабительных средств в виде пастообразной массы – в их состав часто входит бензоат натрия, который чрезвычайно токсичен для кошек. Вместо слабительных лучше применять растительное масло (для кошек и собак маленьких пород – половину чайной ложки, для собак более крупных пород – до одной столовой ложки) или простой вазелин, небольшое количество которого следует нанести на область твердого нёба. Однако не используйте масло или вазелин дольше недели – у животных может возникнуть зависимость опорожнения кишечника от приема этих средств.

Слабительные препараты на основе трав (например, «*Swiss Kriss*» или «*Gentle Dragon*») достаточно безопасны и эффек-

тивны в случаях запора легкой и средней степени. Эффективным методом стимуляции функции кишечника у животных являются прогулки и игры на свежем воздухе.

Хронический запор

В случаях хронического запора часто требуется назначение специальных лекарственных средств (предпочтительно гомеопатических), особенно если симптомы запора стали постоянным явлением. Однако не следует забывать о таких эффективных мерах, как прогулки на свежем воздухе и изменение пищевого рациона. Старайтесь ежедневно играть с вашим питомцем — игры не только активизируют работу кишечника, но и помогают преодолеть вредные последствия стрессовых ситуаций. Если возможно, готовьте для вашего питомца домашнюю пищу со значительным количеством клетчатки и старайтесь не кормить его консервированными и готовыми кормами (см. гл. «Дополнение»). Для улучшения консистенции стула целесообразно добавлять в пищу отруби. Пищевые ферменты способствуют полноценному перевариванию пищи. Соответствующие количества оливкового или льняного масла можно ежедневно добавлять в пищу до тех пор, пока функция кишечника полностью не нормализуется. Обычная дозировка масла составляет половину чайной ложки на 10–20 фунтов веса животного.

Гомеопатические средства при лечении запора

Alumina

У животных с симптомами *Alumina* запоры обычно трудно поддаются лечению, так как они обусловлены общим ослаблением сократительной способности мышц (отмечается также слабость скелетной мускулатуры и мышц мочевого пузыря). Для таких животных типично полное отсутствие позывов на стул в течение нескольких дней. Когда же позывы наконец возникают, то обычно они сопровождаются выраженным и болезненным мышечным напряжением. Подобное состояние нередко развивается у малоподвижных особей женского пола. Стул *Alumina* обычно сухой, твердый и узловатый; дефекация часто сопровождается кровотечением из прямой кишки. Наряду с мышечной слабостью часто отмечается и слабость умственная,

что проявляется в виде апатии и нарушения памяти.

Bryonia

Склонность к запорам у животных с симптомами данного средства можно частично объяснить основным ключевым симптомом *Bryonia* — ухудшение от движения. Стул *Bryonia* объемный, твердый и сухой, производит впечатление обугленного. Часто встречается чередование запора и диареи. Для животных с симптомами *Bryonia* типична сильная жажда с желанием пить холодную воду часто и помногу (животные *Bryonia* могут пить холодную воду даже из унитаза или водостока. Они сразу же начинают пить из своей миски, как только в нее наливают холодную воду). Такие животные обычно весьма раздражительны.

Calcareo carbonica

Если у животных с симптомами *Bryonia* отмечается ухудшение от движения, то для животных *Calcareo carbonica* типично ухудшение от физических усилий. Таким образом, животные с симптомами *Calcareo* предрасположены к запорам такого типа, при которых наибольший дискомфорт вызывает перистальтика кишечника при дефекации, а не переполненный, но неподвижный кишечник. Для животных *Calcareo carbonica* характерен странный и необычный симптом — при запоре они чувствуют себя гораздо лучше. Животные с симптомами *Calcareo* обычно вялые, с избыточным весом, ширококостные и очень чувствительные к холоду, особенно к холодному воздуху. Стул объемный и твердый, но часто вслед за эвакуацией твердых каловых масс следует эвакуация пастообразной, а затем и жидкой порции стула. В некоторых случаях отмечается беловатый цвет и кислый запах каловых масс — для пациентов *Calcareo* в целом характерен бледный оттенок кожи и кислый запах.

Graphites

Для животных данного типа характерен объемный, узловатый стул, отдельные фрагменты которого соединяются друг с другом клейкой слизью. Дефекация у таких животных весьма болезненна; у них часто отмечаются трещины и надрывы слизистой оболочки прямой кишки. Животные *Graphites* обычно

вялые и инертные; заболевания внутренних органов у них, как правило, сочетаются с заболеваниями кожного покрова. Как и *Calcareo*, это средство обычно назначается особям женского пола, страдающим от избыточной массы тела.

Lycorodium

У животных этого типа часто отмечается чередование запора и диареи; и то и другое состояние обычно сопровождается усиленным образованием газов в кишечнике. Стул при запоре твердый, в небольшом количестве, однако отделяется с большим трудом. Для животных *Lycorodium* типичны запоры во время путешествий и поездок — именно поэтому они испытывают трудности, находясь вне дома.

Natrum muriaticum

Неудивительно, что именно сухость является типичным симптомом *Natrum muriaticum* — ведь это средство готовится из поваренной соли. Для животных данного типа характерна жажда; они легко перегреваются, особенно от воздействия прямых солнечных лучей. Для животных *Natrum muriaticum* типична вялость и бездеятельность кишечника, что и является основной причиной частых запоров. Каловые массы обычно сухие, крошкообразные; нередко запор чередуется с диареей. Несмотря на то, что обычно состояние *Natrum muriaticum* развивается вследствие перенесенного горя, животные данного типа не выносят утешений, реагируя на них вспышками гнева. У них часто отмечается жирная маслянистая шерсть в сочетании с сухими высыпаниями или перхотью на коже.

Nitricum acidum

Основные симптомы запора у сердитых и зябких животных данного типа напоминают симптомы запора у животных *Graphites*. В области заднего прохода у таких животных нередко отмечаются очень сильные боли, которые сохраняются длительное время после дефекации; боль может возникать даже после отхождения мягкого стула. Кроме того, характерно образование трещин в области анального отверстия и в уголках рта. Каловые массы обычно твердые и эвакуируются после сильного и болезненного натуживания. В некоторых случаях отмечается

выпадение прямой кишки; боли в области заднего прохода бывают настолько интенсивными, что мешают животным ходить.

Nux vomica

Как диарея, так и запор у животных данного типа сопровождаются частыми и неэффективными позывами, причем эти позывы настолько типичны, что их отсутствие является противопоказанием к назначению этого средства. В тех случаях, когда запор возникает вследствие чрезмерного употребления аллопатических средств, *Nux vomica* представляет собой первое средство, о назначении которого следует подумать. Животные *Nux* обычно зябкие и раздражительные, однако в периоды хорошего самочувствия они могут быть вполне дружелюбны (в отличие от животных *Nitricum acidum* — те капризны вне зависимости от самочувствия).

Opium

Вялость и сонливость вплоть до ступора — вот главные характеристики состояния *Opium*. Отмечается поражение всех систем организма; основной причиной упорных запоров является нарушение моторной функции кишечника. Запоры у животных данного типа имеют постоянный характер, каловые массы отделяются в виде черных и плотных шариков. Ключевым симптомом данного препарата является отсутствие позывов к дефекации даже при переполненной прямой кишке. В некоторых случаях наблюдается зияние заднего прохода с подтеканием из него темной слизи с примесью крови. У таких животных нередко отмечаются приступы спастических болей в животе. *Opium* является одним из наилучших гомеопатических средств при упорных хронических запорах, которое помогает даже в тех случаях, когда другие методы лечения не дают желаемого эффекта.

К сожалению, в США в настоящее время гомеопатическое средство *Opium* относится к той же категории, что и наркотические вещества, которые готовятся из этого растения. Именно поэтому в гомеопатических аптеках США невозможно приобрести ни *Opium*, ни *Cannabis sativa*, ни *Cannabis indica*. Подобная ситуация представляется более чем странной — ведь известно, что в низких разведениях гомеопатических средств количество ис-

ходного вещества ничтожно мало, а в разведениях выше 120 или 24X содержится лишь информация об исходном веществе при полном отсутствии материальной субстанции.

Plumbum metallicum

Характерным симптомом большинства металлов, в том числе и свинца, является выраженная слабость. Картина симптомов *Plumbum* напоминает картину симптомов *Alumina*; доминирующим признаком является общая мышечная слабость, которая приводит к снижению активности толстого кишечника и прямой кишки и постоянным запорам. Животные с симптомами данного средства, так же как и животные *Opium*, нередко страдают от спастических коликообразных болей в животе. Нарушение моторики кишечника может стать причиной рвоты желчью или содержимым верхних отделов тонкого кишечника, причем рвотные массы в некоторых случаях имеют фекалоидный характер. Часто у животных данного типа запор сопровождается настолько выраженной слабостью, что они с трудом могут ходить.

Sepia

Картина симптомов *Sepia* напоминает картину симптомов *Natrum muriaticum*. Однако в отличие от животных *Natrum muriaticum* животные *Sepia* чрезвычайно зябкие и мерзнут даже в теплом помещении. Как правило, животные этого типа равнодушно относятся к членам семьи и не выносят дисциплины. Запоры у них обычно очень тяжелые; стул объемный, твердый и отходит с трудом. Для облегчения прохождения кишечного содержимого в кишечнике животных этого типа продуцируется большое количество слизи, которая может выделяться как при дефекации вместе с каловыми массами, так и после нее. Следует подумать о назначении *Sepia* при запорах во время беременности.

Silicea (Silica)

Одним из основных симптомов *Silicea* является общая слабость. У зябких худощавых животных данного типа просто не хватает сил для нормальной перистальтики кишечника. В некоторых случаях стул после сильного натуживания частично

выходит из заднего прохода и сразу же ускользает обратно. Для *Silicea* характерны постоянные и безрезультатные позывы к дефекации. *Silicea* представляет собой одно из основных средств при лечении вакциноза — именно поэтому данное средство назначается при упорных запорах, которые возникли после вакцинации. Животные этого типа чрезвычайно чувствительны ко всем внешним воздействиям — и к шуму, и к расчесыванию шерсти, и к принуждению что-либо делать против их воли.

Sulphur iodatum

Картина симптомов данного средства во многом напоминает *Sulphur*, однако животные *Sulphur iodatum* еще более «жаркие» и еще больше любят холодную погоду. Запоры у животных этого типа имеют постоянный характер; у каловых масс часто отмечается ярко-желтый цвет. Животные с симптомами *Sulphur iodatum* часто страдают чрезвычайно сильным анальным зудом — иногда можно наблюдать, как они буквально бросаются ожесточенно вылизывать область заднего прохода.

ВЗДУТИЕ ЖИВОТА (МЕТЕОРИЗМ)

Острое вздутие живота у собак (и гораздо реже у кошек) представляет собой чрезвычайно опасное для жизни состояние. Причиной острого вздутия живота чаще всего является глубокое нарушение процессов пищеварения, вследствие которого в желудке быстро скапливается значительное количество газов. Перерастяжение желудка газами может спровоцировать развитие непроходимости нижних отделов пищевода и заворота желудка вместе с селезенкой. Заворот желудка сопровождается быстрым развитием шока; состояние собаки стремительно ухудшается и смерть может наступить в течение 1–2 часов. Несомненно, что развитие подобного состояния у животных требует неотложной помощи и немедленного обращения в ветеринарную клинику.

Развитие острого вздутия живота у животных сопровождается чрезвычайным беспокойством, возбуждением и безуспешными попытками регургитации. Растяжение передней брюшной стенки легко определяется визуально. Отмечается быстрое

ухудшение состояния с развитием общей слабости, десны у животных приобретают синюшный или сероватый оттенок из-за нарушения микроциркуляции. Подобные симптомы указывают на то, что состояние животного становится критическим.

При развитии *острого вздутия живота* необходимо следующее:

- *требуется немедленное обращение в ветеринарную клинику*, особенно если вздутие живота появилось сразу же после еды и быстро прогрессирует,
- *не следует откладывать обращение в ветеринарную клинику*, даже если вздутие живота у вашего питомца развивается не стремительно, а постепенно и медленно.

Острое вздутие живота

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что при развитии острого вздутия живота *требуются неотложные лечебные мероприятия и немедленное обращение к ветеринару*.

Гомеопатическое лечение может прервать развитие острого вздутия живота, улучшить состояние вашего питомца и тем самым поможет сохранить ему жизнь. Пока вы готовитесь к транспортировке вашего питомца в ветеринарную клинику, дайте ему одно из лекарств, перечисленных в разделе «Гомеопатические средства при вздутии живота». Если вы застали буквально первые минуты развития острого вздутия живота, то попробуйте вывести вашего питомца на короткую прогулку — в некоторых случаях вздутие живота может прекратиться.

Замедленное развитие вздутия живота

В некоторых случаях отмечается замедленное развитие вздутия живота, причем общее состояние у собак (и очень редко у кошек) может варьировать от удовлетворительного до крайне тяжелого с непосредственной угрозой для жизни. При замедленном развитии вздутия живота я также настоятельно рекомендую безотлагательное обращение к ветеринару, так как состояние вашего питомца может ухудшиться очень быстро. Назначение одного из гомеопатических средств может облегчить состояние (но не заменит обращение в ветеринарную клинику).

Чаще всего пусковым механизмом вздутия живота у животных является неправильное питание. По мнению некоторых исследователей, провоцирующим фактором развития подобного состояния является употребление в пищу готовых сухих кормов на основе соевых бобов, однако эту точку зрения разделяют далеко не все ветеринары. По моему мнению, в данном случае важное значение имеет индивидуальная чувствительность животных к отдельным видам пищи. Такие виды пищи, как, например, соевые бобы, совершенно неестественны для хищников — возможно, именно поэтому у некоторых особей и развивается крайне тяжелое, угрожающее жизни вздутие живота. Естественным питанием хищников является свежее мясо, что необходимо учитывать при составлении пищевого рациона вашего питомца. При постепенном изменении питания и переходе на кормление естественными продуктами целесообразно в течение нескольких месяцев назначать вашему питомцу ферментные препараты.

Гомеопатические средства при вздутии живота

Учитывая, что при развитии острого вздутия живота состояние животных ухудшается стремительно и вам требуется очень быстро принять соответствующее решение, я пометил двумя звездочками гомеопатические средства выбора в данной ситуации и одной звездочкой — несколько менее эффективные средства. Без пометки остались те средства, которые в данной ситуации могут и не оказать желаемого действия. Конечно, такое деление весьма условно — при выборе подобного гомеопатического препарата вам следует учитывать индивидуальные особенности вашего питомца.

*** *Argentum nitricum***

Животные этого типа более склонны к хроническим формам вздутия живота. Они обожают сахар, сладости и очень пугливы. Для них характерны отрыжка и обилие газов. Ротовая полость обычно переполнена слизью, часто отмечается рвота с большим количеством слизи. Область желудка и живот часто очень болезненны.

**** *Belladonna***

Состояние *Belladonna* характеризуется внезапным началом, жаром и покраснением. Животные с симптомами данного средства чрезвычайно беспокойны и возбуждены; пасть горячая, синюшно-красная, сухая. Отмечаются расширение зрачков и блеск глаз. Для *Belladonna* характерно усиление болей в положении лежа, поэтому собаки с симптомами этого препарата предпочитают оставаться в положении стоя. Кроме того, для животных с симптомами этого средства характерно выраженное сердцебиение. Нетрудно догадаться, что *Belladonna* представляет собой гомеопатическое лекарство для лечения острых состояний.

**** *Carbo vegetabilis***

Именно это гомеопатическое средство я всегда беру с собой, когда меня вызывают к животным со вздутием живота. *Carbo vegetabilis* полезен в большинстве случаев острого и хронического нарушения пищеварения в сочетании со значительным образованием кишечных газов. Типичными симптомами данного препарата являются общая слабость, снижение температуры тела и цианоз. Коллаптоидное состояние у животных обычно сочетается с выраженным желанием свежего воздуха несмотря на зябкость. Если на фоне общей слабости или коллапса вы отмечаете синюшность и похолодание десен у собаки, то сразу же начинайте давать ей *Carbo vegetabilis* через каждые несколько минут.

*** *Colchicum***

Ключевыми симптомами данного средства являются выраженная тошнота и сильные боли в области живота. Боль уменьшается при сгибании туловища. В некоторых случаях один только запах пищи может спровоцировать рвотные движения. У животных с симптомами *Colchicum* часто отмечаются выделения из анального отверстия слизистого или желеобразного характера. Характерным симптомом является сильная жажда.

Eucaliptus

Характерным симптомом данного средства являются выделения, так как ароматические смолы, содержащиеся в листьях

эвкалипта, вызывают раздражение слизистых оболочек. Симптомы растяжения желудка могут сопровождаться слизистыми выделениями из носа, анального отверстия или отделением мокроты. Кроме того, отмечается выраженный метеоризм и отрыжка зловонным газом. Для животных с симптомами данного средства, так же как и для животных *Carbo vegetabilis*, характерно нарушение процесса пищеварения.

Lycorodium clavatum

Для животных с симптомами *Lycorodium* (как и для животных *Eucaliptus* и *Carbo vegetabilis*) также характерно нарушение пищеварения и скопление в толстом кишечнике обильного количества газов. Животные этого типа отличаются повышенным аппетитом, что часто приводит к перееданию и растяжению желудка с ощущением дискомфорта. Показанием для назначения *Lycorodium* является замедленное (а не острое!) развитие вздутия живота. Нарушения пищеварения у животных данного типа часто сочетаются с заболеваниями мочевыводящей системы.

* *Magnesium phosphoricum*

Для состояния *Magnesium phosphoricum* характерны спастические коликообразные боли в области живота. Боли могут быть настолько сильные, что животные поскуливают и повизгивают. Вздутие живота и боли часто сочетаются со спастическими сокращениями и подергиванием мышц, а также с ригидностью конечностей. Симптомы данного средства часто возникают в периоде прорезывания зубов, поэтому при коликообразных болях у щенков и котят следует подумать о назначении *Magnesium phosphoricum*.

Nux moshata

О назначении данного средства следует подумать при выраженной сонливости и спутанности сознания вашего питомца в сочетании с отсутствием жажды. В назначении данного лекарства чаще нуждаются особи женского пола. Симптомы *Nux moshata* в некоторых случаях возникают во время беременности. Для животных с симптомами этого препарата характерно образование значительного количества кишечных газов неза-

висимо от состава съеденной пищи.

**** *Nux vomica***

Который раз мы убеждаемся в несомненной пользе этого замечательного гомеопатического средства! Характерным симптомом *Nux vomica* является склонность к вздутию живота при различных заболеваниях пищеварительной системы. Однако необычным симптомом является возникновение вздутия живота через какое-то время после еды, иногда спустя несколько часов. Рвотные движения, так же как и натуживание при дефекации, часто бывают неэффективными; рвотные массы выделяются со значительным трудом, после многократных безрезультатных позывов, однако после этого отмечается облегчение состояния. Животные с симптомами данного препарата обычно зябкие и раздражительные.

Система дыхания, нос и синусы



Воздух, которым мы дышим

Функции

Чиханье и выделения из носа

Носовое кровотечение

Кашель

Заболевания легких

ВОЗДУХ, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ

Чистый свежий воздух питает легкие и очищает душу – подобно тому как полноценное питание обеспечивает жизненной энергией тело (не случайно слова «душа» и «дыхание» происходят во всех языках от одного корня). Однако в настоящее время чистый свежий воздух надо еще поискать. Львиную долю всех загрязнений атмосферы составляют отходы промышленных предприятий – к сожалению, мы не в силах в достаточной степени повлиять на этот процесс. Однако каждый человек может сделать свой, пусть небольшой вклад в дело защиты окружающей среды – для этого достаточно всего лишь хорошо обдумывать свои действия. Загрязнение атмосферы существенно уменьшится, если, например, каждый человек будет совершать поездки на автомобиле только тогда, когда это действительно необходимо, по возможности чаще пользуясь городским транспортом. Или, например, мы можем поддерживать только те партии и тех членов правительства, для которых основной ценностью является качество жизни каждого члена общества, а не потребление и накопление. В конечном итоге все наши действия зависят от того, что же мы считаем основными приоритетами своей жизни.

Наиболее очевидным фактором загрязнения атмосферы собственного дома, безусловно, считается табачный дым. Конечно, человек сам волен выбирать, что и где он будет курить; однако, если в одном доме с вами проживают другие люди или животные, то курить следует по возможности вне дома. Мне неоднократно приходилось наблюдать, как заболевания дыхательных путей у животных или полностью купировались, или облегчались в тех случаях, когда в семье предпринимались определенные действия по улучшению качества воздуха внутри дома. В некоторых случаях заболевания дыхательных путей и у человека, и у животных может спровоцировать дым ладана. В традиционной китайской медицине заболевания легких связываются с перенесенным горем, а курение часто рассматривается как попытка организма заполнить пустоту и преодолеть чувство потери и одиночества. Но, возможно, причина курения у большинства людей не имеет настолько глубокого характера, не так ли?

Источником загрязнения воздуха внутри дома кроме курения могут быть также испарения красок, отделочных материалов, линолеума, синтетических ковровых покрытий, обилие предметов из пластика и частое применение различных видов бытовой химии. Это всего лишь часть огромного списка веществ, которые «проживают» в наших домах и выделяют в атмосферу массу токсических субстанций. Неудивительно, что все чаще и чаще у человека и животных встречаются болезни, прямо связанные с загрязнением воздуха внутри помещений. В настоящее время наметилась тенденция строительства офисных зданий с явно недостаточной вентиляцией якобы с целью сокращения энергетических затрат. Конечно, сокращение затрат энергии — похвальная задача, однако она не должна решаться ценой здоровья тысяч людей. Наилучшим решением является, безусловно, использование при строительстве зданий только натуральных материалов, что позволит значительно улучшить качество воздуха внутри помещений.

Как можно чаще открывайте окна, проветривайте свой дом! Почаще бывайте на свежем воздухе, сократите время работы бытовых кондиционеров и не забывайте менять в них фильтры. Высококачественные фильтры многократного использования не только лучше очищают воздух по сравнению с одноразовыми, но и сохраняют и окружающую атмосферу, и ваши деньги.

ФУНКЦИИ

Система дыхания, как и система пищеварения, обеспечивает взаимодействие организма с внешней средой. За счет процессов пищеварения организм получает необходимые питательные вещества, а за счет системы дыхания происходит газообмен между организмом и внешней средой. Особое строение тончайших легочных альвеолярных мембран позволяет кислороду свободно проникать в кровь, а углекислому газу и другим ненужным газообразным субстанциям выделяться из крови в окружающую среду (углекислый газ мы лишь условно можем назвать «ненужным» — экосистема нашей планеты устроена таким удивительным образом, что углекислый газ утилизируют растения в процессе дыхания). Фактически дыхание явля-

ется общей функцией всех представителей животного и растительного мира. Газообмен между организмом и внешней средой происходит в альвеолах и обеспечивается за счет воздухоносных путей, которые представляют собой нечто вроде буфера между тончайшей легочной тканью и внешней средой.

В составе воздухоносных путей различаются несколько отделов — полость носа, синусы, полость глотки, гортань и трахея; при вдохе в дыхательных путях происходит согревание, увлажнение и фильтрация воздуха. Таким образом, в легочные альвеолы поступает очищенный и согретый воздух. При выдохе в дыхательных путях происходит охлаждение воздуха; кроме того, для сбережения ресурсов организма из выдыхаемого воздуха абсорбируется некоторое количество жидкости, что обеспечивает более рациональный водно-электролитный баланс организма. Вместе с выдыхаемым воздухом во внешнюю среду выделяются также мельчайшие частицы пыли, которые проникли в организм при вдохе.

По системе бронхов — так называемое «бронхиальное дерево» — воздух распределяется по всем отделам легких, в конечном итоге доходя до каждой альвеолы. Именно в легочных альвеолах происходит процесс обмена газообразными субстанциями между внешней средой и организмом. Легочные альвеолы представляют собой особые тончайшие мембраны шаровидной формы, заполненные воздухом; мембраны альвеол соприкасаются со стенками многочисленных капилляров, по которым протекает кровь. Газообразные субстанции легко проникают через эти мембраны, причем направление диффузии газов определяется их концентрацией — из воздуха альвеол кислород проникает в кровоток, а углекислый газ из кровотока поступает в воздух, содержащийся в альвеолах.

Многие симптомы со стороны системы дыхания, которые наблюдаются у животных, на самом деле не являются истинными симптомами болезни, а представляют собой определенные действия организма по поддержанию проходимости и буферной функции воздухоносных путей. Например, слизь, которая продуцируется в полости носа, предназначена для связывания мельчайших частиц пыли и других инородных тел, попавших в воздухоносные пути. За счет движения ресничек цилиарного эпителия, покрывающего изнутри дыхательные пути, а также

за счет чиханья и фыркания усиливается эвакуация слизи наружу. Из глубоких отделов дыхательных путей мельчайшие инородные тела, в том числе и микроорганизмы, удаляются при помощи кашлевых толчков. При наличии слизи возникает влажный кашель; если же продукция слизи по какой-либо причине ограничивается, то возникает сухой кашель.

Следующий уровень защиты от проникновения в дыхательные пути частиц инородных тел и микроорганизмов обеспечивается за счет воспалительного процесса стенок бронхов и бронхиол. В результате воспаления эластичные стенки бронхов и бронхиол уплотняются, что создает менее проницаемый защитный барьер, однако значительное уплотнение приводит к нарушению функции этих отделов. Подобным образом уплотнение стенок альвеол до определенного момента играет защитную роль, однако чрезмерное уплотнение нарушает их основную функцию по обмену кислорода и углекислого газа.

Таким образом, если рассматривать симптомы как защитную реакцию организма, а не как пагубное влияние болезни, то наше представление о сущности заболевания значительно меняется. Меняется также и основная задача лечения — мы должны помочь организму устранить причину появления симптомов, а не просто подавить эти симптомы. В качестве примера можно рассмотреть применение аллопатических препаратов «от простуды» у людей. Эти препараты уменьшают продукцию слизи и подавляют кашель. Конечно, ощущение дискомфорта у пациента на какое-то время значительно уменьшается, однако в той же степени нарушается способность организма к эффективной самостоятельной санации верхних дыхательных путей. Таким образом, за временное облегчение состояния пациент расплачивается подавлением защитной функции иммунной системы.

В подобной ситуации гомеопатические средства оказывают совершенно иное воздействие. Гомеопатические препараты стимулируют функцию иммунной системы по устранению причины заболевания, но не подавляют симптомы, которые отражают попытки организма справиться с заболеванием — т. е. не происходит подавления кашля и выделений из носовых ходов. В некоторых случаях при назначении гомеопатических средств выделения из носа на какое-то время могут даже усилиться. В

других случаях, однако, кашель и выделения из носовых ходов удивительным образом прекращаются. Таким образом, гомеопатические лекарства изменяют восприимчивость организма к болезни, что позволяет иммунной системе собственными силами устранить причину появления симптомов.

ЧИХАНЬЕ И ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НОСА

Как мы уже отметили, чиханье и выделения из носа представляют собой те способы, с помощью которых организм стремится удалить из дыхательных путей бактерии и мелкие чужеродные тела. Важно не подавлять искусственно эти симптомы, а всеми способами укреплять защитные силы организма для того, чтобы он самостоятельно справился с заболеваниями дыхательных путей.

Особенности наблюдения и лечения при чиханье и выделениях из носа

При чиханье и выделениях из носа прежде всего *необходимо оценить тяжесть состояния животных, ответив на ряд вопросов:*

- Это отдельный случай заболевания или подобные симптомы возникают часто?
- Какой вид имеют выделения из носа? Какого они цвета, густые или жидкие, нет ли примеси крови?
- Нет ли у выделений из носа зловонного запаха?
- Как часто отмечаются выделения? Имеют ли они постоянный характер или возникают периодически?
- Не отмечается ли при выделениях из носа нарушений дыхания?
- Не раздражают ли выделения кожу вокруг носа, не отмечается ли покраснения носа?
- Нет ли слабости и вялости?
- Не наблюдается ли приступов мучительного длительного чиханья?

В следующих случаях необходимо немедленное обращение в ветеринарную лечебницу:

- когда у животных отмечается выраженная слабость,
- если приступы чиханья отмечаются более 2–4 раз в день или в течение более трех дней,
- если чиханье мучительное,
- если отмечается выделение крови (более нескольких капель) или выделения из носа имеют зловонный запах,
- если из-за выделений отмечается затрудненное дыхание.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару:

- если выделения из носа отмечаются в течение недели или более,
- если после самостоятельного применения гомеопатических средств состояние не улучшается,
- если вы заметили, что выделения из носа имеют раздражающий характер.

Постарайтесь определить, *какие обстоятельства и условия способствуют возникновению приступов чиханья и выделениям из носа:*

- пища или питье воды,
- запах пищи, дым сигарет и т. п.,
- время суток,
- стресс или тревожность,
- нет ли подобных симптомов у других животных в доме — другими словами, не может ли это заболевание быть инфекционным?

Острый приступ чиханья и выделений из носа

Причиной внезапного и сильного приступа чиханья у животных может быть инородное тело в одном из носовых ходов. Некоторые из инородных тел весьма безобидны — например, пушинки или соринки; как правило, с такими инородными телами организм справляется самостоятельно. Однако при попадании в носовые ходы колючек лисохвоста последствия могут быть достаточно серьезные. Трава лисохвост произрастает в основном в западных штатах США; семена лисохвоста снабжены колючими шипами, которые запутываются в шерсти животных и могут затем внедриться в кожу, носовые ходы, в полость наружного уха, в область век и между пальцами. Если

колючки лисохвоста вовремя не удалить, то на месте их внедрения у животных развиваются очень болезненные абсцессы. Иногда колючки лисохвоста приходится удалять, применяя анестезию.

У кошек инородные тела в носовых ходах встречаются достаточно редко и удалить их несложно; мне приходилось удалять стебельки травы, мелкий сор и даже личинки насекомых.

При наличии инородных тел у животных полезно назначение *Silicea* и *Myristica*. Однако при попадании под кожу колючек лисохвоста не следует затягивать обращение к ветеринару.

Другими причинами интенсивного приступа чиханья и выделений из носовых ходов могут быть инфекции верхних дыхательных путей и загрязнение воздуха. Несмотря на то, что назначение гомеопатических средств в основном базируется на анализе симптомов, причину заболевания в каждом конкретном случае все же желательно выяснить; знание причины позволяет определить тяжесть заболевания и его прогноз, а также часто предупредить его дальнейшее развитие.

Назначение таких антиоксидантов, как *витамины С и Е*, уменьшает интенсивность воспалительной реакции и укрепляет иммунную систему организма. При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей у животных следует применять умеренные дозы *витамина С* (10 мг/фунт веса животного 2–3 раза в день) и *витамина Е* (5 мг/фунт веса 1 раз в день). При раздражении кожи вокруг ноздрей за счет выделений можно местно применять *витамин Е*, мазь *Calendula* или алоэ. При ухудшении состояния вашего питомца для укрепления его иммунной системы можно применять настой эхинацеи, астрагала, кошачьего когтя или *DMG*. Лучше всего эти фитопрепараты назначать на короткое время, например на одну-две недели, однако *DMG* можно применять и дольше.

Хроническое чиханье и выделения из носа

При наличии у вашего питомца хронического чиханья или выделений из носа необходимо провести диагностическое обследование и выяснить причину этого явления. Особенно важно обследовать животных при односторонних симптомах, так как причиной их возникновения может быть абсцесс или кариес корня клыка, микотическая инфекция, опухоль и т. п. Для

уточнения диагноза в некоторых случаях требуется рентгенографическое исследование. Ветеринары часто рекомендуют исследование микрофлоры выделений, однако значительной пользы от этого исследования обычно не бывает, т. к. большинство хронических заболеваний не имеет инфекционной природы.

При хронических выделениях из носа для укрепления иммунной системы целесообразно назначение витаминов-антиоксидантов и фитопрепаратов (см. раздел «Острый приступ чиханья и выделений из носа»); постарайтесь, чтобы ваш питомец получал свежую сбалансированную и высококалорийную пищу домашнего приготовления. Если вслед за назначением соответствующих гомеопатических средств не наступит быстрого улучшения состояния, то следует проконсультироваться с ветеринаром-гомеопатом.

Гомеопатические средства при чиханье и выделениях из носа

Allium sera

Это средство готовится из красного лука; соответственно симптомы *Allium sera* у животных легко предсказать и увидеть – водянистые выделения из носа, слезотечение, покраснение глаз и частое чиханье. Обычно симптомы более выражены с левой стороны. Интересно, что выделения из носа раздражают кожу вокруг ноздрей и над верхней губой, однако выделения из глаз не имеют раздражающего характера. Состояние *Allium sera* обычно возникает при холодной сырой погоде и чаще весной, однако в теплом помещении состояние животных ухудшается.

Arsenicum album

Сфера воздействия этого поистине замечательного гомеопатического средства охватывает дыхательные пути на всем их протяжении. Для *Arsenicum* характерны водянистые, но жгучие выделения, раздражающие кожу и слизистые оболочки. Отмечается выраженная болезненность при прикосновении к ноздрям. Выделения из носа начинаются обычно с правого носового хода; преимущественно правостороннее поражение сохраняется в течение всей болезни.

Животные с симптомами этого средства обычно беспокойные, зябкие, робкие и боязливые, у них выражена жажда. При выделениях из носа у животных *Arsenicum* необходим ежедневный дополнительный уход, так как сами животные обычно с этим не справляются.

Calcarea sulphurica

Основным симптомом данного средства являются густые комковатые выделения желтого цвета. Подобные выделения вообще характерны для *Calcarea sulphurica*, но чаще всего они наблюдаются именно из носа и глаз. Воспаление конъюнктивы глаз с характерными для *Calcarea sulphurica* симптомами может наблюдаться у новорожденных и маленьких котят; таким образом, это средство можно успешно назначать при риновирусной и калицивирусной инфекции у котят и на ранних стадиях чумы у собак. Отмечается преимущественно правостороннее поражение, в выделениях из носа может быть примесь крови. На языке (чаще у корня языка) иногда наблюдается налет желтоватого цвета.

Подобно животным *Allium sera*, у животных *Calcarea sulphurica* заболевание чаще всего возникает в холодную сырую погоду, однако в теплом помещении отмечается ухудшение.

Hepar sulphuris calcareum

Состояние *Hepar sulphuris calcareum* чаще встречается на поздних стадиях инфекционных заболеваний дыхательных путей. Характерна болезненность и изъязвление ноздрей, а также зловонный запах выделений из носа, напоминающий запах старого сыра. В выделениях часто встречается примесь крови. Характерным симптомом также является болезненность при прикосновении к области воспаления. Животные с симптомами данного средства склонны к раздражительности, поэтому при прикосновении к воспаленным участкам они вполне могут укусить или поцарапать.

Ухудшение состояния у этих зябких животных отмечается от воздействия холодного воздуха и сквозняка, а также зимой и по ночам.

Hydrastis

Для животных *Hydrastis* характерны густые выделения из носа желтого цвета, напоминающие выделения у *Calcareo sulphurica*, однако в отличие от *Calcareo sulphurica* они вязкие и тягучие, а не комковатые. Животные с симптомами этого средства обычно слабые, вялые и даже истощенные. Выделения из носа чаще всего едкие, чрезвычайно липкие и тягучие — животные обычно не справляются с ними самостоятельно, поэтому они скапливаются в хоанах и даже в синусах. Именно поэтому назначение *Hydrastis* у кошек с явлениями синусита бывает весьма эффективным. Синуситы обычно сопровождаются головной болью, из-за которой у животных часто развивается вялость и некоторая заторможенность.

Состояние животных *Hydrastis* ухудшается при пребывании на холодном воздухе; от воздействия холода выделения из носа могут стать профузными.

Kali bichromicum

Ключевым симптомом данного средства является образование плотных корочек в области ноздрей, при удалении которых образуются кровоточащие поверхностные раны. Выделения из носовых ходов обычно густые, желто-зеленоватого цвета, в некоторых случаях выделения через задние носовые ходы проникают в полость глотки, вследствие чего дыхание через нос становится затрудненным или даже невозможным. Обструкция носовых ходов часто является причиной возникновения приступов сильного чиханья.

Воспалительные явления полости носа часто сочетаются с болезненностью и воспалением глотки, при этом слизистая оболочка глотки приобретает ярко-красный цвет и глотание затрудняется. Ухудшение состояния животных *Kali bichromicum* отмечается утром и в холодную сырую погоду.

Kali sulphuricum

У животных с симптомами этого средства, как и у животных у *Calcareo sulphurica*, отмечаются обильные выделения из носа желтого цвета. Однако в отличие от *Calcareo sulphurica* на ранних стадиях болезни выделения имеют водянистый характер, но с течением болезни становятся густыми и приобретают зеле-

новатый оттенок. Подобно *Calcareo sulphurica* язык у этих животных также покрыт у основания желтым налетом.

Ухудшение состояния животных *Kali sulphuricum* наблюдается вечером и в теплых помещениях, а улучшение — при прогулке на холодном воздухе. Назначение этого средства целесообразно сразу после *Pulsatilla* в тех случаях, когда прием *Pulsatilla* не привел к полному излечению.

Mercurius (vivus, solubilis)

Симптомы *Mercurius* напоминают симптомы *Hepar sulphuris*, однако выражены сильнее и имеют деструктивный характер. Воспалительные явления глубокие и сопровождаются интенсивной гиперемией, изъязвлением слизистых оболочек и кровотечением; выделения имеют разъедающий характер, зловонный запах, напоминающий запах старого сыра, и зеленоватый цвет.

У этих животных также наблюдается выраженная раздражительность, однако в отличие от животных *Hepar sulphuris* ухудшение у них отмечается в тепле и при солнечном свете (солнечные лучи провоцируют приступы чиханья).

Pulsatilla

Назначение данного препарата показано при густых, но не раздражающих выделениях из носа желтого или желто-зеленого цвета. Часто отмечается обструкция носовых ходов и склеивание век. Во многих случаях назначение *Pulsatilla* эффективно на конечной стадии болезни, когда воспаление уже разрешилось, однако выделения еще сохраняются — другими словами, когда воспалительный процесс не проявил в полной мере свои защитные свойства и организму для полного излечения требуется определенная помощь.

В классических случаях животные *Pulsatilla* очень ласковые и привязчивые, требуют постоянного внимания (иногда их требования бывают весьма настойчивы) и заботы; у них не выражена жажда, им не нравятся жаркие и душные помещения. Симптомы обычно улучшаются на свежем воздухе и ухудшаются в помещении. Как правило, отмечается преимущественно правостороннее поражение.

Sepia

Несмотря на характерные для *Sepia* густые выделения из носа зеленоватого цвета, эти животные не имеют ничего общего с животными *Pulsatilla*. В целом психическое состояние животных *Sepia* характеризуется безразличием к окружающим и печалью. Кроме того, эти животные обычно очень зябкие и буквально льнут к источнику тепла. Чаще всего отмечается левостороннее поражение.

Silicea (Silica)

Для данного средства наиболее характерным симптомом является сниженная реактивность организма, недостаточность иммунного ответа и слабость; именно поэтому организм *Silicea* не может справиться с болезнью. У животных *Silicea* замедлены процессы удаления выделений из носа и элиминации инфекции в целом, включая инфекцию при колотых ранах и абсцессах. В анамнезе у животных *Silicea* отмечаются многочисленные инфекционно-воспалительные процессы, следующие один за другим, заболевания кожи, разрушение зубов, заболевания десен, а также общая вялость и слабость.

К другим характерным симптомам данного средства относятся зябкость, худоба, чувствительность к прикосновению и шуму; в анамнезе обычно встречаются указания на многочисленные вакцинации.

Sulphur

Выделения из носа у животных *Sulphur* (как и большинство выделений у этого средства) профузные, водянистые и раздражающие, иногда с желтоватым оттенком. Жгучее раздражение носа провоцирует приступы чиханья, при этом собаки постоянно потирают нос и глаза лапой. Ключевым симптомом *Sulphur* является покраснение — соответственно у животных *Sulphur* развивается покраснение и образование корочек в области ноздрей, покраснение глаз, ануса и т. п.

Характерным симптомом у этих животных является плохой аппетит и жажда. Ухудшение состояния обычно отмечается в утренние часы. У животных (как и у людей) *Sulphur* типичной чертой является неопрятность и нежелание заботиться о своей внешности, поэтому собаки *Sulphur* обычно выглядят нечеса-

ными, грязными и неухоженными.

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Причиной носового кровотечения, не связанного с заболеваниями верхних дыхательных путей, обычно является нарушение свертывающей системы крови. В этих случаях для выявления причины необходимо тщательное обследование животных. Носовое кровотечение может также возникать при заболеваниях носа вследствие раздражения слизистой оболочки носовых ходов. Гомеопатическое лечение носовых кровотечений показано в тех случаях, когда они не имеют профузного характера и возникают лишь изредка. При профузном кровотечении, при сочетании носового кровотечения с кровотечением иной локализации и при явных признаках анемии у животных (вялость, бледность слизистой оболочки десен) необходимо экстренное обращение в ветеринарную лечебницу. При надавливании на нос и наложении холодных компрессов кровотечение обычно или уменьшается, или прекращается.

Для остановки кровотечения (независимо от его причины) можно применять весьма эффективный китайский фитопрепарат *Yunnan raiyao*. При носовом кровотечении у собак весом более 25 фунтов рекомендуется назначить 1–2 капсулы *Yunnan raiyao* (в зависимости от интенсивности кровотечения). Кошкам и собакам весом менее 25 фунтов назначается обычно четверть или половина капсулы. При необходимости дозу фитопрепарата можно повторить 2–4 раза в день. В экстренных ситуациях при интенсивном кровотечении животным можно назначить капсулы из специального набора «*safety pill*». Не следует применять этот фитопрепарат в течение длительного времени.

Гомеопатические средства при носовом кровотечении

Arnica montana

Основным показанием для назначения *Arnica* являются кровотечения посттравматического характера (чаще всего при ушибленных ранах), а также кровотечения при развитии трав-

матического шока, причем травма не обязательно связана именно с повреждением области носа. У животных *Arnica* болезненность в области повреждения выражена значительно сильнее, чем можно было бы предположить, судя по характеру травмы. Характерным симптомом является панический страх прикосновений.

Ferrum phosphoricum

Показанием к назначению *Ferrum phosphoricum* является кровотечение в сочетании с лихорадкой. Излившаяся кровь имеет ярко-красный цвет. Животные с симптомами данного средства обычно изящного телосложения, часто отмечается бледная окраска десен. См. также раздел «Гомеопатические средства при кашле».

Hamamelis

Данное средство показано при длительном кровотечении на фоне воспаления слизистой оболочки носа. Отмечается темный цвет излившейся крови и зловонный запах.

Millefolium

Для данного средства характерен ярко-красный цвет крови. Кровотечение обычно возникает после выраженного физического напряжения.

Phosphorus

Данное средство показано при ярко-красном цвете излившейся крови (как у *Ferrum phosphoricum* и *Millefolium*). Животные с симптомами данного препарата обычно изящные, грациозные, подвижные и дружелюбные. Характерной особенностью является склонность к возникновению рвоты, особенно после торопливой еды или питья. Однако рвота не ухудшает их состояния; вскоре после рвоты они опять приступают к еде и возвращаются к прежнему образу жизни. См. также раздел «Гомеопатические средства при кашле».

КАШЕЛЬ

Кашель, как и чиханье, представляет собой реакцию организма в ответ на попадание в дыхательные пути инородных субстанций и микроорганизмов, при этом насильственное толчкообразное изгнание воздуха способствует механическому очищению дыхательного тракта. В носовой полости, в трахее и бронхах продуцируется слизь, предназначенная для связывания частиц инородных тел и бактерий; эти свойства слизи не позволяют инородным частицам проникать в глубокие отделы дыхательных путей. При наличии слизи развивается влажный кашель, за счет которого слизь и связанные ею частицы эвакуируются во внешнюю среду. Кроме того, влажный кашель характерен для ряда заболеваний, при которых нарушается кровообращение в легких. Застой крови в легких является причиной просачивания плазмы в альвеолы и в конечные отделы дыхательных путей. При кашлевых движениях эта жидкость частично удаляется, что позволяет воздуху проникать в альвеолы для газообмена.

Выбор подобного гомеопатического средства при кашле обычно не зависит от его причины; тем не менее причину кашля следует непременно выяснить. Именно от его причины будет зависеть необходимое дополнительное лечение, определение тяжести заболевания и его прогноза.

Особенности наблюдения и лечения кашля у животных

При развитии кашля прежде всего *постарайтесь определить тяжесть состояния вашего питомца, ответив на следующие вопросы:*

- Это отдельный приступ кашля или подобные приступы повторяются регулярно?
- Как долго длится приступ кашля?
- Кашель влажный или сухой?
- Выделяется ли при кашле слизь, гной? Нет ли примеси крови?
- Нет ли затруднений дыхания вследствие кашля?
- Какой окраски десны у вашего питомца? Физиологической розовой или синюшные, темные или с землистым оттенком?
- Нет ли вялости и слабости?

В следующих случаях *требуется немедленное обращение в ветеринарную лечебницу*:

- если на фоне кашля развивается затруднение дыхания,
- если изменяется окраска десен (в норме цвет десен у животных такой же, как у человека. Если у вашего питомца десны пигментированы, то следует определить окраску внутренней поверхности век или слизистой оболочки влагалища у особей женского пола),
- если развивается выраженная слабость.

Экстренное обращение в ветеринарную лечебницу необходимо в следующих случаях:

- если наблюдается вялость и слабость,
- если кашель влажный с отхаркиванием мокроты,
- если кашель достаточно сильный или приступы кашля продолжаются дольше нескольких минут подряд,
- если приступы кашля постепенно становятся все тяжелее.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару, если кашель продолжается в течение нескольких дней (чем тяжелее приступы кашля, тем раньше следует обратиться к ветеринару).

Постарайтесь *определить обстоятельства, которые способствуют возникновению приступов кашля или изменяют их характер*:

- загрязненный воздух,
- сырость,
- когда выходит на холодный воздух,
- когда входит в теплое помещение,
- питье воды,
- положение лежа.
- В какое время суток обычно возникают приступы кашля?
- Не отмечается ли признаков заболевания у других животных в доме?

Острый приступ кашля

Если состояние вашего питомца остается удовлетворительным и сохраняется обычная активность, то назначьте ему *витамины С* (5–10 мг/фунт веса животных 2–3 раза в день) и *ви-*

тамин Е (3–5 мг/фунт веса 1 раз в день). Если в течение одного-двух дней кашель не проходит самостоятельно, то следует назначить одно из гомеопатических средств из раздела «Гомеопатические средства при кашле».

Хронический или сильный кашель

При развитии более тяжелых состояний я настоятельно рекомендую вам обращаться к ветеринару-гомеопату. Существенное значение имеет также наблюдение ветеринара, так как при некоторых заболеваниях дыхательных путей может развиваться состояние с непосредственной угрозой для жизни вашего питомца. Необходимо также провести обследование для уточнения диагноза. Если у вас нет возможности проконсультироваться с ветеринаром-гомеопатом, то в дополнение к лечению традиционными лекарствами можно назначить одно из гомеопатических лекарств из раздела «Гомеопатические средства при кашле»; однако интерпретация результатов назначения гомеопатии на фоне приема аллопатических препаратов может быть достаточно сложной. Полезны также некоторые фитопрепараты, однако их следует применять только в тех случаях, когда известна причина сильного кашля. При инфекциях дыхательных путей обычно назначается настой эхинацеи или кошачьего когтя; при кашле, связанном с заболеваниями сердца, назначается настойка боярышника. Гинкго, настой крапивы и ферменты бромелайн и кверцитин (*Bromelain/Quercetin*) полезны при астматическом кашле. Наилучшую помощь в лечении вашего питомца вам могут оказать ветеринары, применяющие холистические методы лечения.

Гомеопатические средства при кашле

Aconitum napellus

Показанием для назначения *Aconitum* является сухой внезапный кашель, возникающий после переохлаждения, особенно после пребывания на холодном ветре. У животных с симптомами этого средства отмечается лихорадка и желание холодной воды; обычно они встревоженные и боязливые. При соответствии симптомов данное средство эффективно при трахеобронхите у собак (*Kenel cough*). Наиболее эффективно назна-

чение *Aconitum* на ранних стадиях заболевания.

Antimonium tartaricum

Назначение данного средства показано при крайне тяжелых поражениях дыхательных путей с обилием трудно отходящей мокроты и влажным грохочущим кашлем. У животных с симптомами *Antimonium tartaricum* отмечается сильная слабость, нарушения дыхания и вследствие этого заторможенность и дрожание. Им легче дышать в положении сидя; часто вслед за приступом кашля начинается рвота. Подобное состояние может сопровождаться ознобом и подавленностью. О назначении *Antimonium tartaricum* следует подумать при чуме у собак.

Arsenicum album

Назначение *Arsenicum* полезно при астме — основной причине кашля у кошек; однако для достижения длительного улучшения иногда требуется назначение и других средств. У животных *Arsenicum*, как правило, наблюдается классическая триада симптомов (беспокойство, жажда и озноб) в сочетании с ухудшением по ночам. Чаще всего у них отмечается сухой кашель, однако иногда он чередуется с влажным. Приступы кашля могут возникать после питья воды.

Belladonna

Состояние *Belladonna* обычно возникает внезапно и сопровождается выраженным возбуждением, иногда даже с элементами агрессии, и расширением зрачков при ухудшении симптомов. Отмечается сухой кашель в сочетании с лихорадкой, ознобом и потливостью (для определения потливости у кошек и собак надо осмотреть подушечки на лапах). Кашель нередко провоцируется даже легкими движениями и может начаться при спазмах. Данное средство показано при трахеобронхите у собак. У некоторых животных типа *Belladonna* отмечается желание холодной воды, однако у других жажды может и не быть вообще.

Bryonia alba

Кашель *Bryonia* напоминает кашель *Belladonna*: приступы сухого кашля возникают при малейшем движении и сопровож-

даются лихорадкой и сильной жаждой. Однако начало заболевания у животных *Bryonia* постепенное, и жажда у *Bryonia* выражена, возможно, сильнее, чем у всех остальных средств. У животных *Bryonia* кашель усиливается, когда они входят в теплое помещение. Ухудшение состояния возможно при любом движении — даже когда их носят на руках. Обычно животные этого типа предпочитают оставаться в одиночестве. Характерным симптомом является болезненность в грудной клетке при кашле и дыхании — именно из-за болезненности им трудно сделать глубокий вдох, что приводит к развитию одышки. Дыхание облегчается в положении сидя.

Cina

Состояние *Cina* может вызываться инфестацией гельминтов, поэтому *Cina* чаще назначается молодым животным. Животные *Cina* нередко угрюмые, раздражительные и обидчивые, могут укусить или ударить лапой. Характерен сухой сильный спастический кашель вплоть до удушья. Ухудшение состояния отмечается утром в отличие от большинства средств; кроме того, может быть ухудшение в полнолуние. Эффективен при трахеобронхите у собак.

Drosera

Данное средство также эффективно при трахеобронхите у собак. Показанием к назначению *Drosera* являются приступы сильного спастического кашля. Отмечается чрезвычайная чувствительность глотки, поэтому прикосновение к горлу и голосовая активность провоцируют возникновение кашлевых приступов. У животных *Drosera* отмечается необычный симптом — ухудшение кашля в положении лежа. Кашель обычно глубокий, как будто идущий из глубины брюшной полости, и часто сочетается с охриплостью голоса и явлениями ларингита.

Dulcamara

Для животных *Dulcamara* характерно ухудшение в холодную сырую погоду и от лежания на сырой земле. Часто симптомы *Dulcamara* наблюдаются в конце лета, когда днем еще тепло, но по ночам начинает холодать. Чаще всего кашель сухой, с астматическим компонентом, однако иногда может быть

влажным; приступы кашля могут возникать после физического напряжения. Чаще всего состояние *Dulcamara* у животных возникает из-за быстрого охлаждения после перегревания, как это происходит, например, при физических нагрузках в холодную сырую погоду.

Ferrum phosphoricum

Для животных с симптомами *Ferrum phosphoricum* характерно вялотекущее воспаление с продуктивным кашлем, иногда с примесью крови или в сочетании с носовым кровотечением. Иногда возникают приступы сильного спастического кашля вследствие раздражения глотки. Данное средство обычно показано на ранних стадиях инфекционного воспаления дыхательных путей. Характерным психическим симптомом у этих животных является чередование депрессии и периодов повышенной возбудимости; обычно эти животные предпочитают одиночество.

Hepar sulphuris calcareum

Hepar sulphuris calcareum является главным средством при ларингите со стенозом гортани у детей; у животных назначение данного препарата может быть полезным при бронхите. Характерен продуктивный кашель с отделением густой гнойной мокроты желтого цвета. Эти животные очень зябкие, и кашель у них провоцируется любым охлаждением, особенно при пребывании на холодном сквозняке. Характерным психическим симптомом является раздражительность и злобность; малейшее прикосновение к ним может быть просто опасным. В анамнезе у них часто бывают указания на абсцессы.

Iresacuanha

Ключевыми симптомами данного средства являются кашель и тошнота. Для животных *Iresacuanha* характерны приступы сильнейшего кашля с последующей тошнотой и рвотой. Кашель часто сочетается с кровотечением из носа и полости рта. Астма сопровождается кожными заболеваниями, течение астмы ухудшается в сырую погоду. Дыхание затрудненное, с сильными хрипами; улучшение дыхания отмечается в тепле и на открытом воздухе, однако на холоде дыхание затруднено. На-

значение *Iresacianha* показано при сильных приступах удушьящего кашля, после которых животные замирают и теряют сознание.

Phosphorus

Phosphorus представляет собой средство-полихрест, действие которого направлено преимущественно на органы дыхания — именно поэтому назначение *Phosphorus* у животных этого типа при заболеваниях дыхательных путей бывает очень эффективным. Многие заболевания *Phosphorus* сопровождаются кровотечением, в частности, при кашле у животных *Phosphorus* может быть примесь крови в мокроте или кровотечение из полости носа или рта. Кашель обычно сухой и глубокий, с усилением на холодном воздухе; приступы кашля в типичных случаях возникают при выходе на холодный воздух из теплого помещения. При кашле у этих животных отмечается дрожание; кашель может усиливаться в присутствии незнакомых людей. Обычно животные с симптомами этого средства зябкие, у них выражено чувство голода и желание холодной воды; они легко пугаются и вздрагивают. Конституциональными особенностями животных этого типа является дружелюбие, громкий голос, поджарость и длинное тело.

Pulsatilla

Для данного средства характерен сухой кашель ночью и влажный утром. Состояние *Pulsatilla* ухудшается в жарком помещении и облегчается на свежем воздухе. Облегчение кашля также отмечается в положении животных сидя или лежа с поднятой головой. Чаще всего назначение *Pulsatilla* эффективно в тех случаях, когда инфекция дыхательных путей уже близка к разрешению, а застойные явления в грудной клетке связаны с наличием значительного количества мокроты. Животные с симптомами данного средства обычно ласковые и привязчивые; у них, как правило, не бывает жажды даже при лихорадке.

Rumex crispus

Характерным симптомом *Rumex* является ощущение сильнейшего щекотания в горле, вызывающее кашель даже при лег-

ком прикосновении. Другой характерный симптом этого средства — повышенная чувствительность к холодному воздуху, приступ кашля может провоцироваться вдыханием глотка холодного воздуха. Приступ кашля может возникать также при резких изменениях температуры. Для *Rumex* характерен сухой и постоянный кашель. Следует рассмотреть возможность назначения данного препарата при трахеобронхите у собак.

Spongia tosta

О назначении именно этого средства следует подумать в первую очередь при спастическом лающем кашле. Звучание такого кашля образно сравнивают со звуками распиливания сосновых досок. Кашель смягчается после теплой пищи и питья теплой воды; холодная вода и холодный ветер усиливают кашель. Данное средство эффективно при кашле, возникающем вследствие заболеваний сердца. Животные с симптомами этого препарата обычно встревоженные и боязливые, часто вздрагивают во сне, что может спровоцировать приступ кашля и затруднение дыхания. *Spongia* показана также при трахеобронхите у собак.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ

При возникновении у вашего питомца симптомов, указывающих на тяжелое поражение сердца и легких, требуется консультация квалифицированного ветеринара-гомеопата; существенное значение имеет постоянное наблюдение ветеринара. На тяжелые изменения сердечно-сосудистой и дыхательной систем могут указывать такие симптомы, как одышка, быстрая утомляемость при минимальной физической нагрузке и стридорозное дыхание. Кроме того, при развитии подобных заболеваний отмечаются булькающие и грохочущие хрипы в легких, указывающие на наличие жидкости в альвеолах. При развитии этого состояния требуется немедленное обращение в ветеринарную лечебницу и тщательное обследование. При назначении правильно подобранного гомеопатического средства часто отмечается благоприятная ответная реакция организма. Однако эти состояния в целом настолько тяжелые, что требуют помощи опытного ветеринара-гомеопата.

Орган зрения

Краткое описание

Функции

Конъюнктивит

Гипопион (скопление гноя
в передней камере глаза)

Язвы роговицы

Энтропион (выворот век)

Травмы глазного яблока

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Утверждение «глаза – зеркало души» одинаково справедливо как для человека, так и для любого живого существа. Взглянув в глаза кошки или собаки, мы сразу же интуитивно понимаем состояние их психоэмоциональной сферы и чувствуем, какие эмоции они испытывают в данный момент – гнев, печаль, горе, боль, радость, счастье или возбуждение. В то же время нам становится понятным и физическое состояние наших питомцев. Тусклый, вялый взгляд, покраснение век и выделения из глаз – все эти симптомы указывают на болезненное состояние животного. Нередко в глазах животного мы можем прочесть предупреждение о надвигающейся болезни, когда начинают развиваться соответствующие психические симптомы, а физические симптомы еще отсутствуют. Ежедневное общение с нашими любимцами и стремление понять их внутренний мир, обмениваясь с ними взглядами, не только поможет нам почувствовать огромную радость достойных дружеских отношений, но и даст возможность оградить их от болезней и душевных травм.

ФУНКЦИИ

Орган зрения позволяет животным (и человеку) не только визуально воспринимать окружающий мир во всем многообразии его красок и оттенков, но и заглянуть в глубину души каждого живого существа. Без совершенного органа зрения собаки не были бы собаками, а кошки не были бы кошками – по крайней мере, они не были бы по природе своей хищниками, жизнь которых зависит от выслеживания и ловли добычи. В данной главе мы не будем обсуждать нарушения зрения, так как обычно потеря зрения является симптомом глубоких хронических болезней, а ограничимся обсуждением некоторых заболеваний поверхностных структур органа зрения и наиболее часто встречающихся видов травм.

Верхнее и нижнее веки обеспечивают защиту и сохранение влаги для питания передней прозрачной оболочки глаза – роговицы. В норме роговица лишена кровеносных сосудов (что является одним из условий полноценного ясного зрения); пи-

тание роговицы осуществляется за счет осмоса из подлежащей оболочки глаза – склеры. Прораствание роговицы кровеносными сосудами отмечается после травматических повреждений. Без соответствующего увлажнения за счет слезной жидкости роговица быстро высыхает и теряет прозрачность, что неизбежно приводит к развитию эрозий и язв роговицы, которые имеют склонность к быстрому прогрессированию с последующей потерей зрения.

Для кошек и собак характерно наличие так называемого внутреннего (мигательного) или третьего века. Третье веко более выражено у кошек – когда кошка спит или плохо себя чувствует, третье веко частично закрывает роговицу глаза, что является ранним симптомом ряда заболеваний. У большинства собак третье веко не так хорошо заметно.

Оболочка розоватого цвета, покрывающая внутреннюю поверхность век и склеру, называется конъюнктивой (от латинского слова *conjunct* – «соединять вместе»). Анатомически различаются конъюнктивой век и конъюнктивой глазного яблока, хотя фактически речь идет об одной и той же оболочке глаза. Вместе оба отдела образуют конъюнктивальный мешок, где скапливаются пыль и соринки, попавшие в глаз. Различают верхний и нижний конъюнктивальные мешки в соответствии с верхним и нижним веком.

КОНЬЮНКТИВИТ

Воспаление конъюнктивы глазного яблока встречается достаточно часто, так как именно в конъюнктивальном мешке скапливается песок, грязь и соринки, попавшие в глаз; кроме того, конъюнктивой подвергается постоянным внешним воздействиям. Конъюнктивит может развиваться в результате травмы глазного яблока, однако в некоторых случаях конъюнктивит является одним из симптомов острого (напоминающего простудное заболевание у людей) или хронического заболевания. Острый конъюнктивит обычно наблюдается у животных молодого возраста, чаще всего у кошек, и представляет собой один из симптомов инфекции верхних дыхательных путей.

Обычно инфекции верхних дыхательных путей у кошек име-

ют вирусную этиологию; кроме того, подобное воспаление могут вызвать *Chlamydia cati*. Чаще других встречается вирус кошачьего ринотрахеита, относящийся к группе герпесвирусов (однако этот вирус не является аналогом вируса герпеса человека). Особенностью всех герпесвирусов является склонность к рецидивам в стрессовой ситуации, и вирус кошачьего ринотрахеита — не исключение. Вспышки вирусной инфекции продолжаются до тех пор, пока иммунная система инфицированного животного не справится с вирусом. Характерной особенностью данного вируса является образование изъязвлений слизистой оболочки полости рта и роговицы глаз; кроме того, отмечается тяжелый ринит. У взрослых животных вирусная инфекция протекает в основном в виде рецидивирующего конъюнктивита. Несколько реже возбудителем вирусного конъюнктивита является калицивирус (*Calicivirus*), названный так из-за сходства его формы с обычной чашкой. По клинической картине начальной стадии заболевания бывает достаточно трудно определить, какой именно вирус является возбудителем в данном случае; однако калицивирус редко рецидивирует, поэтому практически не наблюдается у взрослых животных. Хламидиозная инфекция встречается относительно редко, однако вызывает тяжелое воспаление конъюнктивы с развитием язв роговицы; в большинстве случаев данный тип инфекции ограничивается только поражением глаз.

В отличие от кошек у собак не отмечается подобной чувствительности к инфекционным агентам, вызывающим конъюнктивит. Большинство случаев конъюнктивита у собак возникает вследствие травматических повреждений, попадания пыли и соринок в глаза, аллергии и некоторых хронических болезней. У собак низкорослых пород встречается так называемый «сухой кератоконъюнктивит» (*Keratoconjunctivitis sicca*), связанный с нарушением продукции достаточного количества слезной жидкости. В некоторых случаях отмечается почти полное отсутствие слезной жидкости, что неизбежно приводит к сухости конъюнктивальной оболочки и раздражению роговицы. В подобных случаях помимо назначения соответствующих гомеопатических средств следует применять специальный раствор для увлажнения и очищения конъюнктивы и роговицы глаз, состав которого имитирует слезную жидкость. В тяже-

лых случаях рекомендуется хирургический метод лечения, который заключается в перемещении протока слюнной железы соответствующей стороны в конъюнктивальный мешок пораженного глаза. Поскольку «сухой» кератоконъюнктивит представляет собой достаточно серьезное хроническое заболевание, целесообразно обращаться к ветеринару-гомеопату и не пытаться самостоятельно лечить вашего питомца дома.

Если конъюнктивит развивается у котят, то скорее всего это острый (а не хронический) процесс вирусной этиологии, который можно попытаться лечить самостоятельно с учетом изложенных далее специальных мер. Если же конъюнктивит развивается у взрослых кошек и собак, то прежде всего следует подумать о посттравматическом характере заболевания (например, о повреждении роговицы или конъюнктивы) и незамедлительно обратиться к ветеринару. Второй возможный вариант — конъюнктивит у вашего питомца является одним из симптомов хронического заболевания. В этом случае лечение также следует проводить по назначениям ветеринара-гомеопата. Если же у взрослого животного развился острый конъюнктивит, то можно попытаться лечить его самостоятельно в домашних условиях. Однако, если в течение нескольких дней вы не увидите улучшения, то, безусловно, следует обратиться за квалифицированной помощью.

Некоторые особенности лечения конъюнктивита в домашних условиях

Если у вашего питомца развился конъюнктивит, то прежде всего необходимо *оценить степень тяжести заболевания, ответив на следующие вопросы:*

- Не наблюдалось ли ранее подобных симптомов или симптомы появились впервые?
- Имеются ли выделения из глаз? Если есть выделения, то как они выглядят? (Водянистые или густые? Желтоватые, белые или зеленые? Нет ли примеси крови? Если выделения густые, то сухие или тягучие?)
- Отмечается ли болезненность в области глаз? Держит ли глаза закрытыми?
- Не отмечается ли других симптомов заболевания?
- Не отказывается ли ваш питомец от еды (отказ от еды

обычно обусловлен изъязвлениями полости рта)?

- Нет ли вялости и общей слабости?

В следующих случаях надо сразу же обращаться к ветеринару:

- если вы заметили слабость и вялость,
- если выделения из глаз густые, с примесью гноя, крови,
- если отмечается болезненность в области глаз и ваш питомец держит глаза закрытыми,
- если заболевание развивается после травматического повреждения глаза (например, царапины от кошачьего когтя),
- если ваш питомец отказывается от еды.

По моему убеждению, необходимо обращаться к специалисту-ветеринару независимо от степени тяжести воспалительного процесса, так как при развитии язв роговицы состояние глаза может *ухудшиться очень быстро*, что неизбежно приведет к потере зрения в той или иной степени. Не следует забывать, что язвы роговицы могут развиваться даже после небольших царапин.

Не откладывайте надолго обращение к специалисту, *если состояние вашего питомца ухудшается*, появляются новые симптомы или если нет улучшения после самостоятельного назначения гомеопатических средств.

После оценки степени тяжести заболевания *обязательно обратите внимание на следующие обстоятельства:*

- Нет ли подобных симптомов у других ваших животных?
- Не принимал ли ваш питомец участия в какой-либо драке незадолго до появления симптомов?
- Не раздражают ли кожу выделения из глаз?
- Не отмечается ли у вашего питомца симптомов аллергии, например, чиханья?

Острый конъюнктивит

Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что во всех случаях острого конъюнктивита следует обращаться к ветеринару для обследования на предмет травматического поражения роговицы и наличия изъязвлений. Для диагностики поражений такого рода ветеринары обычно применяют специальные капли с кра-

сителем; после закапывания зона повреждения роговицы окрашивается и становится хорошо заметной. При выявлении серьезных травматических повреждений или изъязвлений роговицы ветеринары обычно рекомендуют хирургическое лечение, которое заключается в наложении специальных швов на третье веко на две недели для прикрытия зоны поражения. В таких случаях третье веко играет роль своеобразной естественной «повязки», предохраняющей роговицу от углубления процесса и стимулирующей заживление; этот метод является достаточно эффективным и часто помогает спасти поврежденный глаз.

При традиционном аллопатическом лечении при остром конъюнктивите обычно назначаются специальные глазные мази и капли, содержащие антибиотики или стероиды. Стероиды оказывают выраженное угнетающее влияние на иммунную систему, что во много раз увеличивает вероятность развития язв роговицы и тяжелого поражения глазного яблока. Именно поэтому *никогда* не следует назначать стероидные препараты при травматических повреждениях и изъязвлениях роговицы. Местное назначение антибиотиков часто является или бесцельным, или бесполезным, так как чаще всего острый конъюнктивит развивается вследствие травмы, аллергии или имеет вирусную этиологию. Антибиотики помогают только в случаях развития вторичной бактериальной инфекции.

Орошение глаз приносит намного больше пользы, чем обычные глазные капли, особенно если в состав орошающей жидкости входят настойки некоторых трав. Орошать глаза можно обычной кипяченой (или дистиллированной) и охлажденной водой, причем на стакан воды следует добавить четверть чайной ложки поваренной соли. Настойки трав добавляются из расчета 10 капель на стакан воды. Многие растительные препараты обладают антибактериальным и стимулирующим действием, очищая раны и ускоряя их заживление — например, настойка чая (*Goldenseal*), настойка *Euphrasia*, *Calendula* и *Hypericum*. Каждый раз для орошения следует применять растворы, содержащие не более одного-двух видов трав.

При остром конъюнктивите также полезно назначение витаминов. *Витамин С* (5–10 мг 2–3 раза в день) и *витамин Е* (5–10 мг 1 раз в день) обладают выраженным противовоспалитель-

тельным и стимулирующим действием. Особенно полезно при поражении глаз назначение *витамина А*, который активизирует репаративные процессы при поражении роговицы. Одна капля официального *витамина А* однократно ежедневно закапывается в пораженный глаз; кроме того, назначается пероральный прием этого витамина из расчета одна/восьмая часть чайной ложки аптечного препарата на 10 фунтов веса один раз в день в течение нескольких дней.

Специальные гомеопатические глазные капли также приносят значительную пользу, особенно при остром конъюнктивите аллергической этиологии, при травматических повреждениях небольшого объема, при попадании в глаз соринки и пыли, а также при сухости и раздражении конъюнктивы. Не следует применять эти капли более двух недель подряд. Если симптомы конъюнктивита несмотря на лечение сохраняются дольше двух недель, то необходимо обратиться к специалисту-гомеопату. Теоретически местные гомеопатические средства могут мешать действию пероральных гомеопатических лекарств, однако на практике подобные случаи мне не встречались.

При лечении конъюнктивита применяются различные гомеопатические средства, однако если вы не уверены в правильности вашего выбора или если состояние животного не улучшается, то следует обратиться к квалифицированному специалисту. Не следует забывать о необходимости внимательного наблюдения за состоянием глаза при развитии язв роговицы и применять гомеопатическое лечение наряду с другими методами, рекомендованными специалистами.

Гомеопатические средства при конъюнктивите

Aconitum napellus

Сферой воздействия данного средства являются многие острые инфекционные заболевания и различные виды острого воспаления. Обычно состояние *Aconitum* возникает в результате выраженного страха или внезапного переохлаждения, часто в сочетании с холодным ветром. Заболевания глаз чаще всего начинаются после длительного пребывания на ярком солнце в холодный снежный день. Назначение *Aconitum* может также потребоваться в тех случаях, когда острое воспаление начина-

ется внезапно после удаления инородного тела. Данное средство может оказаться полезным и при нарушении роста ресниц (врастание ресниц). Наибольший эффект при назначении данного препарата отмечается на ранних стадиях заболевания, когда все симптомы отчетливо выражены и проявляются наиболее резко – сильное покраснение глаз, отечность и инъекция сосудов конъюнктивы. В большинстве случаев *Aconitum* отмечаются обильные водянистые выделения. Чаще всего у таких животных повышена чувствительность к свету.

Следует подумать о назначении данного средства при внезапном начале заболевания, выраженной лихорадке и сильном воспалении на ранних стадиях заболевания.

Allium sera

Данное гомеопатическое средство готовится из обычного репчатого лука и назначается при нерезко выраженном воспалительном процессе в области глаз. Основным симптомом являются обильные водянистые выделения из глаз – можно подумать, что ваш питомец только что почистил и порезал на кухне луковицу! Слезная жидкость не вызывает раздражения кожи, однако жжение и болезненность в области глаз достаточно сильные. Часто отмечаются выделения из носа раздражающего характера, в основном из левой ноздри. Ухудшение симптомов наблюдается в теплом помещении; на открытом воздухе состояние обычно улучшается. В подобных случаях конъюнктивит часто сопровождается развитием ларингита.

Apis mellifica

Одним из основных симптомов данного средства является отек. У животных с симптомами *Apis* обычно отмечается выраженный отек и воспаление век и конъюнктивы глаз; в некоторых случаях отек выражен настолько сильно, что конъюнктива выбухает между веками, мешая их смыканию – данное состояние называется хемоз. Выделения из глаз настолько густые и липкие, что веки иногда склеиваются между собой. Часто встречаются изъязвления роговицы, а также ее полное или частичное помутнение. Назначение данного средства может быть полезным и при кератоконъюнктивитах (*keratoconjunctivitis sicca*).

У животных *Apis* обычно отмечается отсутствие жажды и

избыток внутреннего тепла, поэтому они предпочитают находиться в прохладном месте.

Argentum nitricum

Данное средство представляет собой гомеопатически приготовленный нитрат серебра. В обычной клинической практике нитрат серебра закапывают в глаза новорожденным для профилактики бленнореи. Данное средство обладает тропностью к конъюнктиве глаз у новорожденных. При конъюнктивите у котят с обильными гнойными выделениями разных оттенков желтого или зеленого цвета целесообразно подумать о назначении *Argentum nitricum*. Кроме того, при конъюнктивите с симптомами *Argentum nitricum*, так же как и при конъюнктивите *Apis*, возможно развитие хемоза, т. е. выраженного воспаления конъюнктивы с ее отеком и выбуханием. Отмечается выраженная гиперемия глаз и инъекция сосудов конъюнктивы; достаточно часто бывает изъязвление роговицы. Края век обычно воспаленные, покрытые гнойными корочками, причем веки левого глаза поражены обычно сильнее, чем правого.

Симптомы воспаления глаз у *Apis* и *Argentum nitricum* во многом похожи, однако воспаление *Argentum nitricum* более «влажное» и выделения содержат большое количество гноя. У животных с симптомами данного средства, кроме того, часто отмечается диарея с отхождением кишечных газов в значительном количестве и в некоторых случаях рвота. Для животных данного типа характерен избыток внутреннего тепла; кроме того, их пугает любое изменение ситуации, толпа, высота и закрытые пространства.

Arsenicum album

Показанием к назначению данного средства является слезотечение раздражающего характера у беспокойных зябких животных с выраженной жаждой. Основными симптомами конъюнктивита у животных данного типа является активный воспалительный процесс с повышенной чувствительностью к свету и желтыми либо водянистыми выделениями из глаз. Отмечается сильнейший отек век, препятствующий открыванию глаз. Сильное воспаление сопровождается болезненностью, однако теплый компресс облегчает боли.

При развитии у животных кератоконъюнктивита с недостаточной продукцией слёзной жидкости назначение *Arsenicum album*, подобно *Apis*, может оказаться весьма полезным. Часто встречаются также изъязвления роговицы, причем преобладает, как правило, правостороннее поражение.

Belladonna

Воспаление *Belladonna*, подобно воспалению *Aconitum*, развивается внезапно и имеет активный характер. Однако ментальные симптомы этих средств разные – у *Aconitum* преобладает страх, а у *Belladonna* – раздражительность и приступы ярости.

При заболеваниях с симптомами *Belladonna* обычно отмечается расширение зрачков, именно поэтому глаза выглядят как стеклянные. Отмечается гиперемия и воспаление конъюнктивы, однако выделения обычно отсутствуют. Воспалительный процесс может быть выражен настолько сильно, что отмечается выворот век и выбухание глазных яблок кнаружи. Данное средство также дает хороший эффект при кератоконъюнктивитах с нарушением продукции слезной жидкости.

Calcareo sulphurica

Данное средство, подобно *Argentum nitricum*, обладает тропностью к конъюнктиве у новорожденных, поэтому может быть полезным при лечении конъюнктивита у котят. Для данного средства характерно выделение из глаз густого гноя желтого цвета. Роговица может быть пепельно-серого цвета, а в области век часто отмечается зуд. Животные этого типа не любят как холод и сквозняки, так и душные, жаркие помещения, поэтому обычно предпочитают находиться на открытом воздухе.

Euphrasia

Данное средство готовится из травы под названием «очанка лекарственная» (*Eyebright*). Характер выделений из глаз противоположен *Allium cepa* – слёзная жидкость чрезвычайно едкая, а выделения из носа раздражающего характера; однако в некоторых случаях выделения из носа могут быть густыми и едкими. После гнойных выделений или слезотечения могут оставаться пятна. Выделения из глаз имеют постоянный харак-

тер. По вечерам пациенты данного типа беспокойные и зябкие, наподобие пациентов *Arsenicum*. Иногда отмечается спастическое смыкание век. Основным показанием для назначения данного средства является обильное слезотечение раздражающего характера и хроническое воспаление глаз.

Mercurius (vivus, solubilis)

Характерным симптомом являются жидкие, но чрезвычайно едкие выделения из глаз. В передней камере глаза (пространстве позади роговицы) возможно скопление гноя в виде хлопьев беловатого цвета. Веки обычно воспаленные и гиперемизованные, отмечается их спастическое смыкание. Обычно воспаление глаз сопровождается раздражающими выделениями из носа зеленоватого цвета, имеющими зловонный запах.

Животные данного типа обычно раздражительные, непослушные и не любят подчиняться правилам и приказам; они даже могут укусить или оцарапать при попытке согнать их, например, с постели.

Pulsatilla

Характерным симптомом данного средства являются густые желтоватые выделения из глаз нераздражающего характера. *Pulsatilla*, так же как и *Sulphur*, часто назначается в случаях затянувшегося воспалительного процесса верхних дыхательных путей, которое сопровождается зудом и легким воспалением в области глаз.

Обычно животные *Pulsatilla* ласковые и покладистые, однако иногда требуют избыточного внимания. Для них характерно отсутствие жажды.

Rhus toxicodendron

У животных *Rhus*, так же как у животных *Pulsatilla*, отмечаются обильные гнойные выделения желтого цвета, однако воспаление выражено значительно сильнее. Данное гомеопатическое средство готовится из ядовитого плюща, поэтому вполне естественно предположить, что у животных с симптомами этого препарата будут интенсивная гиперемия и отечность глаз, а также сильные боли, но без зуда. Часто отмечается образование язв роговицы и склеивание век за счет обильных гнойных лип-

ких выделений. Во многих случаях выражено воспаление всех оболочек глазного яблока. Боли у пациентов данного типа выражены чрезвычайно сильно, особенно при движении (для болей *Rhus* характерно усиление болей в начале движения).

У пациентов *Rhus* можно найти много общего с пациентами *Arsenicum* — они зябкие, беспокойные (особенно после полуночи) и часто испытывают чувство жажды. У пациентов *Rhus*, однако, воспаление сопровождается более выраженным отеком и зудом, тогда как тошнота более характерна для *Arsenicum*. Следует подумать о назначении *Rhus toxicodendron* в тех случаях, когда у пациентов боли в области суставов усиливаются в начале движения и облегчаются при его продолжении.

Sulphur

Данное средство, подобно *Pulsatilla*, обычно назначается при воспалительном процессе верхних дыхательных путей затяжного характера, связанного с неспособностью организма самостоятельно справиться с инфекцией. У пациентов с симптомами *Sulphur* слёзная жидкость и воспалительные выделения из глаз обычно едкие, отмечается выраженное воспаление по краю век и изъязвление роговицы. Кроме того, пациенты *Sulphur* страдают от сильного жжения и зуда глаз, что заставляет их постоянно чесать и растирать эту область. В помещении у животных отмечается сухость конъюнктивы глаз, однако после выхода на улицу начинается обильное слезотечение.

В типичных случаях у животных данного типа отмечается избыток внутреннего тепла, жажда и снижение аппетита, особенно утром. Ближе к середине дня аппетит улучшается и достигает максимума примерно за час до следующего кормления.

Syphilinum

Syphilinum представляет собой глубоко действующее средство и продается только по рецепту. Данный препарат следует применять исключительно по назначению специалиста-гомеопата. Однако в разделе, посвященном лечению конъюнктивита, нельзя не упомянуть о *Syphilinum*, поскольку именно это средство позволяет справиться с хроническими формами воспаления, которые не поддаются воздействию других гомеопатических лекарств.

ГИПОПИОН (СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ ГЛАЗА)

Скопление гноя в передней камере глаза чаще всего развивается после травматического повреждения глазного яблока или вследствие острого конъюнктивита. Фактически гипопион представляет собой внутриокулярный абсцесс, при котором гной скапливается в передней камере глаза, т. е. в пространстве между роговицей и радужной оболочкой. При развитии гипопиона позади роговицы глаза отмечается беловатое «облачко». Обычно при лечении данного тяжелого осложнения применяются антибиотики. Однако если вы решили не применять антибиотики, но улучшения в течение нескольких дней не наблюдается, то следует не откладывая обратиться к специалисту-ветеринару. Даже при назначении правильного гомеопатического средства при гипопионе могут легко образоваться спайки передней камеры глаза, что потребует применения глазных капель, содержащих атропин. Не следует пытаться самостоятельно лечить такое заболевание – правильное всего обратиться или к ветеринару-гомеопату, или сочетать гомеопатическое и традиционное лечение антибактериальными препаратами.

Гомеопатические средства при гипопионе

Hepar sulphuris calcareum

У животных с симптомами данного средства отмечается чрезвычайная болезненность в области глаза и выраженное воспаление; именно поэтому они раздражительны и даже могут укусить при попытках осмотра. Вокруг больного глаза обычно наблюдаются мелкие гнойнички. Кроме того, гипопион часто сопровождается развитием изъязвлений роговицы. По своему действию *Hepar sulphuris* подобен *Mercurius*.

Mercurius (vivus, solubilis) и Mercurius corrosivus

См. описание средства в разделе «Лечение конъюнктивита». При углублении воспалительного процесса радужная оболочка выглядит тусклой и мутной. Все средства меркуриальной группы обладают сходным действием, однако *Mercurius* чаще назначается особям женского пола, а *Mercurius corrosivus* – осо-

бям мужского пола. Не следует назначать средства меркуриальной группы до или сразу же после *Silicea*.

Silicea (Silica)

Данное средство часто назначается при лечении гипопиона, так как представляет собой главное лекарство при абсцессах любой локализации. Основным показанием для назначения *Silicea* является нарушение ответной иммунной реакции и общая слабость. У пациентов *Silicea* гипопион может сопровождаться конъюнктивитом, однако боли не такие интенсивные, как у пациентов *Hepar sulphuris*. Кроме того, часто отмечается развитие вялых труднозаживающих язв роговицы. Как правило, наблюдается повышенная чувствительность к свету. Обычно развитие заболевания у пациентов *Silicea* происходит медленно и постепенно.

Thuja occidentalis

Чаще всего в ветеринарии данное лекарство назначается при осложнениях вакцинации. Следует подумать о назначении *Thuja* в тех случаях, когда гипопион развивается вскоре после вакцинации. *Silicea* является не менее важным антивакцинозным средством. При развитии гипопиона у пациентов *Thuja* обычно не отмечается выраженного конъюнктивита. Кроме того, данное лекарство очень полезно при лечении вялотекущих изъязвлений роговицы.

ЯЗВЫ РОГОВИЦЫ

Язвы роговицы представляют собой чрезвычайно серьезное заболевание, которое следует лечить строго по назначениям специалиста-ветеринара. Однако перечисленные в данном разделе гомеопатические средства могут оказать существенную помощь в лечении данной патологии. Описания этих препаратов представлены в разделах, посвященных лечению конъюнктивита и гипопиона. Кроме того, при язвах роговицы рекомендуется применять местно *витамин А* с целью ускорения процесса заживления.

Чаще всего образование вялотекущих язв роговицы отмеча-

ется у собак с выпуклыми глазными яблоками, так как в этих случаях нарушается питание тканей.

Гомеопатические средства при язвах роговицы

Apis mellifica, Argentum nitricum, Arsenicum album, Hepar sulphuris calcareum, Mercurius, Mercurius corrosivus, Rhus toxicodendron, Silicea, Syphilinum, Thuja.

Вялотекущие язвы роговицы с плохим заживлением — *Silicea, Thuja.*

ЭНТРОПИОН (ВЫВОРОТ ВЕК)

Энтропион редко бывает врожденным — чаще всего это следствие хронического воспалительного процесса. Ресницы при вывороте век раздражают роговицу глаза, поэтому развивается постоянное слезотечение и гиперемия конъюнктивы. Основные средства при лечении выворота век — *Borax* и *Calcareo carbonica*. Если состояние не улучшается, то целесообразно посоветоваться с ветеринаром-гомеопатом относительно назначения других средств. При отсутствии эффекта показано хирургическое лечение.

Borax

Для животных данного типа помимо энтропиона характерны следующие особенности. Во-первых, такие животные чрезвычайно чувствительны к шуму, особенно к звукам выстрелов, даже на значительном удалении. Во-вторых, они боятся падений с высоты, поэтому часто отказываются спускаться по лестнице и пугаются, если их опускают на землю с рук. Кроме того, для таких животных типично образование изъязвлений слизистой оболочки ротовой полости.

Calcareo carbonica

Данное средство применяется при нарушениях развития, в том числе и при энтропионе. Животные *Calcareo carbonica* обычно рыхлые, вялые, неповоротливые и ширококостные. По сравнению с пациентами *Borax* воспалительные явления со стороны глаз менее выражены.

ТРАВМЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

Любое травматическое повреждение глазного яблока является показанием для обращения к ветеринару, однако некоторые гомеопатические средства могут существенно ускорить выздоровление. Хотелось бы подчеркнуть еще раз, что даже небольшое по объему повреждение роговицы представляет собой серьезную опасность, поэтому наблюдение ветеринара во всех случаях травматического повреждения глаз является обязательным.

Arnica montana

Arnica полезна при ушибах и тупых травмах любой локализации. После травматического повреждения глазного яблока возможно возникновение частичного паралича глазодвигательных нервов. Кроме того, возможно образование посттравматических внутриглазных гематом. У пациентов с симптомами *Arnica* обычно настолько сильные боли, что они боятся любого прикосновения к месту повреждения. Одной из особенностей *Arnica* является стимуляция реабсорбции крови в области гематомы (однако у *Hamamelis* это свойство более выражено). Данное лекарство полезно также и при посттравматической катаракте, однако, как правило, в этих случаях средством выбора является *Conium*.

Calcareo sulphurica

Данное средство полезно при развитии инфекции и воспалительного процесса после попадания занозы в область глазного яблока.

Calendula officinalis

Данное средство необычайно полезно при лечении инфицированных ран любой локализации, в том числе и при нагноении ран глазного яблока. *Calendula* может использоваться как в потенцированной форме, так и местно в виде раствора для орошения и промывания ран. Раствор для промывания ран готовится следующим образом: после охлаждения на стакан кипяченой воды добавляется четверть чайной ложки поваренной соли и 10–20 капель настойки *Calendula*.

Conium maculatum

При назначении *Conium* возможно рассасывание посттравматической катаракты; однако в подобных случаях следует также рассмотреть возможность назначения *Arnica*.

Euphrasia

Рассмотрите возможность назначения данного средства при посттравматическом помутнении роговицы.

Hamamelis

Действие данного препарата во многом сходно с действием *Arnica*. Назначение *Hamamelis* полезно при тупой травме глазного яблока с образованием внутриглазной гематомы.

Ledum

Данное средство также может оказаться полезным при тупой травме глазного яблока. Специфическим показанием для назначения *Ledum* является внутриглазные гематомы с просачиванием крови в окружающие ткани (конъюнктивальный мешок, склеру, а также в переднюю камеру глаза).

Staphysagria

Назначение данного средства ускоряет заживление рваных ран, особенно если отмечается выраженная болезненность зоны повреждения. Назначение *Staphysagria* полезно при ранах роговицы глаз, однако следует применять данное лекарство под контролем специалиста-ветеринара.

Symphitum

Symphitum является одним из наилучших средств при травматических повреждениях глазного яблока, особенно при тупой травме. Кроме того, данное лекарство с успехом применяется для лечения эрозий роговицы. У одного из моих друзей после длительного ношения контактных линз образовалась хроническая эрозия роговицы с периодическим обострением воспалительного процесса. Две дозы *Symphitum* полностью избавили его от подобного заболевания.

Мочевыводящая система

Функции

Заболевания мочевыводящей системы

Цистит (воспаление мочевого пузыря)

Обструкция уретры и катетеризация

Почечная недостаточность

Недержание мочи

Посттравматическое недержание мочи

ФУНКЦИИ

Основными функциями мочевыводящей системы являются экскреция токсических и отработанных веществ из организма и поддержание водно-электролитного баланса. Кроме того, в почках синтезируются гормоны, которые оказывают влияние на кровеносную систему.

В процессе элиминации продуктов метаболизма могут принимать участие кишечник, печень, кожа, легкие и почки. Удаление продуктов метаболизма через почки может происходить за счет двух механизмов – фильтрации и секреции. Процесс фильтрации крови происходит в обширной сети тонкостенных извитых сосудов паренхимы почек (так называемых клубочках почки). В процессе фильтрации жидкость из кровеносного русла вместе с растворенными в ней продуктами обмена через стенки сосудов проникает в клетки почечной ткани, затем в канальцы, которые, собираясь вместе, образуют мочеточник. Мочеточник представляет собой сообщение между почечной лоханкой и мочевым пузырем. Процесс фильтрации происходит в основном пассивно, за счет разницы концентраций определенных веществ в крови и в клетках почечной паренхимы и зависит от объема крови, протекающей по сосудистой сети почек.

Секреция представляет собой активный метод перемещения определенных субстанций из кровеносного русла в почечные канальцы. Скорость секреции изменяется в зависимости от многочисленных факторов. Фактически же большинство субстанций плазмы, подлежащих удалению, элиминируются как за счет секреции, так и за счет фильтрации. Кроме того, часть жидкости и растворенных в ней субстанций плазмы после фильтрации подвергается реабсорбции, т. е. обратному всасыванию – этот процесс происходит в определенном отделе канальцев почки. За счет реабсорбции часть необходимых организму веществ возвращается в кровеносное русло. Благодаря подобному сложнейшему механизму в почках за сутки очищается от токсических продуктов шестикратный объем крови.

Обмен жидкостей также регулируется за счет регуляции скорости фильтрации и канальцевой реабсорбции, что позволяет поддерживать в организме определенный водно-электролитный баланс и объем плазмы крови, необходимый для нормаль-

ного кровообращения. Если из-за потери жидкости или неадекватного потребления жидкости снижается давление, то почки реагируют на это секрецией фермента ренина, который инициирует продукцию фермента ангиотензина, обладающего выраженным действием на сосуды. Под влиянием ангиотензина сосуды сокращаются, тем самым ограничивается экскреция воды и бикарбонатов; это, в свою очередь, повышает давление крови и улучшает кровообращение. Кроме этих факторов в почках продуцируется гормон эритропоэтин, который стимулирует созревание эритроцитов и их выход в кровеносное русло. При хронических заболеваниях почек продукция всех этих факторов уменьшается. Таким образом, заболевания почек непосредственно влияют на объем циркулирующей крови и элиминацию продуктов метаболизма. Без полноценной деятельности почек поддержание жизни невозможно.

Мочевой пузырь представляет собой резервуар, в который по мочеточникам из почек поступает моча. При переполнении мочевого пузыря в головной мозг поступает соответствующий сигнал, после чего животные начинают искать определенное место чтобы помочься. Процесс мочеиспускания происходит за счет сокращения мышц мочевого пузыря и мышц тазового дна. Вне мочеиспускания кольцевые мышцы сфинктеров находятся в состоянии сокращения, что позволяет удерживать мочу в мочевом пузыре. При позывах к мочеиспусканию происходит сокращении мышц мочевого пузыря и одновременное расслабление сфинктеров, что позволяет струе мочи свободно вытекать наружу. Обычно у животных опорожнение мочевого пузыря происходит 2–4 раза в день.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

При заболеваниях мочевыводящей системы нарушается либо продукция мочи, либо выведение мочи. Причиной нарушения продукции мочи в основном является поражение почечной паренхимы. Причиной нарушения оттока мочи являются заболевания мочевыводящих путей, в том числе мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Большинство заболеваний почек развиваются медленно и незаметно; как правило, эти заболева-

ния очень трудно поддаются лечению. Заболевания мочевыводящих путей, в том числе мочевого пузыря, развиваются быстро, при правильном лечении возможно полное выздоровление. При несоответствующем или неправильном лечении заболеваний мочевого пузыря возможно вовлечение в процесс и почек — следовательно, на лечение этих заболеваний необходимо обращать самое пристальное внимание. В традиционной медицине путь распространения инфекции от мочевого пузыря через мочеточник до почек называется восходящим путем. Именно для предупреждения заболевания почек традиционные ветеринары при цистите всегда назначают антибиотики.

С точки зрения гомеопатии, однако, вовлечение почек в патологический процесс происходит вследствие общего ослабления организма, а не из-за простого перемещения бактерий от мочевого пузыря к почкам по мочеточникам. Если у данного индивидуума фокус хронической болезни сосредоточен на мочевыводящей системе, то по мере развития болезни фокус постепенно смещается от поверхностно лежащих органов (мочевого пузыря) к глубоколежащим органам (почкам). Кроме того, при супрессии симптомов болезни мочевого пузыря этот процесс ускоряется. Таким образом, столь распространенный метод лечения цистита антибиотиками не столько предупреждает восходящую инфекцию, сколько способствует углублению процесса. Большинство случаев воспаления мочевого пузыря вообще не является следствием инфекции (моча стерильна даже при явных симптомах воспаления); даже если и наблюдается рост бактерий, то чаще всего он имеет вторичный характер (см. гл. 2 «Природа болезни» и гл. 3 «Природа излечения»).

Заболевания почек чрезвычайно трудно поддаются лечению; фактически их действительно проще предупредить, чем излечить. Одним из решающих факторов, как и при большинстве заболеваний, является питание. Наилучшей пищей для домашних животных является свежеприготовленная домашняя пища и достаточное количество сырого мяса. Такой рацион вполне соответствует тому, к чему в процессе эволюции приспособились хищники. Сухие готовые корма для домашних животных являются тяжелым стрессовым фактором для почек. В процессе эволюции хищники приспособились к потреблению небольшого количества воды, поэтому при постоянном

употреблении сухого готового корма нагрузка на почки по поддержанию водно-электролитного баланса у них существенно возрастает. Особенно подвержены заболеваниям почек кошки, так как этот вид эволюционировал в засушливом климате; представители семейства кошачьих привыкли получать основное количество жидкости при поедании свежееубитой добычи, в промежутках между едой довольствуясь очень малым ее количеством. У кошек и у большинства собак, которых постоянно кормят сухим кормом, как правило, выявляются признаки некоторой обезвоженности. Чтобы оценить влияние сухого корма на водно-электролитный баланс, проведите несложный опыт – поместите немного корма в тарелку и залейте водой. Вы удивитесь, сколько требуется воды для того, чтобы этот корм размок и стал доступен для переваривания.

Кроме сухой пищи стрессовыми факторами для почек являются токсины и вакцинация. Многие токсические вещества при попадании внутрь организма непосредственно повреждают почечную паренхиму. Так как способности регенерации почечной ткани резко ограничены, гибель каждой клетки способствует нарушению функции почек. Мы немного можем сделать для предотвращения токсического влияния загрязнений окружающей среды (мы в состоянии только ограничить свой собственный «вклад»), однако в своем доме мы вполне способны снизить токсическое влияние различных синтетических красок, лаков и т. п., используя не синтетические, а только натуральные материалы.

Впервые влияние вакцинации на организм я осознал при лечении одной моей пациентки – кошки с рецидивирующей инфекцией мочевыводящих путей. У персидской кошки Флаффи регулярно повторялось воспаление мочевого пузыря несмотря на постоянное соответствующее лечение. Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы выявить связь между рецидивами цистита и вакцинацией. После отмены всего комплекса прививок воспаление мочевого пузыря у Флаффи полностью купировалось, рецидивов больше не было. Гораздо позже, когда я лучше узнал и понял гомеопатический метод лечения, мне стало понятно, что с точки зрения теории гомеопатии такой результат можно было предсказать.

В соответствии с гомеопатическими принципами существу-

ют несколько типов болезни, или несколько типов ответной реакции организма. Одним из типов ответной реакции является сикоз, основная особенность которого заключается в гиперреактивности организма. Сикоз оказывает выраженное влияние на мочевыводящую систему (точнее, на урогенитальную систему). Основным «инициатором» сикоза является вакцинация. Вакцинозис — болезнь, которая вызывается вакцинацией, — представляет собой один из подтипов сикоза. Именно поэтому вследствие вакцинации часто возникают воспалительные процессы в мочевыводящей системе.

Поражение мочевыводящей системы любого уровня вне зависимости от причины может распространиться таким образом, что в патологический процесс окажутся вовлеченными и почки. К заболеванию почек может привести любой тип супрессивного лечения заболеваний мочевого пузыря. Именно заболевания мочевого пузыря мы рассмотрим в этой главе в первую очередь, так как их симптомы очевидны и в целом эти заболевания гораздо лучше поддаются лечению.

ЦИСТИТ (ВОСПАЛЕНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ)

В ветеринарии цистит всегда рассматривался как инфекционно-воспалительное заболевание мочевыводящих путей, однако в последнее время его все чаще стали называть «заболевание нижних отделов мочевыводящих путей», тем самым подчеркивая, что в большинстве случаев воспаление мочевого пузыря не имеет инфекционного характера.

Первым симптомом воспаления мочевого пузыря является учащение позывов к мочеиспусканию, при этом выделение мочи у животных происходит в необычных и несоответствующих для этого местах (на ковры, мебель и т. п.). Из-за постоянных позывов животные становятся чрезвычайно беспокойными. При цистите не отмечается увеличения количества выделяемой мочи, однако из-за воспаления у животных возникает ощущение постоянного переполнения мочевого пузыря, что и является причиной частых позывов к мочеиспусканию. Люди, страдающие циститом, уверяют, что это очень мучительное ощущение.

Второй ключевой симптом цистита, типичный для кошек, —

это особый специфический запах мочи. Людям этот запах кажется просто невыносимым, однако коты находят его необычайно привлекательным. Иногда можно увидеть, как вокруг кошек с удаленными яичниками или вокруг кастрированных особей буквально «вьется» множество котов со вполне определенными намерениями. В подобных случаях всегда следует заподозрить, что кошка с удаленными яичниками или кастрированный кот страдают воспалительным заболеванием мочевого пузыря.

Кошки страдают циститом намного чаще, чем собаки; у собак особи женского пола болеют циститом чаще, чем особи мужского пола. У котов, однако, риск заболевания намного больше, чем у кошек.

При исследовании мочи у больных животных выявляется значительное количество лейкоцитов, что указывает на воспалительный характер заболевания. Однако инфекция мочевого пузыря чаще предполагается, чем существует на самом деле. При исследовании мочи помимо лейкоцитов в составе мочевого осадка иногда обнаруживаются кристаллы различных солей, чаще всего солей фосфорной кислоты (так называемые трипельфосфаты, состоящие из трех компонентов). Образование этого типа кристаллов происходит при щелочной реакции мочи. У хищников, как правило, отмечается кислая реакция мочи за счет продуктов метаболизма белков. При употреблении в пищу готовых кормов на основе злаков реакция мочи у домашних животных меняется на щелочную — именно этот фактор считается одним из основных, провоцирующих образование кристаллов трипельфосфатов в моче. Бактерии, как правило, также выделяют ряд субстанций, которые меняют реакцию мочи на щелочную, что также способствует образованию трипельфосфатов. Кроме того, бактерии активно размножаются именно в щелочной среде. Таким образом, именно питание является пусковым моментом целого ряда нарушений мочевыводящей системы, в частности нарушений функции мочевого пузыря.

У особей женского пола мочеиспускательный канал более короткий и широкий, поэтому кристаллы солей, даже если и раздражают мочевыводящие пути, выделяются с мочой практически беспрепятственно. У особей мужского пола мочеиспускательный канал более узкий и длинный, причем заболевания

чаще локализируются в нижней его трети, проходящей в области полового члена. Однако в целом (к счастью для собак!) заболевания мочеиспускательного канала у особей мужского пола встречаются крайне редко. Несколько иная картина отмечается у кошек — у особей мужского пола в области мочеиспускательного канала часто возникают слизистые пробки, полностью блокирующие выделение мочи. *Если обструкция мочеиспускательного канала у животных быстро не устраняется, то через короткое время может наступить смертельный исход.* При наличии в мочеиспускательном канале препятствия для оттока мочи у животных быстро повышается внутреннее давление в мочевом пузыре, мочеточнике и почечных лоханках, что через некоторое время неизбежно приводит к блокаде почек — т. е. к полному прекращению экскреции мочи. *Обструкция мочеиспускательного канала у котов может закончиться смертельным исходом через 24–48 часов. Именно поэтому при развитии обструкции требуется экстренная ветеринарная помощь.* У кобелей обструкция уретры встречается достаточно редко; у особей женского пола обоих видов это заболевание встречается как казуистическое. Но не следует забывать, что в ветеринарную лечебницу необходимо обратиться также и в том случае, когда у вас есть основание подозревать у вашего питомца патологию мочевыводящих путей, но вы не уверены, происходит ли у него нормальное мочеиспускание.

В некоторых случаях при цистите у котов действительно бывает сложно определить, нет ли препятствий оттоку мочи, так как из-за постоянных позывов выделение мочи происходит по каплям. Иногда эти капли окрашены в розовый или красноватый цвет из-за примеси крови.

Кошки при цистите иногда избегают пользоваться своим туалетом — возможно, из-за того, что он ассоциируется у них с сильной болью, которая возникает при мочеиспускании. В некоторых случаях боязнь туалета у кошек остается даже после прекращения всех явлений цистита. Таким образом, перенесенный цистит может стать причиной некоторых поведенческих изменений, которые сохраняются и после выздоровления.

Если у вас нет уверенности в том, что у вашего питомца произошло мочеиспускание, то попробуйте пропальпировать мочевой пузырь. У котов это сделать несложно — при обструкции

мочеиспускательного канала в нижних отделах живота пальпируется образование округлой формы, по размерам напоминающее апельсин (иногда даже грейпфрут). Для котов пальпация мочевого пузыря весьма мучительна, поэтому даже самые миролюбивые животные могут рычать и сопротивляться осмотру. Если вы пропальпировали мочевой пузырь, то ни в коем случае не пытайтесь сдавливать его, чтобы добиться мочеиспускания – у животных легко может произойти разрыв мочевого пузыря. В этих случаях единственное, что от вас требуется, – это экстренное обращение в ветеринарную лечебницу.

При обструкции мочеиспускательного канала состояние животных быстро ухудшается, развивается вялость, заторможенность, появляются рвота и специфический запах выдыхаемого воздуха. Все эти симптомы указывают на быстрое развитие интоксикации, причиной которой является прекращение экскреции токсинов. Частично функцию почек по удалению токсических продуктов метаболизма могут взять на себя кожа, легкие и органы пищеварения – так организм предпринимает отчаянные попытки снизить концентрацию токсинов в плазме и тем самым сохранить жизнь. При таком состоянии спасти вашего питомца может только экстренная ветеринарная помощь. Если же вовремя не оказать ему помощь, то смертельный исход может наступить буквально в течение нескольких часов.

У некоторых животных из кристаллов солей могут образоваться конкременты (камни) либо в мочевом пузыре, либо в почечной лоханке. Эти камни подлежат хирургическому удалению, однако иногда изменение питания и соответствующие лекарства помогают растворить их. Обычно конкременты мочевыводящих путей диагностируются при рентгенографии, а в редких случаях их можно определить пальпаторно.

Особенности наблюдения и лечения животных при цистите

Если у вашего питомца появились признаки *цистита*, то прежде всего *следует оценить степень тяжести заболевания*.

- Первый и самый важный вопрос, особенно касающийся особей мужского пола, – имеются ли нарушения мочеиспускания? Ваши дальнейшие действия зависят именно от этого.
- Если нет нарушений мочеиспускания, то какой объем

мочи выделяется? (При выделении большого объема мочи можно подозревать нарушение функции почек, диабет или какое-либо другое заболевание.)

- Не отмечается ли специфический запах мочи в выдыхаемом воздухе?
- Нет ли рвоты?
- Не отмечались ли раньше подобные признаки заболевания, или это появилось впервые?
- Как выглядит моча? Нет ли примеси крови или слизи?
- Как часто происходит мочеиспускание?
- Не отмечается ли при мочеиспускании длительного или интенсивного натуживания?
- Нет ли у вашего питомца вялости или слабости?
- Нет ли признаков обезвоживания? Для определения степени обезвоженности у животных надо захватить пальцами кожную складку на спине, приподнять и сразу же отпустить. Быстрое расправление кожной складки означает, что дегидратация отсутствует. Если же кожная складка медленно возвращается в прежнее положение, то это указывает на состояние обезвоженности. Для сравнения такую же пробу можно провести у здорового животного (если возможно).

Следует немедленно обратиться к ветеринару:

- если вы не уверены, что правильно оценили состояние вашего питомца, а также если вы отмечаете вялость и слабость,
- если он взвизгивает как будто от боли (кошки при обструкции уретры издают специфические «скорбные» вопли. Многие ветеринары считают эти звуки особым симптомом, указывающим на наличие обструкции мочевыводящих путей. Эти звуки часто сочетаются с натуживанием при мочеиспускании, однако могут наблюдаться и изолированно),
- если симптомы развиваются на фоне рвоты.

Чаще всего подобные симптомы встречаются именно у котов, для которых вообще характерны заболевания мочевыводящих путей и почек.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару в следующих случаях:

- если у вашего питомца отмечаются признаки дегидратации и слабость,
- если вы отмечаете частое болезненное мочеиспускание,
- если раньше у вашего кота уже были симптомы обструкции мочевыводящих путей (обструкция мочевыводящих путей, особенно у котов, склонна к рецидивам),
- если вы отметили примесь крови или слизи в моче (если моча розоватого цвета, то экстренного обращения к ветеринару не требуется. В этом случае можно попытаться назначить гомеопатические средства самостоятельно и понаблюдать день-два за состоянием вашего питомца. Вполне возможно, что все нормализуется),
- если натуживание при мочеиспускании отмечается даже при голодании.

Кроме того, необходимо обратиться к ветеринару, если:

- состояние не улучшается через пару дней после назначения гомеопатического средства или коррекции диеты,
- у вашего питомца в предыдущие несколько месяцев уже отмечались подобные симптомы.

Постарайтесь выявить те *обстоятельства и условия*, которые способствуют появлению симптомов *цистита*:

- прием пищи,
- недавняя вакцинация,
- драки с другими котами-задирами,
- время суток (утро, до завтрака, ночь и т. п.).
- состояние тревожности или стресса у вас в доме.

Острый цистит (без обструкции мочевыводящих путей)

Если вы совершенно уверены, что у вашего питомца на фоне симптомов цистита нет обструкции мочевыводящих путей (т. е. нет препятствий к оттоку мочи) и его состояние в целом хорошее, то дайте ему поголодать в течение суток, предлагая только мясной бульон. Если состояние остается удовлетворительным, то такую диету можно продлить еще на два-три дня. Польза голодания заключается в том, что происходит значительное уменьшение нагрузки на почки по выведению продук-

тов метаболизма. Кроме того, жидкость, поступающая в организм в составе бульона, помогает «промыть» мочевой пузырь. Увеличенные дозы *витамина С* (10 мг/фунт веса животных 2–3 раза в день) способствуют повышению кислой реакции мочи, в результате чего происходит растворение кристаллов некоторых солей и устранение бактерий в мочевыводящих путях. Повышению кислой реакции мочи способствует также прием аминокислоты D-L-метионина (5–10 мг/фунт веса 2–3 раза в день). Если вам не удастся найти D-L-метионин, то можно использовать обычный L-метионин, который продается в большинстве аптек. Благотворным влиянием на мочевыводящие пути обладает клюквенный сок, однако животные, естественно, не будут пить его по своей воле; в некоторых случаях вместо натурального сока можно попытаться дать им капсулы крактина (*Cranactin*), содержащие концентрат клюквенного сока (четверть или половину капсулы на 10 фунтов веса животных 2–3 раза в день).

Гомеопатические средства при остром цистите

Aconitum napellus

При цистите, как и при других острых состояниях, назначение данного средства особенно эффективно на ранних стадиях заболевания. Иногда не удастся выявить иных симптомов, кроме учащенного мочеиспускания. Характерно беспокойство животных в сочетании с чувством страха.

Apis mellifica

Характерным симптомом данного средства является жжение после мочеиспускания, отсутствие жажды и «тепловровность». Отмечается либо беспокойство животных, либо их вялость в сочетании с безразличием к окружающим. Именно такой симптом, как безразличие, отличает их от животных *Pulsatilla*.

Arsenicum album

Назначение данного средства при цистите особенно эффективно в тех случаях, когда мочеиспускание учащается после полуночи. Животные с симптомами цистита обычно чрезвычай-

чайно беспокойны; ухудшение состояния отмечается при пребывании в одиночестве.

Cantharis

Это средство считается наилучшим при симптомах цистита у людей; логично было бы предположить, что у животных оно будет действовать также эффективно — но на самом деле мне крайне редко удавалось получить у них необходимый эффект. Однако у *Cantharis* действительно имеется тропность к заболеваниям мочевого пузыря. Для этого средства характерно сильное частое натуживание при мочеиспускании, а также боли в области мочеиспускательного канала и почек. После прекращения натуживания может произойти непроизвольное мочеиспускание. В моче часто отмечается примесь крови. На стенках влагалища при инструментальном обследовании можно иногда обнаружить пузыри с прозрачным содержимым; такие же пузыри могут быть и в полости рта.

Lycorodium clavatum

Ключевым симптомом данного средства является нарушение функции как мочевыводящей, так и пищеварительной системы. Конечно, данное средство назначается далеко не во всех подобных случаях, однако при сочетании симптомов со стороны пищеварительной и мочевыводящей систем в первую очередь следует подумать именно о назначении *Lycorodium*. В анамнезе у этих животных имеются указания на частые эпизоды диареи с отхождением значительного количества кишечных газов, однако в типичных случаях диарея и цистит проявляются как отдельные приступы заболевания. Для животных *Lycorodium* характерно робкое поведение в новых ситуациях и стремление лидировать в привычной обстановке. Им свойственно четкое понимание своего места в иерархических отношениях семьи, где они живут, — с теми, кто выше их «по положению», они послушны и покорны, однако склонны командовать теми, кого они считают ниже себя.

Mercurius (vivus, solubilis)

О назначении этого средства надо подумать в тех случаях, когда симптомы цистита сочетаются с диареей; в некоторых

случаях при натуживании мочеиспускание и дефекация происходят одновременно (для *Lycorodium* более характерно раздельное мочеиспускание и дефекация). Характерно выраженное натуживание, которое сохраняется после отхождении мочи и каловых масс. Как в моче, так и в фекалиях может быть примесь крови. Типичным симптомом является сильная раздражительность животных *Mercurius*, особенно в тех случаях, когда их заставляют подчиняться дисциплине. Для лечения особей мужского пола более подходит *Mercurius corrosivus*.

Nux vomica

О назначении данного средства следует подумать в тех случаях, когда симптомы цистита сопровождаются сильным натуживанием и частыми, но почти безрезультатными попытками мочеиспускания. В моче может быть примесь крови (однако это скорее общий, а не характерный симптом, так как примесь крови в моче встречается практически при всех случаях цистита). В анамнезе у этих животных часто наблюдается применение значительного количества аллопатических средств. Назначение *Nux vomica* эффективно при рецидивах цистита, особенно если раньше для лечения использовались антибиотики. Животные с симптомами этого препарата склонны к раздражительности и сварливости, хотя и не в такой степени, как животные *Mercurius*. Их состояние ухудшается на открытом воздухе и утром после пробуждения.

Pulsatilla

Назначение *Pulsatilla* при цистите часто бывает эффективным, особенно у особей женского пола. Характерно усиление позывов к мочеиспусканию в положении лежа. Другим характерным симптомом данного средства является непроизвольное мочеиспускание при испуге или возбуждении. У животных иногда трудно отметить этот симптом, однако он является несомненным указанием именно на *Pulsatilla*. Животные с симптомами этого средства обычно милые, ласковые и привязчивые; им нравится находиться на открытом воздухе, у них не выражена жажда. Подобно *Nux vomica*, *Pulsatilla* полезна животным с избыточным приемом аллопатических препаратов в анамнезе.

Sarsaparilla

Для данного средства характерно ухудшение всех симптомов в конце мочеиспускания, что проявляется в виде выделения крови или слизи после полного опорожнения мочевого пузыря и появления сильнейших болей. Боли могут быть настолько интенсивные, что животные взвизгивают при приближении позывов к мочеиспусканию. Особенным симптомом данного лекарства у людей является мочеиспускание только в положении стоя; у животных с симптомами *Sarsaparilla* может быть затрудненное мочеиспускание в обычной позе. Состояние, соответствующее этому средству, часто развивается после переохлаждения, особенно при сырой погоде.

Thlaspi bursa pastoris

Данное средство можно считать органоспецифичным, так как все симптомы *Thlaspi bursa pastoris* связаны с мочевым пузырем. Назначение этого препарата при хроническом цистите и склонности к образованию фосфатных камней часто бывает очень эффективным. Кроме того, считается, что назначение *Thlaspi* помогает устранить обструкцию мочеиспускательного канала. Осадок мочи часто имеет кирпичный цвет.

Thuja occidentalis

Наиболее эффективно назначение *Thuja* при циститах, которые возникают в связи с предшествующей вакцинацией. Может отмечаться отек уретры и симптомы легкого паралича мочевого пузыря, что затрудняет мочеиспускание. На первый взгляд может показаться, что эти симптомы у котов указывают на обструкцию мочевыводящих путей, однако при катетеризации выясняется, что уретра полностью проходима. Часто в подобных случаях отмечается скопление слизи в области наружного отверстия уретры.

Urtica urens

Данное средство чрезвычайно эффективно при цистите с частыми позывами к мочеиспусканию, при которых каждый раз выделяется незначительное количество мочи. Из-за постоянных позывов эти несчастные создания не могут даже отдохнуть. В моче содержатся кристаллы солей и иногда даже конк-

ременты из мочевого пузыря.

ОБСТРУКЦИЯ УРЕТРЫ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

Общая информация по этой теме изложена в разделе «Цистит» данной главы. При обструкции уретры и невозможности мочеиспускания у животных развивается тяжелое состояние, представляющее собой непосредственную угрозу их жизни. Во всех случаях обструкции мочеиспускательного канала требуется экстренная ветеринарная помощь. Некоторые гомеопатические препараты (см. раздел «Гомеопатические средства при обструкции уретры») в отдельных случаях помогают справиться с обструкцией уретры без катетеризации, причем следует назначать только одно из этих лекарств с интервалом несколько минут, но не более трех доз подряд. При общем неплохом состоянии вашего питомца и при отсутствии результата можно сразу же вслед за первым средством назначить другое. Если же в течение 10–15 минут эффекта не будет, то следует без промедления обратиться в ветеринарную лечебницу — длительное ожидание результата не только непорядочно по отношению к несчастному страдальцу, но еще и рискованно для его здоровья.

Однако катетеризация мочевого пузыря тоже не лишена определенного риска. Нередко эта манипуляция является единственной возможностью устранить препятствие для оттока мочи, однако при катетеризации у животных велика опасность повреждения уретры; кроме того, после катетеризации возрастает риск рецидива обструкции. Повторная обструкция может возникнуть сразу же после катетеризации вследствие посттравматического отека мочеиспускательного канала. В более поздние сроки обструкция может возникнуть из-за посттравматического рубцового сужения просвета уретры. Развитие рубцовых тканей представляет собой одно из главных осложнений катетеризации мочевого пузыря, имеющее крайне тяжелые последствия.

Рубцовое сужение уретры в некоторых случаях является причиной проведения у котов операции перинеальной уретростомии, при которой удаляется половой член и мошонка и в области тазового дна формируется наружное отверстие уретры

(по типу уретры у особей жеского пола). Таким образом, уретра становится короче и шире, что способствует беспрепятственному оттоку мочи. Конечно, это грубый и калечащий метод лечения, однако при наличии массивных рубцовых сращений уретры может быть единственным возможным выходом. Если нечто подобное предложат произвести вашему питомцу, то убедитесь, что все другие возможности его лечения исчерпаны.

Во многих случаях травма уретры происходит во время катетеризации, однако не менее травматичным методом является оставление на какой-либо срок постоянного катетера. Исходя из моего опыта я могу утверждать, что, чем дольше катетер находится в уретре, тем больше возрастает риск осложнений, в частности травматизации уретры и рецидива обструкции. Развитию осложнений также способствует грубое насильственное проведение этой манипуляции.

Если вашему питомцу произвели катетеризацию мочевого пузыря, то сразу же после этого назначьте ему дозу *Staphysagria*. Это средство поможет уменьшить воспаление канала после его травматизации. У многих котов после катетеризации сразу же развивается реобструкция из-за посттравматического отека, которая напоминает блокаду мочеиспускательного канала за счет «песка», т. е. осадка мочи. Это состояние может облегчить назначение *Staphysagria* или в некоторых случаях *Thuja*.

Гомеопатические средства при обструкции уретры

Coccus cacti, Nux vomica, Thlaspi bursa pastoris

Если состояние вашего питомца относительно неплохое, то можно попробовать назначить одно из этих средств с интервалом в 5–10 минут, но не более трех доз. Если же в течение часа вы не увидите эффекта, то, конечно, непременно отвезите вашего питомца в ветеринарную лечебницу. Показания для назначения этих препаратов примерно одинаковые; при обструкции уретры дайте вашему коту то лекарство, которое у вас имеется. Скорее всего в вашей домашней аптечке найдется *Nux vomica*, т. к. *Coccus* и *Thlaspi* найти в аптеках достаточно трудно. *Thlaspi bursa pastoris* представляет собой гомеопатическое средство из травы пастушья сумка; если у вас нет *Thlaspi*, то дайте

вашему коту несколько капель настоя или аптечной тинктуры пастушьей сумки — возможно, его состояние удастся облегчить до того, как вы отвезете его к ветеринару. У *Coccus cacti* имеется специфическое показание к назначению — обструкция уретры сгустком крови; если у вашего питомца именно такой тип обструкции, то назначьте *Coccus* в первую очередь.

ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Почечная недостаточность развивается в тех случаях, когда отмечается гибель от 50 до 75% клеток почечной паренхимы. Ткань почек обладает минимальными способностями к регенерации, поэтому гибель клеток означает утрату их функции. Однако начальные стадии нарушения функции почек протекают, как правило, незаметно, так как оставшиеся функционирующие клетки продолжают выполнять весь необходимый объем работы. (Ветеринары-аллопаты считают, что почечная недостаточность проявляется после гибели 75% клеток почечной паренхимы, т. е. тогда, когда лабораторные показатели функции почек начинают превышать нормальные значения. Однако, по моему мнению, мы можем распознать и субклинические формы почечной недостаточности, когда лабораторные показатели еще только подходят к верхней границе нормы. Стабильность показателей на уровне верхней границы нормы указывает на раннюю стадию почечной недостаточности. Я думаю, что верхняя граница некоторых показателей функции почек у кошек явно завышена, и на эти показатели при проведении обследования следует обращать самое пристальное внимание.) О клинической стадии почечной недостаточности мы говорим в тех случаях, когда показатели крови, отражающие функциональную способность почек, стабильно превышают верхнюю границу нормы. Однако у животных период времени от первых клинических проявлений до финальной стадии почечной недостаточности может быть различным.

Основными симптомами почечной недостаточности являются потеря веса, снижение аппетита, усиление жажды и увеличение объема выделяемой мочи (в некоторых случаях острой почечной недостаточности жажды может и не быть; иногда

анурия развивается очень быстро). По мере прогрессирования заболевания выявляются признаки интоксикации, одним из которых является изъязвление слизистой оболочки полости рта. Этот симптом имеет решающее значение – появление изъязвлений означает, что нарушение функции почек зашло так далеко, что без соответствующего лечения животные смогут прожить считанные дни. Опытные ветеринары распознают ранние стадии почечной недостаточности у животных только на основании клинической картины, однако все же следует подтвердить диагноз лабораторными анализами.

Основными показателями крови, на которые следует ориентироваться при оценке функции почек, являются уровень мочевины крови и уровень креатинина. Мочевина представляет собой продукт расщепления белков в организме, который выводится почками; уровень мочевины при развитии патологии почечной ткани повышается очень быстро. Креатинин является продуктом биохимических процессов, которые происходят при сокращении мышц, и тоже выводится только почками. При почечной недостаточности уровень креатинина также повышается, но это происходит достаточно медленно по сравнению с уровнем мочевины. В целом уровень креатинина крови более адекватно отражает нарушение функции почек. Показатели мочевины и креатинина варьируют в зависимости от принятого метода исследования. В норме уровень мочевины у собак составляет 10–25 мг/100 мл крови, у кошек 10–30 мг/100 мл. Уровень креатинина составляет 1–2 мг/100 мл крови и у кошек, и у собак.

Особенности наблюдения и лечения животных с почечной недостаточностью

Все животные с почечной недостаточностью должны находиться под постоянным наблюдением ветеринара, так как диагностика и лечение этого состояния у животных весьма затруднительны. Если у вашего питомца появились симптомы, которые могут указывать на предполагаемое нарушение функции почек, то не следует откладывать надолго обращение в ветеринарную лечебницу.

Экстренное обращение к ветеринару необходимо в следующих случаях:

- если на фоне симптомов, указывающих на возможное нарушение функции почек, у вашего питомца обнаруживаются изъязвления слизистой оболочки полости рта и сильный специфический запах изо рта,
- если ваш питомец перестал пить воду и у него отсутствует моча,
- если развивается вялость и слабость.

Следует непременно обратиться в ветеринарную лечебницу, если вы наблюдаете резкое усиление жажды, нарастание продукции мочи (полиурия) или другие симптомы, на основании которых можно предполагать развитие почечной недостаточности.

Несмотря на то, что почечная недостаточность фатальное, т. е. смертельное заболевание, его течение обычно не очень быстрое; в некоторых случаях удастся несколько притормозить развитие патологического процесса. Назначение гомеопатических средств в подобных случаях может принести значительную пользу, однако лучше всего обратиться к ветеринару-гомеопату, по крайней мере на ранних стадиях заболевания. Полезным является также назначение некоторых дополнительных лекарственных средств и фитопрепаратов. При хронической почечной недостаточности гомеопатические средства можно назначать на фоне проводимого лечения по назначениям ветеринара.

Острая почечная недостаточность (ОПН) является исключением – в этих случаях жизнь вашего питомца может спасти только интенсивная инфузионная терапия, которая проводится, как правило, в ветеринарном стационаре. При ОПН назначение гомеопатических средств также приносит значительную пользу, однако не заменяет экстренной дезинтоксикационной терапии.

Общие мероприятия при лечении почечной недостаточности у животных заключаются в назначении соответствующей диеты, дополнительных лекарственных средств и регулярной инфузионной дезинтоксикационной терапии. В подобных случаях инфузионная терапия применяется не для восстановления объема циркулирующей крови, а скорее для обеспечения необходимой циркуляции крови и питания тканей и органов. Кроме того, ин-

фузионная терапия способствует элиминации токсинов из крови за счет увеличения кровотока почек и повышения количества экскретируемой мочи. Инфузионная терапия представляет собой существенный аспект лечения; ее необходимо проводить даже тогда, когда никаких признаков дегидратации у животных не отмечается. Улучшение состояния вашего питомца будет непосредственно зависеть от того, насколько регулярно и эффективно проводится инфузионная терапия. Я хотел бы дать несколько рекомендаций по проведению инфузионной терапии в домашних условиях; эти рекомендации основаны на моем достаточно большом опыте. Однако многие ветеринары считают недопустимым домашнее проведение этих мероприятий.

Обычно инфузионная терапия проводится внутривенно, однако в ветеринарии более распространено подкожное введение жидкостей. Это несложная манипуляция, и при необходимости любой человек может этому научиться, если пару раз понаблюдает, как это делает профессионал. Часто польза от подкожного введения жидкостей сводится к нулю за счет стресса, который испытывают животные при транспортировке в ветеринарную лечебницу (кошки по сравнению с собаками более подвержены действию различных стрессовых факторов, однако именно у кошек намного чаще развивается хроническая почечная недостаточность [ХПН]). Естественно, что для подкожного введения используются специальные растворы, приготовленные только в аптеке.

Инфузионная терапия при ХПН обычно назначается или ежедневно, или через день, однако в зависимости от течения заболевания частота инфузий варьирует от одного раза в неделю до двух раз в день в тяжелых случаях. Наиболее эффективно подкожное введение жидкостей у кошек, но при необходимости этот метод можно использовать и у собак. У кошек объем инфузий чаще всего составляет 100 мл, хотя некоторые ветеринары рекомендуют вводить больший объем. Я думаю, что в данном случае решающее значение имеет регулярность проведения инфузий, а не объем вводимой жидкости. По моему мнению, объем инфузии в 100 мл для кошек является вполне адекватным.

Одним из самых важных факторов является введение теплых растворов. У кошек с ХПН обычно отмечается снижение

внутреннего тепла, поэтому для них введение теплых растворов имеет особое значение. Введение холодных растворов может ухудшить их состояние, даже если животные находятся в достаточно теплом помещении. К сожалению, многие ветеринары не учитывают этот важный момент. Подогревание растворов проводится при их погружении в емкость с теплой водой на 10–15 минут; таким же образом следует согреть и стерильную упаковку с системой для подкожного введения, поместив ее в теплую воду (не вскрывая, конечно), — раствор для инфузии может охладиться в тот момент, когда проходит по холодной трубке.

На начальных этапах лечения ХПН я обычно рекомендую ежедневное введение растворов (в очень редких случаях — двукратную ежедневную инфузионную терапию); после улучшения состояния животных частоту инфузий можно сократить, ориентируясь на такие показатели общего состояния, как активность и аппетит. На ранних стадиях развития ХПН во многих случаях вполне достаточно еженедельного однократного проведения инфузий, однако по мере прогресса заболевания их следует проводить чаще. Большинство кошек постепенно привыкают к такому «насилию» над их организмом и вполне спокойно это терпят. Введение теплых жидкостей благотворно влияет на их организм; вполне возможно, они просто запоминают, что им стало легче после этой манипуляции, и в дальнейшем подчиняются без особых проблем.

Важным аспектом лечения животных с почечной недостаточностью является диета. К сожалению, многие ветеринары не обращают на это должного внимания. По моему глубокому убеждению, наилучшим питанием для животных является приготовленная в домашних условиях пища с обязательным содержанием сырого мяса. Однако организм животных с ХПН (особенно старых животных) часто не справляется с сырым мясом, особенно если питание животных до заболевания имело иной характер. В подобных случаях я рекомендую постепенный и плавный переход к диете на основе сырого мяса; если же животные не справляются с ним, то следует давать им мясо в вареном виде.

Вопрос о количестве белка в пище животных с почечной недостаточностью до сих пор остается спорным. Обычно счита-

ется, что при развитии почечной недостаточности количество белка в рационе должно быть значительно уменьшено. Однако, по моему мнению, для большинства животных ограничения количества протеинов в пище не требуется. На самом деле уменьшение количества белка в пище мало влияет на течение заболевания. Фактически же ограничение потребления протеинов может привести к снижению функции почек, так как уровень клубочковой фильтрации (т. е. количество крови, которое проходит по сети сосудов почки и подвергается фильтрации) во многом определяется уровнем белка в крови; уменьшение белка способствует снижению фильтрационной способности почек. В свою очередь, при уменьшении объема фильтрации снижается экскреция токсинов с мочой (у крыс, например, повышение уровня протеинов крови усиливает фильтрацию, а ограничение белка в пище предупреждает дальнейшее развитие почечной недостаточности¹. Подобные исследования у кошек и собак не проводились, однако данные исследований у крыс почему-то являются обоснованием для ограничения белка в пище кошек и собак с ХПН. Мне это кажется не совсем правильным, так как кошки и собаки по природе своей хищники, а крысы – травоядные; эта разница в необходимом уровне потребления белка существенна и ее следует принимать во внимание).

Некоторые токсины, которые экскретируются почками (например, мочевины), представляют собой продукты метаболизма протеинов. Таким образом, при повышении количества протеинов в пище процесс фильтрации в почках усиливается, что приводит к усилению элиминации всех токсических веществ из организма. В норме эти процессы протекают сбалансированно, однако при снижении функции почек до определенного уровня экскреция токсических продуктов начинает снижаться. Ограничение белка в пище животных с почечной недостаточностью требуется только в тех случаях, когда вследствие уменьшения экскреции токсинов они начинают накапливаться в организме, что приводит к развитию интоксикации. Ограничение потребления белка на этой стадии только минимизирует симптомы, однако не оказывает влияние на поражение почечной ткани. Симптомы интоксикации проявляются в виде тошноты, плохого аппетита, образования язвочек слизистой оболочки и ухудшения общего состояния.

При развитии подобных симптомов уменьшение количества белка в пище и кормление высококачественными белковыми продуктами может уменьшить в некоторой степени явления интоксикации.

Когда же следует ограничить белки в пищевом рационе? В сущности, это необходимо только на той стадии заболевания, когда сами продукты белкового обмена ухудшают течение болезни, однако эти признаки варьируют у разных животных. Практически всегда мы ориентируемся на данные лабораторных исследований. Если уровень мочевины не больше 80 мг/100 мл крови, уровень креатинина не больше 2,5 мг/100 мл и не отмечается увеличения фосфатов в плазме, то потребление белка можно не ограничивать. Данное исследование следует проводить только при отсутствии дегидратации у животных, так как уменьшение объема циркулирующей жидкости фальсифицирует результаты². В любом случае следует опираться на развитие симптомов заболевания. До развития признаков интоксикации, т. е. на начальных стадиях заболевания, ограничение протеинов в пище нецелесообразно.

Важным фактором является не только общее количество белка пищи, но и качественный состав белка, а также количество калорий, которые организм больных животных может получить из небелковых источников. Как вы уже знаете, причиной интоксикации при почечной недостаточности является накопление в организме продуктов белкового обмена, которые почки не могут элиминировать с мочой. Накопление этих токсических веществ в первую очередь зависит от того, насколько эффективно происходит расщепление этих белков в процессе переваривания пищи.

Источником высококачественных протеинов являются, например, куриные яйца — этот тип протеинов легко переваривается и расщепляется до аминокислот с образованием минимального количества продуктов метаболизма. В дальнейшем из аминокислот организм синтезирует собственные белки, причем на этот процесс затрачивается сравнительно мало энергии, а также образуется небольшое количество продуктов метаболизма, подлежащих удалению. Если в пище содержится недостаточное количество небелковых источников энергии — т. е. жиров и углеводов, то в качестве источника энергии орга-

низм начинает расходовать собственные белки; в результате этого процесса, в отличие от синтеза белков, образуется значительное количество токсических продуктов метаболизма, что резко увеличивает нагрузку на почки.

На ранних стадиях почечной недостаточности в пище больных животных должно содержаться достаточное количество высококачественных белков, жиров и углеводов. Например, раньше эскимосы употребляли в пищу практически только мясо, однако это не отражалось на состоянии их здоровья, так как мясо содержало значительное количество жира. При рационе питания с ограничением жира состояние здоровья эскимосов существенно ухудшалось вплоть до смертельных исходов. Как показали исследования, при отсутствии жиров в рационе питания организм получал энергию за счет расходования собственных белков, причем этот процесс сопровождался накоплением значительного количества продуктов распада³. Источником высококачественных протеинов являются яйца, молоко, деревенский сыр и йогурт. В мясе содержатся менее питательные белки, однако мясо кур и индеек более качественное, чем обычная говядина.

При почечной недостаточности у животных необходимо применять некоторые дополнительные лекарства и вещества. Функция почек во многом зависит от наличия в крови достаточного количества бикарбоната; добавление в пищу больных животных некоторого количества соды может несколько облегчить их состояние. При полиурии, т. е. экскреции значительного количества мочи на начальной стадии заболевания, из почечной ткани вымывается значительное количество бикарбонатов, которое и восполняется при приеме соды с пищей. Для кошек вполне достаточно маленькой щепотки соды один раз день, для собак – четверти чайной ложки. Не менее важно, чтобы с пищей животные получали достаточное количество кальция, который связывает в плазме фосфаты (при ХПН у животных уровень фосфатов плазмы имеет тенденцию к повышению). Однако избыток кальция вреден, поэтому при приготовлении домашней пищи необходимо соблюдать рецептуру; не следует в пищу больных животных добавлять костную муку – в ней содержится значительное количество фосфора.

При заболеваниях почек у животных полезны настои таких

трав, как люцерна, крапива и одуванчик. Настои этих трав готовятся обычным способом и назначаются из расчета половина пипетки на 10 фунтов веса животных 3 раза в день. В соответствии с принципами аюрведической медицины питание ткани почек улучшается при применении таких веществ, как цветочная пыльца, собранная пчелами, маточное молочко пчел и топленое масло из молока буйволицы. В пищу животных можно добавлять щепотку этих веществ и четверть чайной ложки топленого масла (топленое масло является также хорошим источником энергии). Если вам удастся купить этот специфический продукт, то непременно убедитесь, что он свежий, так как этот продукт не подлежит длительному хранению.

Топленое масло вы можете изготовить самостоятельно — для этого надо взять несоленое сливочное масло и перетопить его при невысокой температуре, пока не выпарится вода и не выпадет осадок, затем полученную массу надо процедить и после охлаждения хранить в холодильнике (для длительного хранения его можно заморозить в морозильной камере). Топленое масло обладает не только лечебными, но и хорошими гастрономическими свойствами (более подробную информацию можно найти в кулинарной книге «*Sundays at Moosewood Restaurant*», издательство *Fireside/Simon & Schuster*).

Острая почечная недостаточность

В редких случаях у животных развивается острая почечная недостаточность с полным прекращением деятельности обеих почек, при этом отмечается острый отек паренхимы с прекращением экскреции мочи. При развитии ОПН животные перестают потреблять даже минимальные количества жидкости. Для острой почечной недостаточности характерно быстрое нарастание интоксикации и стремительное ухудшение состояния. Острая почечная недостаточность может развиваться спонтанно в ответ на введение некоторых лекарственных препаратов и вакцин, а также вследствие отравления, чаще всего отравления антифризом. Антифриз (этиленгликоль) крайне токсичен для почек, однако животным почему-то нравится его вкус. Антифриз вызывает необратимое поражение паренхимы почек; если вдруг вы увидите, как ваш питомец пытается вылакать некоторое количество этого яда, то *следует в экстрен-*

ном порядке обратиться в ветеринарную лечебницу, не тратя времени на какие-либо действия, — только это еще может спасти его жизнь.

В настоящее время некоторые ведущие компании начали выпускать антифриз на основе других, менее токсичных веществ, например на основе пропиленгликоля. Первой компанией, которая начала выпускать более безопасные виды антифриза, является компания *Sierra*.

Обычно острая почечная недостаточность диагностируется ветеринарами. Лечение проводится в ветеринарном стационаре и заключается в массивной дезинтоксикационной терапии и назначении диуретиков. Применение гомеопатических средств может также принести определенную пользу, однако не заменит ветеринарной помощи и интенсивной терапии. Даже при благоприятном стечении обстоятельств лечение данной патологии представляет собой очень трудную задачу.

Гомеопатические средства для лечения острой почечной недостаточности

Гомеопатические средства, описанные в данном разделе, следует применять в наивысшей потенции, которую только удастся достать. Повторяйте дозу средства каждые 2–4 часа до тех пор, пока не начнется выделение мочи. Гомеопатическое лечение в данном случае должно проводиться на фоне интенсивной дезинтоксикационной терапии. Наблюдение ветеринара при патологии такого рода является обязательным.

Apis mellifica

Данное средство полезно при отеке любой локализации; кроме того, назначение *Apis mellifica* эффективно при аутоиммунных заболеваниях. Таким образом, при острой почечной недостаточности назначение данного средства вполне целесообразно. Животные *Apis* обычно не испытывают жажды, у них избыток внутреннего тепла и желание холода.

Arsenicum album

У данного средства выражена тропность к заболеваниям почек. Несмотря на то, что обычно я назначаю *Arsenicum* при хронической почечной недостаточности, его назначение в острых

случаях также вполне оправданно. Большим плюсом является распространенность и доступность этого лекарства — ведь острая почечная недостаточность развивается внезапно и требует экстренной помощи. У животных с симптомами *Arsenicum* отмечаются жажда, озноб и беспокойство, все симптомы обычно ухудшаются после полуночи. По мере прогрессирования заболевания и усиления слабости жажда может уменьшиться.

Eucaliptus

Назначение данного средства эффективно при сочетании воспаления почечной ткани с очагом инфекции в организме. У животных с симптомами этого препарата в моче обычно отмечается слизь или гной.

Nitri spiritus dulcis

Считается, что у людей назначение данного средства наиболее эффективно при почечной недостаточности, возникшей после скарлатины. У животных следует подумать о назначении *Nitri spiritus dulcis* в тех случаях, когда острая почечная недостаточность развивается после любых лихорадочных заболеваний. Применение данного препарата ограничено из-за того, что он имеется далеко не во всех гомеопатических аптеках.

Picricum acidum

Назначение данного препарата при острой почечной недостаточности также может быть полезным. У животных *Picricum acidum* отмечается выраженная слабость и истощение; при их движении создается впечатление, что конечности у них отяжелили. Данное средство, как и *Nitri spiritus dulcis*, найти в гомеопатических аптеках достаточно трудно.

Serum anguillae (Eel serum)

Если вам удастся быстро найти это средство, то при острой почечной недостаточности следует его назначить в первую очередь. Сыворотка угря обладает специфическим воздействием на почки и вызывает острую почечную недостаточность. Соответственно гомеопатическое лекарство из сыворотки угря может прервать развитие почечной недостаточности и успешно используется при гомеопатическом лечении ОПН у людей. Раз-

личие между *Apis* и *Serum anguillae* заключается в том, что для *Apis* характерно наличие отеков, чаще всего в области конечностей или морды, а для *Serum anguillae* отеки не характерны.

Хроническая почечная недостаточность

В случаях хронической почечной недостаточности животных можно лечить в домашних условиях в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Особенности наблюдения и лечения животных с почечной недостаточностью». Для поддержания функции почек можно использовать одно из следующих гомеопатических средств.

Гомеопатические средства при хронической почечной недостаточности

Arsenicum album

Полезность *Arsenicum* у животных с заболеваниями почек который раз подтверждает его замечательные лечебные свойства. Ключевыми симптомами *Arsenicum* являются жажда и зябкость, характерные для животных с ХПН. Животные с симптомами этого средства обычно беспокойны; их состояние ухудшается после полуночи. Характерным симптомом *Arsenicum* у кошек с ХПН является жажда, однако после питья воды у них начинается тошнота – иногда можно увидеть, как кошки раскачивают головой над миской с водой, но при этом до воды даже не дотрагиваются. В некоторых случаях у кошек наблюдается подобное отношение и к пище. Их поведение указывает на чувство голода, однако едят они очень мало.

China

Ключевым показанием для назначения *China* является крайняя слабость из-за потери физиологических жидкостей; таким образом, это лекарство во многом соответствует картине хронической почечной недостаточности. Гомеопатическое средство *China* готовится из настойки коры хинного дерева, действующим компонентом которой является хинин. Однако наилучший эффект мне удалось получить от назначения солей хинина.

Chininum arsenicosum

Картина симптомов данного средства (сочетание *Chininum* и *Arsenicum*) соответствует симптомам ХПН у многих животных. Чаще всего симптомы ХПН напоминают картину *Arsenicum*; однако, если у животных не наблюдается ответной реакции на назначение *Arsenicum*, то я назначаю *Chininum arsenicosum*. Если нет других указаний, то именно это средство я назначаю кошкам с ХПН в первую очередь.

Chininum muriaticum

Данное лекарство назначается еще реже, чем *Chininum arsenicosum*, поэтому его достаточно сложно найти. Симптомы *Chininum muriaticum* напоминают симптомы *Chininum arsenicosum* и симптомы *Natrum muriaticum*. В тех случаях, когда нет ответной реакции на назначение *Natrum muriaticum*, следует рассмотреть возможность назначения *Chininum muriaticum*.

Chininum sulphuricum

В картине данного средства отмечаются симптомы *Sulphur* и *Chininum*. Если нет ответной реакции на назначение *Sulphur*, то следует подумать о назначении *Chininum sulphuricum*.

Mercurius (vivus, solubilis)

Назначение данного средства эффективно на той стадии заболевания, когда появляются изъязвления слизистой оболочки полости рта, в частности в области десен. Животные с симптомами этого препарата обычно очень раздражительные и предпочитают одиночество.

Natrum muriaticum

Данное лекарство готовится из поваренной соли. Назначение его полезно во многих случаях ХПН. При приеме соли возникает жажда; в соответствии с принципом гомеопатии «подобное лечится подобным», назначение *Natrum muriaticum* полезно тем животным, которые испытывают жажду — именно жажда характерна для большинства животных с ХПН. Животные *Natrum muriaticum* скорее «теплокровные», избегают прямых солнечных лучей и предпочитают одиночество; они не любят также проявлений ласки и внимания.

Sulphur

Данное средство представляет собой полихрест, необычайно полезный при лечении многих состояний. Назначение *Sulphur*, как правило, эффективно у вялых животных неопрятного вида, которые не считают нужным заботиться о своей внешности должным образом. Этот симптом крайне редко встречается у кошек. Обычно у животных *Sulphur* отмечается избыток внутреннего тепла, однако при развитии хронической почечной недостаточности они становятся «холоднокровными», поэтому не следует отказываться от назначения данного средства, если ваш кот постоянно стремится к теплу. У животных *Sulphur* с ХПН не настолько выражено желание тепла, как у животных *Arsenicum* (которые льнут к горячей плите и т. п.) — они просто избегают холодных мест. Эти животные испытывают сильную жажду, однако у них обычно плохой аппетит. С животными *Sulphur* всегда легко общаться, они дружелюбны и, как правило, у них хорошее настроение.

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

Некоторые животные страдают недержанием мочи, которое проявляется обычно в состоянии сна и расслабленности. Особенно часто это состояние встречается у особей женского пола после удаления яичников. Не исключено, что причиной такого состояния является и дефицит эстрогенов, так как прием соответствующих гормональных средств позволяет контролировать эту проблему (но не излечивает недержание мочи!). Обычно собакам с недержанием мочи назначается диэтилстилбэстрол — страшное по своим последствиям «лекарство», которое вызывает массу нарушений в организме беременных женщин (в том числе рак шейки матки). Очевидно, что следует всячески избегать назначения этого «лекарства» животным. При необходимости гормонального лечения и отсутствии эффекта от гомеопатии и акупунктуры следует предпочесть диэтилстилбэстролу другое, более современное средство, обладающее неплохим действием, — фенилпропаноламин (*Phenylpropanolamine*). Однако не следует назначать это лекарство по собственному усмотрению — лучше всего обратиться к ветеринару за инструкциями.

Дефицит эстрогенов в организме, возникающий после удаления яичников, может действительно вызывать недержание мочи, однако этим заболеванием страдают далеко не все особи женского пола, которым была произведена подобная операция. Скорее всего имеется еще ряд факторов, которые влияют на работу сфинктеров и о которых мы пока ничего не знаем. Возможно, что на появление недержания мочи у особей женского пола влияет слишком раннее удаление яичников, однако мне неизвестны исследования, которые подтверждали бы это предположение. В последнее время наметилась тенденция проводить удаление яичников у особей женского пола в возрасте всего лишь 6–8 недель, а не в 6–8 месяцев, как обычно. Я не думаю, что это правильно; неудивительно, если в ближайшее время мы отметим увеличение числа случаев недержания мочи и других осложнений (см. также гл. 14 «Репродуктивная система»).

В соответствии с принципами традиционной китайской медицины по средней линии тела проходит очень важный энергетический канал – срединный меридиан. При проведении операции по удалению яичников разрез проводится по срединной линии как раз в зоне этого важнейшего меридиана, вблизи той точки, которая используется при иглотерапии по поводу расстройств урогенитальной сферы. Возможно, что при проведении срединного разреза (который к тому же проводится в периоде повышенной уязвимости организма) возникает энергетический дисбаланс, вследствие которого и возникает недержание мочи. Какой бы ни была причина недержания мочи у особей женского пола, прежде чем назначать гормональные лекарства, целесообразно провести гомеопатическое лечение и курс иглорефлексотерапии.

Особенности наблюдения и лечения животных с недержанием мочи

Прежде всего при недержании мочи у собак необходим осмотр ветеринара для конкретизации причины этого состояния. В некоторых случаях причиной ночного недержания мочи может быть полиурия (т. е. увеличение объема экскретируемой почками мочи). Вполне возможно, что соответствующее лечение, направленное на устранение причины этого состояния, поможет справиться с заболеванием.

Если при обследовании вашего питомца не выявляется каких-либо хронических заболеваний, то экстренного лечения данного состояния не требуется. Исключение составляют обширные участки раздражения кожи в области наружного отверстия мочеиспускательного канала и влагалища, которые образуются при постоянном подтекании мочи – применение мази с *Calendula* позволит ускорить заживление раздраженных участков кожи. Кроме того, необходимо часто менять подстилку животным и содержать в чистоте те места, где они привыкли лежать.

Наилучшим методом лечения недержания мочи является применение гомеопатических конституциональных средств, однако вначале можно попытаться назначить один из рекомендуемых препаратов. Шансы на успех возрастут в том случае, если психические симптомы вашего питомца будут соответствовать картине симптомов выбранного вами средства.

Гомеопатические средства при недержании мочи

Bryonia

У животных с симптомами этого средства практически все заболевания ухудшаются от движения. Назначение *Bryonia* может быть полезным, если у собаки отмечается подтекание мочи во время прогулки (в большинстве случаев недержание мочи у собак отмечается в покое).

Causticum

При недержании мочи это лекарство назначается достаточно редко. Назначение *Causticum* обычно эффективно при выраженной мышечной слабости и переутомлении в сочетании с зябкостью животных. Это средство полезно при недержании мочи у старых, дряхлых животных с выраженной слабостью.

Kreosotum

Данное средство чрезвычайно эффективно у детей с ночным недержанием мочи; в редких случаях *Kreosotum* полезен при недержании мочи у собак. Однако эти состояния трудно называть эквивалентными, так как у детей ночной энурез возникает чаще всего на основе эмоциональных нарушений, а у собак причиной недержания мочи являются гормональные измене-

ния. О назначении *Kreosotum* следует подумать в том случае, когда создается впечатление, что причиной недержания мочи послужил стресс либо эмоциональные нарушения. Характерным симптомом данного средства является раздражающее действие мочи на кожу.

Nux moschata

Данное средство особенно полезно у животных со слабостью психической сферы, которые могут растеряться в привычной обстановке. Характерная особенность *Nux moschata* — тропность к заболеваниям женских половых органов и гормональным нарушениям, в том числе и недержанию мочи. У этих собак отсутствует жажда несмотря на сухость слизистых оболочек; иногда они стоят над миской с водой и раскачивают головой, однако не прикасаются к ней.

Pulsatilla

У животных с симптомами данного препарата отмечается выраженная слабость сфинктеров, которая приводит к недержанию мочи. У людей с симптомами *Pulsatilla* возможно выделение нескольких капель мочи при испуге или громком смехе. У собак отмечается отделение мочи при возбуждении, а также во время сна и в покое. Данное средство, как и *Nux moschata* и *Sepia*, полезно при заболеваниях женских половых органов. Животные с симптомами данного лекарства ласковые и привязчивые, часто требуют внимания.

Sepia

Животные с симптомами данного средства склонны к некоторой холодности и безразличию по отношению к окружающим. Характерной особенностью является выраженная зябкость; кроме того, у животных *Sepia* часто развивается недержание мочи вследствие нарушения гормонального баланса.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

В редких случаях причиной недержания мочи у животных является травматическое повреждение пояснично-крестцово-

го отдела позвоночника с поражением спинномозговых нервов, которые иннервируют мышцы мочевого пузыря и прямой кишки. Такой вид травмы чаще встречается у кошек при отрыве хвоста, который сопровождается неполным или полным разрывом спинномозговых нервов и приводит к полному или частичному (временному) параличу мышц мочевого пузыря. Наиболее частой причиной отрыва хвоста является автотравма, когда кошка убегает от надвигающегося на нее автомобиля, но колесо все же наезжает ей на хвост.

Hypericum perforatum

Hypericum является замечательным препаратом при повреждении нервной ткани и нервных стволов. Мне удалось получить хорошие результаты при назначении данного средства у кошек с отрывом хвоста — контроль за деятельностью тазовых органов восстановился полностью.

Костно-мышечная система (органы движения)

Функции

Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями костно-мышечной системы

Артрит, дисплазия тазобедренного сустава, спондилит

Заболевания межпозвонковых дисков

Заболевания костно-мышечной системы в периоде роста (в основном у собак)

Наностеит

Гипертрофическая остеодистрофия

Расслаивающий остеохондрит

Рахит

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса

Травматические повреждения костно-мышечной системы

Переломы костей

Растяжения мышц и связок

Разрывы мышц

ФУНКЦИИ

Костно-мышечная система обеспечивает возможность передвижения животных – именно эта способность и отличает животных от растений, предоставляя им огромное преимущество в плане выживания. Если животные не могут найти себе пищу или убежище, то благодаря мобильности они по крайней мере могут отправиться на поиски того и другого. Способность свободного передвижения связана в основном с отсутствием корневой системы – в поисках пищи животные перемещаются в ареале своего обитания, а не зарываются в почву корнями, как растения. Таким образом, выживание животных прямо зависит от функции костно-мышечной системы – по крайней мере так обстояло дело в недалеком прошлом.

В этом отношении особой разницы между двумя видами, т. е. между кошками и собаками, не отмечается. Когда животные вынуждены сами искать себе пропитание, то возможность выживания целиком и полностью зависит от функции костно-мышечной системы: отсутствие возможности передвижения означает отсутствие пищи. И если выживание домашних животных не в такой степени зависит от степени их мобильности, то выживание животных, выполняющих определенную работу, все же в значительной степени зависит от их способности к передвижению. Для тех животных, основная «работа» которых состоит в поддержании и укреплении дружеских отношений с людьми, нормальная функция костно-мышечной системы означает возможность гулять и играть на свежем воздухе, не испытывая при этом болевых ощущений. К огромному сожалению, эта способность у многих домашних животных ограничена из-за заболеваний органов движения и выраженной болезненности. Хронические заболевания органов движения (например, артриты различной локализации, дисплазия тазобедренного сустава и т. п.) составляют значительную часть всех хронических заболеваний у животных. Чаще всего заболевания органов движения являются проявлением глубоких нарушений в организме, поэтому их лечение следует доверить профессионалу-гомеопату. Однако ряд гомеопатических средств, действие которых мы подробно рассмотрим в данной главе, помогут облегчить боли у ваших питомцев.

Наблюдение за животными с различными заболеваниями костно-мышечной системы и назначение гомеопатического лечения основано на одних и тех же принципах — именно эти принципы мы обсудим в следующем разделе. Специфические рекомендации при лечении отдельных заболеваний представлены в соответствующих разделах.

ОСОБЕННОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Большинство заболеваний органов движения у животных (за исключением травматических повреждений) имеют относительно доброкачественное течение и не представляют собой непосредственной угрозы для жизни. Поскольку доминирующим симптомом хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата являются боли, чаще всего экстренного обращения к ветеринару не требуется. Тем не менее при наличии интенсивных болей у вашего питомца не следует надолго откладывать обследование — постарайтесь как можно быстрее выяснить причину болевого синдрома. Особенно важно выявить причину болей у животных молодого возраста, а также в тех случаях, когда боли локализуются в области спины и шейного отдела позвоночника. Собаки страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата значительно чаще, чем кошки.

Не следует полностью лишать животных с заболеваниями костно-мышечной системы физической активности — за исключением тех случаев, когда ваши питомцы страдают из-за интенсивных болей. В основном при хронических заболеваниях органов движения у животных поражается костная, а не мышечная система, поэтому вполне допустимы легкие физические нагрузки в виде прогулок на свежем воздухе — они способствуют укреплению мускулатуры и более быстрому заживлению костных поражений. При ряде заболеваний опорно-двигательного аппарата очень полезен массаж — он способствует улучшению микроциркуляции в зоне поражения и помогает сохранить гибкость и необходимый объем движений в суставах. Кроме того, в некоторых случаях наблюдается хороший

эффект при применении теплых ванн и компрессов. При лечении всех заболеваний опорно-двигательного аппарата у животных чрезвычайно полезными методами являются иглоукалывание (акупунктура) и хиропрактика (мануальная терапия). Если ваш питомец страдает подобными заболеваниями и вы знаете ветеринара, обладающего навыками акупунктуры или хиропрактики, то я бы рекомендовал вам непременно обратиться к этому специалисту. Во многих случаях «человеческие» врачи-хиропрактики также не отказываются помочь животным. По моему мнению, иглотерапия и хиропрактика весьма эффективны при лечении животных — мне известно множество случаев, когда удалось действительно излечить животных при помощи данных методов. К сожалению, многие ветеринары и ассоциации врачей-ветеринаров считают эти методы лечения животных недопустимыми.

Большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата сопровождается развитием воспаления, поэтому применение ряда лекарственных аллопатических средств может облегчить как острые, так и хронические боли у вашего питомца. Прежде всего следует подумать о назначении антиоксидантов. Подобным свойством обладает *витамин С* (5–15 мг/фунт веса 2–3 раза в день) и *витамин Е* (5–10 мг/фунт 1 раз в день), назначение которых показано при всех заболеваниях органов движения. Более сильным антиоксидантным действием обладает пикногенол (*Pycnogenol*; 1–2 мг/фунт, 2–3 раза в день), коэнзим Q10 (*Coenzyme Q10*; 1–2 мг/фунт, 2–3 раза в день) и супероксид дисмутаза (*Superoxide dismutase*). Каждая таблетка супероксида дисмутаза содержит 2000 МЕ (международные единицы), или 125 микрограмм активного вещества; обычно назначается половина таблетки на 10 фунтов веса животного 2 раза в день. На начальной стадии лечения следует давать животным *витамин С* и *витамин Е* плюс еще какой-либо антиоксидант; при необходимости дозу этих препаратов можно увеличить вдвое. По моему мнению, однако, разумнее не увеличивать дозу лекарства, а назначить взамен какое-либо средство более сильного действия — если вы используете два и более лекарственных препаратов, то доза каждого из них может быть даже уменьшена.

Если при применении антиоксидантов видимого облегчения

болей не происходит, то можно в дополнение к антиоксидантам назначить один из следующих препаратов. Следует отметить, что реакция на лекарственные средства у животных индивидуальна – то, что помогает одной собаке, может не оказать абсолютно никакого действия у другой. Таким образом, если не отмечается уменьшения болей после назначения какого-либо лекарственного препарата, то следует отменить этот препарат и взамен назначить другой из той же лекарственной группы. В некоторых случаях можно комбинировать лекарства. Во многих случаях при хронических заболеваниях органов движения полезен глюкозамина сульфат (*Glucosamine sulfate*), который назначается в дозе 5–10 мг/фунт веса дважды в день. В некоторых случаях эффективен хондроитина сульфат (*Chondroitin sulfate*) в дозе 5–8 мг/фунт дважды в день; возможна комбинация этих средств. При артритических болях у животных эффективно назначение аминокислоты D-L-фенилаланина (в дозе 5–10 мг фунт 2–3 раза в день. Пищевая добавка «Тармерик» (*Turmeric*) помогла облегчить боли у множества людей с заболеваниями органов движения – возможно применение «Тармерика» и у животных в дозе 1/8 – 1/4 чайной ложки на 10 фунтов веса животного. Кроме того, хороший эффект отмечается при применении при артритических болях сочетания ферментных препаратов бромелайна и кверситина (*Bromelain, Quercetin*) в дозе 5–10 мг фунт веса 2–3 раза в день.

Важнейшим компонентом лечения при всех заболеваниях костно-мышечной системы у животных является питание – полноценная пища способствует нормализации функции иммунной системы. Питание животных должно быть сбалансированным, с обязательным содержанием необходимого количества свежего сырого мяса (см. гл. «Дополнение»).

АРТРИТ, ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, СПОНДИЛИТ

Гомеопатические принципы, которыми следует руководствоваться при лечении этих заболеваний, в сущности, одинаковы. Именно поэтому лечение этих заболеваний мы рассмотрим в одном разделе, несмотря на различные причины их воз-

никновения.

Артритом называется заболевание сустава воспалительного характера; типичным симптомом артрита являются боли в области сустава при движении. Сустав представляет собой особое сочленение двух (иногда больше) костей, которое обеспечивает возможность движений (в области черепа или таза кости соединяются за счет швов, однако эта классификация соединений костей представляет собой интерес скорее для анатомов, чем для врачей-практиков).

Суставные поверхности костей соединяются в единое целое с помощью соединительнотканного связочного аппарата. Сухожилия, за счет которых к костям прикрепляются мышцы, также состоят из крепкой и прочной соединительной ткани. Например, икроножная мышца прикрепляется к пяточной кости за счет ахиллова сухожилия. Сочленение бедренной и большеберцовой костей в коленном суставе обеспечивается четырьмя связками, одна из которых — циркулярная — часто травмируется у спортсменов при чрезмерных физических нагрузках (кстати, эта же связка часто травмируется и у собак).

Подобный тип сочленения костей позволяет осуществлять движения в суставе в одной или нескольких плоскостях. В коленном суставе возможны движения в одной плоскости (сгибание — разгибание), а в плечевом суставе существует возможность круговых движений. В строении каждого сустава имеются определенные особенности, обусловленные функцией данного сустава.

Для облегчения взаимного перемещения сочленяющихся костных поверхностей в строении каждого сустава имеется ряд специальных «приспособлений». Одним из важных факторов, обеспечивающих полноценный объем движений, являются хрящевые структуры. Хрящевые пластинки покрывают суставные поверхности костей внутри сустава и представляют собой нечто вроде «амортизатора», который дает возможность сочленяющимся костным поверхностям мягко и безболезненно скользить относительно друг друга. Особую форму хрящевые пластинки имеют внутри коленного сустава, что связано со значительной нагрузкой на данный сустав. По своему строению хрящи в целом напоминают костную ткань, однако в их составе присутствует значительное количество эластических

волокон, за счет которых существенно снижается трение суставных поверхностей костей. Кроме хрящевых пластинок скольжение суставных поверхностей костей помогает облегчить также внутрисуставная жидкость, небольшое количество которой находится между хрящевыми пластинками. Каждый сустав ограничен капсулой из плотной соединительной ткани — именно за счет капсулы формируется полость сустава, заполненная внутрисуставной жидкостью.

Причиной возникновения болей в суставах чаще всего является либо повреждение хрящевой ткани, либо изменение состава внутрисуставной жидкости, либо нарушение правильных анатомических взаимоотношений структур, образующих сустав. Все эти причины могут привести к усилению трения при движении сочленяющихся суставных поверхностей костей и травматизации надкостницы. Следует отметить, что надкостница, покрывающая снаружи каждую кость, чрезвычайно богата нервными окончаниями — именно поэтому травматизация надкостницы вызывает сильнейшие боли.

Сочленения костей в виде суставов имеются не только в области конечностей, но и в области позвоночника между отдельными позвонками. Кроме того, подвижность нижней челюсти также обусловлена наличием сустава с каждой стороны. Однако, когда речь идет об артрите, то обычно подразумевается воспаление одного или нескольких суставов конечностей. Различаются два основных типа воспалительных процессов в суставах — ревматоидный артрит и остеоартрит. Ревматоидный артрит представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором клетки иммунной системы начинают атаковать ткани и органы собственного организма, в частности суставы, вызывая их воспаление. Основной причиной остеоартрита является возрастная дегенерация хрящевой ткани, возникающая или вследствие нарушения питания тканей сустава, или вследствие хронической длительной травматизации сустава. Следует отметить, что одним из факторов хронической травматизации суставов является низкая физическая активность организма и слабость мышечной ткани, так как в подобных случаях практически вся нагрузка приходится на суставы, а не разделяется пропорционально между суставами и мышцами. Кроме того, в развитии остеоартрита также играют определен-

ную роль аутоиммунные процессы.

Причиной дисплазии тазобедренного сустава у собак является нарушение развития костной ткани. Тазобедренный сустав относится к сложным шаровидным сочленениям, в которых головка округлой формы одной кости — в данном случае бедренной — сочленяется с впадиной соответствующей формы тазовой кости. При дисплазии тазобедренного сустава впадина тазовой кости не имеет соответствующей глубины и формы, что приводит к неполному сочленению суставных поверхностей и нестабильности сустава. В свою очередь, нестабильность сустава неизбежно влечет за собой развитие воспалительного процесса и кальцификацию окружающих сустав тканей — за счет кальцификации организм стремится хоть как-то компенсировать нарушение анатомического строения тазовой кости. Чаще всего дисплазия тазобедренного сустава имеет наследственный характер; однако это заболевание изредка встречается и у чистопородных животных. У собак крупных пород данное заболевание обнаруживается значительно чаще, чем у собак мелких пород; у кошек дисплазия тазобедренного сустава наблюдается чрезвычайно редко. Полностью исключить данное заболевание у собак можно только по достижении ими двухлетнего возраста, так как дисплазия тазобедренного сустава может проявиться на любом этапе их роста. Основные принципы лечения дисплазии тазобедренного сустава такие же, как и артрита. В некоторых случаях требуется хирургическое лечение.

При наличии риска развития дисплазии тазобедренного сустава у щенков следует при беременности назначать собаке витамин С в соответствующих дозах; кроме того, щенки в первые шесть месяцев жизни также должны получать витамин С. Дело в том, что именно этот витамин способствует правильному развитию костной и соединительной ткани в области тазобедренного сустава.

Спондилит представляет собой воспаление мелких суставов между отдельными позвонками. Спондилит также чаще наблюдается у собак крупных пород; обычно при этом заболевании отмечаются сильные боли в области воспаленного сустава и тугоподвижность позвоночника. Лечение спондилита такое же, как и артрита в области конечностей.

Гомеопатические средства при артрите (в том числе при дисплазии тазобедренного сустава и спондилите)

Arnica montana

У животных с симптомами данного средства отмечаются интенсивные боли, напоминающие боли при ушибе. Обычно боли настолько сильные, что собаки панически боятся любых прикосновений к пораженной области. Как правило, такие животные все время находятся в положении лежа, избегая любых движений.

Belladonna

Заболевания с характерными для данного средства симптомами обычно развиваются очень быстро. Чаще поражаются суставы задних конечностей, в том числе тазобедренный сустав; преобладает правостороннее поражение. Боли у животных с симптомами *Belladonna* бывают чрезвычайно сильными; конечности животных находятся в постоянном движении, так как движение облегчает боли. В некоторых случаях боли могут уменьшиться при ходьбе. Несмотря на то, что кожные покровы обычно горячие на ощупь, конечности у животных могут быть холодными. Из-за болей у собак может наблюдаться раздражительность и даже эпизоды агрессивного поведения.

Bryonia

Характерным симптомом данного средства является усиление болей при движениях — именно поэтому собаки с симптомами *Bryonia* часто вообще отказываются вставать со своего места. Отмечается отек и повышение кожной температуры в области воспаленного сустава. Животные с симптомами данного препарата часто испытывают жажду и могут быть весьма раздражительными; чаще всего они предпочитают оставаться в одиночестве.

Calcareo carbonica

Данное средство часто показано при лечении ширококостных, слабых и вялых собак, с неуклюжей спотыкающейся походкой и страдающих избыточным весом. Животные этого типа

не переносят холод и сырость, так как эти факторы провоцируют обострение болей в пораженной области и ощущение общего дискомфорта. В некоторых случаях пораженные конечности на ощупь могут быть холодными и влажными. Мускулатура у животных этого типа обычно слабая и вялая; мышечная слабость часто приводит к дрожанию задних конечностей.

Calcarea phosphorica

Основные симптомы данного препарата — общая слабость и неуклюжесть — напоминают симптомы *Calcarea carbonica*; однако животные этого типа, в отличие от животных *Calcarea carbonica*, чаще хрупкие, с длинным тонким телом. Создается впечатление, будто конечности не могут служить им необходимой опорой. У животных этого типа имеется склонность к возникновению болей по передней поверхности задних конечностей. Состояние животных *Calcarea phosphorica* обычно ухудшается при холодной погоде и при переменах погоды.

Colchicum

Данное средство эффективно при чрезвычайно резкой болезненности в области пораженного сустава. Воспаление в области сустава выражено настолько сильно, что несчастное животное взвизгивает при любой попытке просто прикоснуться к пораженной области. Подобные боли в суставе можно легко спутать с симптомами *Arnica*, однако у животных с симптомами *Colchicum* помимо болей в суставе имеются еще и нарушения функции желудочно-кишечного тракта. Часто у животных этого типа отмечается тошнота, особенно при виде и запахе пищи. Как правило, состояние *Colchicum* развивается осенью.

Colocynthis

По моему мнению, данное средство весьма эффективно у собак при болях в области тазобедренного сустава. Ключевым симптомом для назначения *Colocynthis* является боль при ротации задней конечности внутрь.

Pulsatilla

У животных с симптомами данного препарата боли чаще всего локализуются в области задних конечностей. В отличие от

большинства животных, боли усиливаются от тепла и уменьшаются от холода. Многие симптомы *Pulsatilla* напоминают симптомы *Rhus toxicodendron*, в частности усиление болей в начале движения и уменьшение при его продолжении. У животных с симптомами данного средства отмечается склонность к постоянному вытягиванию конечностей. Эти животные плохо переносят жаркие, душные закрытые помещения. Обычно животные данного типа очень ласковые и настойчиво требуют внимания.

Rhus toxicodendron

Данное лекарство является основным при лечении заболеваний органов движения, сопровождающихся болями острого и хронического характера. Характерным симптомом, указывающим на *Rhus toxicodendron*, является усиление болей в начале движения и уменьшение их при его продолжении. Подобная особенность отмечается в картине некоторых других гомеопатических средств, однако именно для *Rhus* она наиболее характерна. Обычно животные с симптомами данного препарата зябкие; боли усиливаются при воздействии холода. Кроме того, эти животные нередко бывают чрезвычайно беспокойными, так как в покое у них отмечается усиление болей.

Ruta graveolens

По эффективности при болях в суставах *Ruta graveolens* уступает только *Rhus toxicodendron*. Наиболее выражено действие данного средства при травматических повреждениях, однако назначение *Ruta* при артритах также может принести значительную пользу. У животных с симптомами этого средства отмечается выраженное ограничение движений в пораженном суставе; кроме того, эти животные часто беспокойны из-за болей. Назначение *Ruta graveolens* весьма эффективно при спондилите (воспалении мелких суставов позвоночника). Типичным для данного препарата симптомом является усиление болей при физических усилиях. У животных *Ruta*, как и у животных *Rhus*, отмечается усиление болей в покое и уменьшение их при движении.

Sabina

Характерным симптомом данного лекарства является усиление болей в суставах при движении и от воздействия тепла. Боли уменьшаются на свежем воздухе. Для *Sabina* характерно также усиление болей по ночам. Местные симптомы нетрудно спутать с симптомами *Pulsatilla*, однако у животных *Pulsatilla* боли при движении обычно уменьшаются. Животные с симптомами данного средства склонны к глубокой печали — такой же симптом имеется в картине *Pulsatilla*, однако печаль животных *Pulsatilla* никогда не бывает настолько тяжелой и длительной. Симптомы данного препарата у животных могут возникать после вакцинации.

Silicea (Silica)

Назначение данного средства также полезно при артритах, либо прямо связанных с вакцинацией, либо обострившихся после нее. Животные с симптомами *Silicea* чаще всего вялые и слабые физически, однако это не отражается на состоянии их интеллекта. У этих животных, как правило, хрупкое телосложение; часто наблюдается деформация когтей с их утолщением и ломкостью. Обычно животные данного типа очень зябкие и плохо переносят холод. Характерно, что в анамнезе животных с симптомами *Silicea* отмечается множество проведенных им вакцинаций; кроме того, обнаруживаются частые инфекционные заболевания и абсцессы.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ (СМЕЩЕНИЕ ДИСКОВ)

Заболевания межпозвонковых дисков встречаются в основном у собак низкорослых пород с длинным туловищем, типичным представителем которых являются таксы. Чаще всего заболевания межпозвонковых дисков начинаются у собак в возрасте примерно пяти лет. С возрастом связочный аппарат позвоночника, за счет которого происходит стабилизация позвонков и дисков, утрачивает эластичность и становится значительно слабее, что приводит к нарушению правильных анатомических взаимоотношений структур позвоночника и неста-

бильности позвоночного столба в целом. В норме межпозвонковые диски, располагаясь между телами позвонков, представляют собой своеобразные «амортизаторы», которые препятствуют их соприкосновению; при смещении дисков и нарушении их строения происходит сдавление тел позвонков и травматизация нервных стволов. Симптомами заболеваний межпозвонковых дисков являются сильнейшие боли в области позвоночника и в некоторых случаях парезы или параличи передних (грудных) или задних (тазовых) конечностей. Одной из возможных причин этого вида заболеваний является аутоиммунная агрессия, направленная против соединительной ткани собственного организма; кроме того, не исключается, что на развитие данной патологии влияет неполноценное питание.

Первым и основным симптомом данного заболевания является боль в области спины или шеи. В некоторых случаях при поражении межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника боль может локализоваться в области передних конечностей или плечевого пояса. Обычно при развитии этого заболевания можно отметить, что собаки без особого желания начинают выходить на прогулки, перестают запрыгивать, например, в любимое кресло и иногда взвизгивают вроде бы без причины. Начало заболевания, как правило, внезапное; четкой связи с каким-либо травматическим повреждением позвоночника установить не удастся. В некоторых случаях поводом для появления первых симптомов являются малотравматичные по своей сути движения, например прыжки или движение вниз по лестнице. Однако движения такого рода действительно являются всего лишь поводом — на самом деле слабость связочного аппарата позвоночника и нарушения структуры межпозвонковых дисков развиваются исподволь, постепенно и в течение длительного времени.

Заболевания межпозвонковых дисков со всеми вытекающими отсюда последствиями могут возникать в разных отделах позвоночника. У большинства собак доминирующим симптомом являются боли, однако при поражении дисков в области поясничного отдела позвоночника возможно появление парезов и параличей задних конечностей. К заболеваниям подобного рода у вашего питомца следует относиться с максимальным вниманием.

Особенности наблюдения за животными с заболеваниями межпозвонковых дисков

При появлении первых симптомов заболеваний межпозвонковых дисков у вашего питомца прежде всего необходимо оценить тяжесть его состояния, ответив на следующие вопросы:

- Насколько интенсивны болевые ощущения?
- Нет ли ограничения движений задних конечностей?
- Не отмечаются ли нарушения функции тазовых органов (мочеиспускания и дефекации)?

Следует немедленно обратиться к ветеринару:

- если имеются симптомы паралича (пареза) задних конечностей или нарушение функции тазовых органов,
- если боли интенсивные.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару даже при появлении легких симптомов данного заболевания. Во всех случаях следует уточнить диагноз (провести рентгенографическое исследование позвоночника) и при необходимости проконсультироваться у специалиста. В легких случаях заболеваний возможна выжидательная тактика.

Некоторые рекомендации по лечению данной группы заболеваний

Хирургический метод лечения при смещении межпозвонковых дисков показан при развитии паралича задних конечностей (особенно если паралич развился внезапно) в сочетании с глубокими интенсивными болями. Проведение пробы на глубокую болевую чувствительность следует доверить ветеринару и не пытаться проводить ее самостоятельно в домашних условиях. Данная проба проводится путем осторожного надавливания на пораженный отдел позвоночника. Если при этом у животного возникают сильные болевые ощущения, то хирургическое лечение в данном случае является показанным. Если же при проведении этой пробы болевые ощущения отсутствуют, то прогноз скорее всего неблагоприятный и хирургическое лечение не даст желаемого результата. Однако мне приходилось неоднократно наблюдать хорошие результаты при применении метода иглоукалывания у, казалось бы, безнадежных пациентов.

По моему мнению, иглоукалывание и хиропрактика являются наилучшими методами лечения при заболеваниях межпозвонковых дисков. Назначение гомеопатических средств также является эффективным, тем более что гомеопатический метод лечения не вступает в противоречие с другими методами. Если бы подобное заболевание выявилось у моего питомца, я бы, без сомнения, применил иглоукалывание и хиропрактику на фоне назначения соответствующих гомеопатических средств. Показания к хирургическому лечению возникают достаточно редко и ограничиваются развитием внезапного паралича задних конечностей в сочетании с интенсивным болевым синдромом — во всех остальных случаях, по моему мнению, менее рискованно и более эффективно применять иные методы лечения. Я вполне признаю, что хирургическое лечение при наличии соответствующих показаний является эффективным — однако позаботьтесь, чтобы необходимость операции по возможности была бы подтверждена несколькими специалистами.

В традиционной медицине и ветеринарии помимо хирургического лечения при заболеваниях подобного рода используется также стероидная противовоспалительная терапия. Если другие методы лечения недоступны или неэффективны, то можно, конечно, назначать и стероидные препараты. Обычно стероидная терапия назначается в менее тяжелых случаях, однако иглоукалывание или хиропрактика дадут точно такой же эффект, но с гораздо меньшим риском для общего состояния вашего питомца. При применении значительных доз стероидов возможно развитие множественных изъязвлений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, осложненных кровотечением.

Если у вашего питомца подтвержден диагноз «смещение межпозвонкового диска», то вполне вероятно, что смещение диска будет продолжаться и дальше. Поэтому независимо от выбранного вами метода лечения следует ограничить активность вашего питомца на срок не менее двух недель, а в некоторых случаях и дольше. Особенно важно ограничение физической активности при лечении обезболивающими препаратами, так как именно чувство боли предупреждает организм о необходимости снижения физической нагрузки. Если же болевая чувствительность подавляется анальгетиками, то, следовательно, обратная связь нарушается и организм не получает со-

ответствующих сигналов. В остром периоде (в течение 1–2 недель) выводите собаку на короткую прогулку на поводке дважды в день для мочеиспускания и дефекации. Если состояние собаки постепенно улучшается, то по прошествии двух недель можно осторожно удлинять время прогулки, однако не следует допускать какого-либо физического напряжения. Активность можно *постепенно* увеличивать только при полном отсутствии болевых ощущений и не ранее чем через месяц.

Кроме того, хороший эффект дает применение тех лекарственных средств, о которых говорилось в разделе «Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями костно-мышечной системы», в частности применение супероксида дисмутазы (*Superoxide dismutase*) и бромелайна/кверцетина (*Bromelain/Quercetin*).

Гомеопатические средства для лечения заболеваний межпозвонковых дисков

Если у вашего питомца нет симптомов паралича задних конечностей, то назначение одного из данных гомеопатических средств может быть очень полезным; не следует забывать, что лечение необходимо проводить на фоне ограничения физической активности.

Hypericum perforatum

Hypericum является превосходным средством при повреждении нервных стволов и невралгических болях. Кроме того, хороший эффект наблюдается при назначении данного лекарства при смещении межпозвонковых дисков у собак в тех случаях, когда основным симптомом является сильная боль. *Hypericum* представляет собой средство выбора при заболеваниях межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника.

Natrum muriaticum

Назначение данного лекарства эффективно в тех случаях, когда заболевания межпозвонковых дисков у собак развиваются на фоне перенесенного горя, связанного с потерей близкого друга. Горе нередко является причиной той или иной болезни как у животных, так и у человека; назначение *Natrum muriaticum* в подобных случаях (в том числе и при смещении

межпозвоноковых дисков) обычно особенно полезно.

Nux vomica

При лечении данной группы заболеваний *Nux vomica* часто представляет собой средство выбора. Этот препарат эффективен в тех случаях, когда доминирующим симптомом у собак являются боли. В большинстве случаев у животных отмечается внезапное начало заболевания и раздражительность. Кроме того, назначение данного лекарства весьма полезно в тех случаях, когда применяется значительное количество аллопатических средств, так как *Nux* обладает способностью уменьшать нежелательные последствия традиционного лечения.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИОДЕ РОСТА (В ОСНОВНОМ У СОБАК)

Для периода роста животных характерно возникновение особой группы заболеваний. Эти заболевания встречаются нечасто и в основном у собак. В большинстве случаев причина их возникновения неясна, однако основным фактором их развития является неполноценность костной ткани. В некоторых случаях можно выявить связь между временем начала заболевания и проведенной вакцинацией.

Во всех случаях этих заболеваний необходимо в дополнение к гомеопатическому лечению применять лекарственные средства, о которых говорилось в разделе «Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями костно-мышечной системы».

Паностеит

Паностеит представляет собой воспаление внутренней оболочки длинных трубчатых костей конечностей, которое развивается у щенков обычно в возрасте 6–12 месяцев. Чаще всего воспалительный процесс подобного типа купируется самостоятельно, однако в течение 1–2 месяцев животные страдают от сильных болей в пораженной конечности. Основным симптомом является чрезвычайно выраженная чувствительность пораженной кости к надавливанию; при попытке пальпации бо-

лезненного участка щенки вздрагивают от боли. Чаще всего поражается бедренная или плечевая кость, реже встречается воспаление большеберцовой кости и костей предплечья (локтевой и лучевой). Обычно симптомы воспаления очевидны и диагноз не вызывает сомнений, однако в некоторых случаях требуется рентгенографическое исследование.

Гомеопатические средства при паностеите

Mezereum

Данное средство считается специфичным для паностеита, так как в картине *Mezereum* присутствует характерный симптом в виде разрывающей боли в области длинных трубчатых костей. Мне удалось несколько раз получить хорошие результаты при лечении паностеита данным препаратом. Кроме того, *Mezereum* полезен при лечении поствакцинальных осложнений. Как правило, животные с симптомами данного лекарства отличаются зябкостью; у них отмечается ухудшение состояния в сырую холодную погоду, а также по ночам. Для *Mezereum* характерно сродство к болям в области большеберцовой кости, однако, по моему мнению, это средство облегчает боли и в других отделах костной системы.

Ruta graveolens

Для животных с симптомами *Ruta* характерны глубокие боли в области длинных трубчатых костей, которые вынуждают их постоянно перемещаться с места на место — движение, как правило, облегчает боли. Более подробное описание данного лекарства представлено в разделе «Гомеопатические средства при лечении артритов».

Sabina

Данное лекарство является наиболее эффективным при паностеите в области бедренной кости. Как и у животных *Mezereum*, у представителей (в основном собак) типа *Sabina* отмечается ухудшение состояния по ночам. Однако, в отличие от животных *Mezereum*, боли у животных *Sabina* усиливаются при воздействии тепла.

Syphilinum

Не следует проводить лечение данным средством самостоятельно – назначение *Syphilinum* необходимо доверить профессионалу-гомеопату. *Syphilinum* обладает тропностью к воспалительным процессам длинных трубчатых костей; его применение может быть эффективным в тех случаях, когда другие гомеопатические препараты не помогают.

Гипертрофическая остеодистрофия

Данное заболевание также встречается у щенков в возрасте 3–6 месяцев и представляет собой воспаление наружной оболочки длинных трубчатых костей в области эпифизов с последующей кальцификацией пораженной области. Раньше считалось, что гипертрофическая остеодистрофия – удел тех старых собак, у которых имеется хронический воспалительный процесс органов грудной полости. Однако возникновение гипертрофической остеодистрофии у щенков в настоящее время связывается с предшествующей вакцинацией. Данное заболевание чаще всего встречается у щенков таких пород, как доги, ирландские сеттеры, мастифы и доберман-пинчеры.

Симптомы данного заболевания у щенков развиваются очень быстро – внезапно, без всякой видимой причины, щенок перестает опираться на конечность, а если и опирается, то с видимыми усилиями, преодолевая боль. Основными симптомами являются сильнейшие боли в пораженной конечности, повышение температуры тела и потеря аппетита. В некоторых случаях визуально определяется деформация пораженной кости. Большинство щенков выживает, однако случаются и смертельные исходы; кроме того, из-за мучительных сильных болей в некоторых случаях приходится прибегать к эвтаназии. Эффективного аллопатического лечения не существует, и терапия ограничивается назначением анальгетических препаратов.

Гомеопатические средства при лечении гипертрофической остеодистрофии

В дополнение к гомеопатическим средствам, которые применяются при паностеите, следует рассмотреть возможность назначения следующих препаратов.

Asafoetida

Следует подумать о назначении данного лекарства при гипертрофической остеодистрофии у толстых, неуклюжих и неряшливых щенков. Характерным симптомом является болезненность в области костей, которая усиливается ночью и в покое. Боли обычно уменьшаются при движении и на свежем воздухе. Щенки с симптомами данного средства бывают раздражительными, однако достаточно часто стремятся, чтобы их приласкали и утешили.

Phosphoricum acidum

Данное средство также может оказаться весьма полезным при воспалении и выраженных болях в области длинных трубчатых костей. У животных данного типа отмечается общая слабость в сочетании со слабостью конечностей, из-за чего у них обычно спотыкающаяся походка. Чаще всего боли усиливаются по ночам, но уменьшаются по мере приближения утра. В некоторых случаях состояние *Phosphoricum acidum* развивается вследствие перенесенного горя. Животные с симптомами данного препарата часто беспокойные и слабые физически и умственно.

Silicea (Silica)

Характерной особенностью животных с симптомами данного средства является слабость и хрупкое телосложение. Наиболее болезненной областью могут быть лучезапястные суставы. У большинства животных с симптомами *Silicea* отмечают высыпания на коже, а также симптомы аллергии и воспалительные заболевания костной системы.

Thuja occidentalis

Данное лекарство описывается в гомеопатической литературе как единственное специфическое средство при гипертрофической остеодистрофии. *Thuja* является главным препаратом при вакцинозе, поэтому о ее назначении, так же как и о назначении *Silicea*, следует непременно подумать в тех случаях, когда выявляется прямая связь между вакцинацией и развитием гипертрофической остеодистрофии. У людей с симптомами данного препарата отмечается ощущение одеревенения и омертвления конечностей, а также ощущения утраты контроля над

своими конечностями, что в итоге приводит к развитию спотыкающейся походки. Не исключено, что подобные ощущения испытывают и животные с симптомами *Thuja occidentalis*. Кроме того, для таких животных характерна зябкость.

Расслаивающий остеохондрит

При расслаивающем остеохондрите (специфическом воспалении хрящевой ткани суставов) чаще всего поражается плечевой сустав, однако нельзя исключить поражение и других суставов. При появлении изменений в плечевом суставе боль в основном возникает при вытягивании передней лапы вперед. Хромота у собак отчетливо проявляется при ходьбе. В основе расслаивающего остеохондрита лежит деструкция хрящевой ткани, которая сопровождается выраженной болезненностью. В некоторых случаях отмечается фрагментация и полный отрыв разрушенного участка хряща с обнажением кости — в подобных случаях показано хирургическое лечение. В более легких случаях возможно самостоятельное выздоровление. Иглоукалывание и применение соответствующих гомеопатических средств являются достаточно эффективными методами лечения. Данное заболевание, как и паностеит и гипертрофическая остеодистрофия, развивается в основном у щенков в возрасте 6–12 месяцев.

Гомеопатические средства при расслаивающем остеохондрите

В дополнение к лекарственным препаратам, о которых говорилось в разделе «Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями костно-мышечной системы», можно назначить одно из следующих гомеопатических средств.

Calcarea phosphorica

Calcarea phosphorica, подобно *Symphytum*, является замечательным специфическим средством для стимуляции репаративных процессов в костной системе. По моему мнению, при данном заболевании следует применять низкие потенции *Calcarea phosphorica* (6X или 6C) два–три раза в день. *Calcarea phosphorica*, как и *Symphytum*, следует назначать в тех случаях, когда нет четких показаний для *Silicea* или *Syphilinum*. Кроме того, в некоторых случаях можно использовать одно из этих

лекарств в низких разведениях на фоне редких доз конституционального препарата в высоких разведениях. Подобное назначение двух гомеопатических средств не является классическим, однако при нарушении репаративных процессов в костной системе такая схема лечения во многих случаях вполне оправдана.

Silicea (Silica)

Данное средство очень полезно у животных с нарушением репаративных процессов. Животные с симптомами *Silicea* обычно хрупкого телосложения, слабые и зябкие; часто в их анамнезе имеются указания на многочисленные вакцинации, перенесенные инфекционные заболевания и нагноительные процессы в виде абсцессов. Назначение *Silicea* приносит пользу большинству животных, которым ранее проводились какие-либо прививки.

Symphytum

Symphytum, как и *Calcareo phosphorica*, представляет собой эффективное лекарство для стимуляции процессов заживления костных повреждений, причем считается, что у *Symphytum* данное свойство более выражено. Кроме того, назначение *Symphytum* полезно также при болях в костной системе посттравматического характера. См. описание *Calcareo phosphorica*.

Syphilinum

Syphilinum представляет собой глубоко действующее лекарство, назначение которого лучше доверить профессионалу-гомеопату. В США это средство продается только по рецептам. *Syphilinum* считается единственным специфическим гомеопатическим препаратом для лечения расслаивающего остеохондрита. Особенно полезно это лекарство при правостороннем поражении.

Рахит

Рахит развивается у щенков и котят в раннем возрасте, в основном из-за недостаточного количества ионов кальция в пищевом рационе. Дефицит кальция приводит к возникновению деформаций костей, увеличению и болезненности суставов. В

настоящее время рахит у щенков и котят встречается достаточно редко. Успешное лечение рахита возможно при коррекции рациона питания; назначение гомеопатических средств ускоряет выздоровление. В пище животных раннего возраста должно содержаться достаточное количество кальция, однако не следует забывать, что избыток кальция тоже нежелателен. В большинстве случаев бывает вполне достаточным добавления в пищу животных препаратов кальция в соответствующих дозировках в течение одного-двух месяцев. Кроме того, необходимо в пищу добавлять рыбий жир в количестве одной восьмой или четверти чайной ложки в течение нескольких недель, так как именно рыбий жир способствует полноценному усвоению кальция.

Гомеопатические средства для лечения рахита

Asafoetida

Назначение данного препарата полезно при развитии рахита с деформацией суставов у толстых и неуклюжих щенков и котят. Увеличение объема живота у таких животных сочетается с усиленным образованием кишечных газов и диареей, причем, как правило, у каловых масс отмечается зловонный запах. Животные с симптомами данного средства предпочитают находиться на свежем воздухе, а не в помещении.

Calcareo carbonica

У животных с симптомами данного средства назначение *Calcareo carbonica* способствует процессам усвоения кальция. Животные *Calcareo carbonica* обычно ширококостные, с избыточным весом и неуклюжей походкой, зябкие и ленивые. Как правило, у них отмечается склонность к запорам.

Calcareo fluorica

Среди всех гомеопатических средств группы кальция состояние *Calcareo fluorica* является наиболее тяжелым. У животных с симптомами данного лекарства рахит встречается очень часто; характерно, что признаки рахита у таких животных проявляются необычно рано — уже в периоде новорожденности. Часто отмечается асимметрия строения тела и головы.

Кроме того, вследствие нарушения процесса формирования зубной эмали у животных с симптомами данного препарата часто отмечаются заболевания зубов с их разрушением.

Calcarea phosphorica

Симптомы данного лекарства напоминают симптомы *Calcarea carbonica*, однако животные *Calcarea phosphorica* чаще худые, хрупкого телосложения. В некоторых случаях они капризные, им трудно угодить. Костные боли у таких животных усиливаются по ночам и при перемене погоды.

Phosphorus

Животные с симптомами этого препарата, подобно животным *Calcarea phosphorica*, обычно изящные и худые, однако они проворнее по сравнению с животными *Calcarea phosphorica* и имеют более пропорциональное строение. Как правило, они дружелюбные и «громкоголосые»; у них выражена жажда с желанием холодной воды. Обычно они обладают хорошим аппетитом, однако при быстром поедании пищи у них легко возникает рвота.

Silicea (Silica)

Животные с симптомами *Silicea*, как правило, худые, изящные и слабые. В анамнезе таких животных отмечаются многочисленные инфекционные заболевания, а также заболевания глаз, носа или высыпания на коже. Обычно животные с симптомами данного средства зябкие и плохо переносят холод.

Sulphur

Во многом животные *Sulphur* похожи на животных *Asafoetida*, особенно по внешнему виду и по характерной для обоих средств диарее. Однако животные *Sulphur*, в отличие от животных *Asafoetida*, не страдают избыточным весом, не настолько раздражительны и чаще всего весьма дружелюбны. Такие животные испытывают жажду чаще, чем чувство голода. Их шерсть является, как правило, прибежищем для значительного количества блох.

Болезнь Легга–Кальве–Пертеса

Данное заболевание названо по именам ученых, впервые описавших его. При этой болезни развивается асептический некроз головки бедренной кости, причиной которого является нарушение микроциркуляции в области тазобедренного сустава. Насколько мне известно, адекватного медикаментозного лечения данного заболевания пока не найдено. Основным методом лечения заболевания у животных является оперативное вмешательство с целью удаления остатка пораженной головки бедренной кости и создания некоего подобия тазобедренного сустава из рубцовых тканей.

В соответствии с принципами гомеопатии лечение данного заболевания возможно на самых ранних стадиях его развития. Основными гомеопатическими средствами при болезни Легга–Кальве–Пертеса являются обладающие глубоким действием *Tuberculinum* и *Vaccin attenuie bilie*. Данные средства приобретаются только по рецепту врача-гомеопата (см. гл. «*Materia Medica*»); лечение этого сложного заболевания, конечно же, следует доверять профессионалам. Кроме того, следует рассмотреть возможность назначения *Phosphorus* и *Silicea (Silica)*, описание которых представлено в разделе «Рахит» и в гл. «*Materia Medica*». По моему глубокому убеждению, при начальных признаках данного заболевания, когда еще есть минимальная возможность спасти тазобедренный сустав, следует не откладывая обратиться за помощью к специалисту-гомеопату.

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Переломы костей

Лечение переломов костей любой локализации проводится врачом-ветеринаром с применением специальных методов, однако в подобных ситуациях назначение гомеопатических средств помогает ускорить процесс консолидации (срастания) переломов. В течение нескольких дней с момента перелома давайте вашему питомцу *Arnica montana* – до тех пор, пока не уменьшится отек и болезненность в области повреждения. Это

средство следует назначать в высоких потенциях (не менее 30С или выше, если есть в наличии), сначала каждые 15–30 минут, затем каждый час и после улучшения состояния вашего питомца — несколько раз в день. При травматическом повреждении и болевом шоке можно применять *Rescue Remedy* (или *Bach flower remedy*, обладающее таким же действием). Гомеопатическое средство *Symphytum* обладает способностью ускорять процесс консолидации переломов и значительно облегчать боли в области повреждения. Если консолидация перелома происходит замедленно, то можно заменить *Symphytum* на *Calcarea phosphorica* или чередовать эти средства, давая одно из них утром, другое — вечером.

Кроме того, при переломах можно назначать одно из тех лекарств, которые описываются в разделе «Растяжение мышц и связок». Если ни одно из этих средств не оказывает должного эффекта, то следует назначить *Ruta graveolens* — данное лекарство поможет купировать боли в зоне перелома.

Растяжения мышц и связок

Растяжение связок представляет собой травматическое повреждение связочного аппарата суставов различной степени тяжести. При растяжении мышц происходит травматизация тела мышцы. Обычно эти виды повреждений встречаются одновременно — например, при падении человек может растянуть связки голеностопного сустава и травмировать икроножную мышцу. Основные принципы лечения этих видов повреждений у животных одинаковые. Сразу же после травмы для предупреждения развития обширного отека на область повреждения следует наложить лед. Не забывайте, что нельзя накладывать лед непосредственно на кожу из-за возможности дополнительной холодовой травмы кожного покрова — лед надо завернуть в кусок ткани или положить в специальный пакет. Через один-два часа можно начать чередование льда и теплых компрессов на область повреждения, так как быстрая смена температур приводит к активизации микроциркуляции, что ускоряет процесс заживления.

Большинство ветеринаров при данном типе травмы рекомендуют воздерживаться от опоры на поврежденную конечность, однако я не могу полностью согласиться с этим. По моему мне-

нию, ограничение опоры и полный покой поврежденной конечности действительно необходимы при разрыве связок или серьезном растяжении мышц. Однако в тех случаях, когда травма ограничивается только растяжением связок, не следует полностью лишать сустав активных движений — они, пусть даже в ограниченном объеме, могут оказаться весьма полезными. О пользе подобных движений я могу судить на основании собственного, к сожалению, весьма значительного опыта. В течение многих лет я занимаюсь бегом, и множество раз травмировал связки голеностопного сустава, будучи далеко от дома. Домой мне обычно приходилось добираться самостоятельно; я заметил, что первые несколько шагов сразу после травмы сопровождались очень сильной болью, однако спустя какое-то время боль утихала. Кроме того, я отметил, что в подобных ситуациях — т. е. после того, как произошло растяжение связок и я шел домой с опорой (пусть и ограниченной) на поврежденную конечность — процесс заживления шел намного быстрее, чем в тех случаях, когда после подобной травмы я полностью прекращал опираться на поврежденную конечность. Именно поэтому сейчас я рекомендую в случаях легких растяжений голеностопного сустава (без признаков разрыва связок) поддерживать в поврежденном голеностопном суставе определенный объем движений.

При растяжении мышц и связок хорошим дополнением к лечению гомеопатическими средствами могут стать лекарственные препараты, о которых говорилось в разделе «Особенности наблюдения и лечения животных с заболеваниями костно-мышечной системы».

Гомеопатические средства при растяжении мышц и связок

Arnica montana

Arnica montana — возможно, наилучшее гомеопатическое средство при травматических повреждениях мышц и суставов. Несомненно, что *Arnica* является и самым известным гомеопатическим лекарством именно из-за своей замечательной способности ускорять заживление растяжений мышечно-связочного аппарата. У животных с симптомами данного средства обычно отмечаются настолько сильные боли, что они панически боятся

любых прикосновений к области повреждения. Назначение *Arnica* эффективно уже в первые минуты и часы после травмы.

Bellis perennis

Bellis (маргаритка) и *Arnica* относятся к одному и тому же семейству растений — именно поэтому и показания к их применению во многом сходны. У животных с симптомами *Bellis* отмечается ухудшение от теплых компрессов и улучшение от холодных. Как у животных *Arnica*, так и у представителей типа *Bellis* наблюдается улучшение от движения; однако данный симптом все же более характерен для *Bellis*, тогда как представители типа *Arnica* при повреждении конечности чаще предпочитают полное отсутствие движений в ней.

Hamamelis

Данное гомеопатическое лекарство готовится из орехов лещины виргинской и представляет собой замечательное средство для лечения ушибов, растяжений мышц и связок. Характерным симптомом *Hamamelis* является ухудшение от движения и улучшение в покое.

Rhus toxicodendron

Назначение *Rhus toxicodendron* эффективно не только в случае хронических болей при артритах, но и при растяжении связок. Характерной особенностью данного средства является преимущественное воздействие на суставы. Типичным симптомом *Rhus toxicodendron* является ухудшение в начале движения и улучшение при его продолжении, а также усиление болей от воздействия холода и облегчение болей от тепла.

Ruta graveolens

Назначение *Ruta*, как и использование *Rhus toxicodendron*, более эффективно при повреждении связочного аппарата суставов, чем при повреждении мышц. Данное средство часто назначается на более поздних стадиях травматических повреждений сразу же вслед за *Arnica*. Кроме того, применение *Ruta graveolens* облегчает боли при переломах. Характерным симптомом *Ruta* является усиление болей от холода и в покое, а уменьшение — от тепла и при движении.

Разрывы мышц

При травматических разрывах мышц, как правило, животные страдают от интенсивных болей. Полные разрывы мышц встречаются достаточно редко – в подобных случаях всегда требуется хирургическое вмешательство. Во всех случаях неполных разрывов (или надрывов) мышц очень эффективным бывает пероральное (не местное!) назначение *Calendula officinalis* в разведении 30С, что мне и приходилось неоднократно наблюдать.

Травматические повреждения позвоночника

См. гл. 13 «Нервная система».

Нервная система



Функции

Дегенеративная миелопатия

Паралич норных собак

Паралич вследствие укуса клеща

Судорожные припадки

Агрессивность и рабический миазм

Травмы головного и спинного мозга

ФУНКЦИИ

У нервной системы живых существ имеются две основные функции. Первая – сенсорное восприятие, благодаря которому мы воспринимаем и постигаем окружающий мир. По центро-ремительным чувствительным нервам импульсы от всех пяти органов чувств достигают коры головного мозга. Головной мозг фактически представляет собой скопление огромного количества нервных клеток; он непрерывно анализирует информацию, получаемую от органов чувств, и посылает импульсы по центро-бежным двигательным нервным стволам к отдельным мышцам или группам мышц. Таким образом, второй основной функцией головного мозга является инициация ответной реакции организма. Ответная реакция может выражаться в виде мышечного сокращения одной или нескольких мышц или в виде секреции различных видов гормонов железами внутренней секреции, которые определяют ответную реакцию того или иного органа.

Строение нервной системы необычайно сложное; в сущности, нервная система – это биологический компьютер, который руководит работой всех органов и систем. Ни одно действие, ни одна реакция не происходят в организме без участия нервной системы. Таким образом, функционирование нервной системы обеспечивает и поддерживает жизнь. Именно вследствие сложности своего строения и функций нервная система необычайно подвержена различным нарушениям. Большинство заболеваний нервной системы выходят за рамки данной книги; мне кажется целесообразным сосредоточить внимание на некоторых синдромах и травматических повреждениях нервной системы.

ДЕГЕНЕРАТИВНАЯ МИЕЛОПАТИЯ

Синдром дегенеративной миелопатии наблюдается в основном у собак крупных пород. Впервые это заболевание было описано у немецких овчарок, однако в настоящее время дегенеративная миелопатия встречается у собак всех крупных пород. Основным симптом – прогрессирующий паралич задних конечностей; по мере развития заболевания утрачивается также контроль за деятельностью мочевого пузыря и прямой кишки.

При данном заболевании в спинном мозге постепенно развиваются дегенеративные изменения, что приводит к нарушению его функций. Болевые ощущения отсутствуют из-за нарушения проводимости нервных импульсов по спинному мозгу. Именно этот симптом помогает в дифференциации дегенеративной миелопатии от других заболеваний спинного мозга и задних конечностей, при которых их слабость и нарушение походки сочетаются с болью (например, смещение межпозвоноковых дисков, дисплазия тазобедренного сустава или различные виды артритов задних конечностей).

Причина дегенеративной миелопатии пока непонятна, однако не вызывает сомнений аутоиммунный характер этого заболевания. Не исключено, что причиной или пусковым механизмом данного заболевания является вакцинация. Во время моей учебы в ветеринарном институте дегенеративная миелопатия отмечалась только у старых собак, однако сейчас встречаются случаи заболевания у молодых особей и даже (редко) у кошек.

Если возникает подозрение на это заболевание у вашей собаки, то непременно следует обратиться к ветеринару для соответствующего обследования и диагностики. Оно не является экстренным показанием для обращения в ветеринарную лечебницу и, в общем, не угрожает жизни вашего питомца. Однако постарайтесь собрать как можно больше информации, прежде чем определитесь с выбором метода лечения.

Особенности наблюдения и лечения при дегенеративной миелопатии

Методы аллопатического лечения данного заболевания не разработаны; насколько мне известно, даже методы холистического лечения дают минимальный эффект. Однако некоторые гомеопатические средства помогают замедлить течение болезни и порой могут способствовать обратному развитию симптомов. Конечно, лучше всего обратиться за помощью к ветеринару-гомеопату. Если же это невозможно, то для самостоятельного лечения вашего питомца можно попробовать одно из средств, которые перечисляются в этом разделе. Минимизировать поражение клеток спинного мозга помогают антиоксиданты, однако при их применении обратное развитие симптомов вряд ли возможно, так же как и полное излечение заболе-

вания. Я бы посоветовал вам назначить вашему питомцу *вита-мин С* (5–10 мг/фунт веса животных 2–3 раза в день), *вита-мин Е* (5–20 мг/фунт веса 1 раз в день) и *вита-мин А* (75–100 МЕ/фунт веса 1 раз в день). Хорошим антиоксидантным действием обладает также коэнзим *Q10* (*Coenzyme Q10*, 1–2 мг/фунт веса 1–2 раза в день), супероксид дисмутаза (*Superoxide dismutase*, 2000 МЕ или 125 мкг/10 фунтов веса ежедневно) и пикногенол (*Pycnogenol*, 1–2 мг/фунт веса 2 раза в день). Можно применять одно-два этих средства в дополнение к витаминам-антиоксидантам. Лецитин (*Lecithin*) обладает способностью улучшать прохождение импульсов по нервным стволам; лецитин назначается обычно по половине или полной чайной ложке на 10 фунтов веса животных ежедневно.

Гомеопатические средства при дегенеративной миелопатии

Alumina

Алюминий принимает участие в развитии многих заболеваний, в том числе и болезней нервной системы. Гомеопатическое средство *Alumina* полезно при параличах, особенно в сочетании с запорами и слабостью. У животных с симптомами этого препарата отмечаются слабые позывы к дефекации; каловые массы обычно сухие. Отмечается также сухость и выраженное шелушение кожи под шерстью. Улучшение состояния с последующим ухудшением могут наблюдаться в течение одного дня.

Argentum nitricum

Гомеопатическое средство *Argentum nitricum* готовится из нитрата серебра. Назначение данного лекарства полезно при параличе задних конечностей, особенно при дрожательном параличе. У животных с симптомами *Argentum nitricum* часто отмечается диарея с обилием газов. Эти животные обожают сладкое и конфеты, однако после сладкого симптомы заболевания часто усиливаются. Для животных с симптомами *Argentum nitricum* характерно чувство тревожности и страха, поэтому они часто предпочитают оставаться дома, вместо того, чтобы идти на прогулку. Им нравится прохладный свежий воздух, они не любят находиться в теплом помещении. Одним из симп-

томов заболевания у животных этого типа является нарушение движений языка, поэтому во время еды пища может выпадать из пасти.

Cocculus

Для животных с симптомами *Cocculus* характерны выраженное дрожание и судороги конечностей. В анамнезе у них отмечаются эпизоды укачивания при поездках в автомобиле. После таких поездок у животных *Cocculus* паралич задних конечностей часто усиливается. Характерны также боли в животе в сочетании с метеоризмом и тошнота при виде и запахе пищи. Собаки с симптомами этого средства обычно несколько заторможенные и вялые; у некоторых подобная психическая симптоматика проявляется по мере развития болезни.

Conium maculatum

Данное средство готовится из болиголова пятнистого (цикуты) — именно этот яд вызвал смерть Сократа. Характерным симптомом данного препарата является безболезненный восходящий паралич, который у человека начинается в области нижних конечностей и постепенно перемещается вверх, захватывая верхние конечности и дыхательную мускулатуру. Смерть наступает от остановки сердца и паралича дыхательных мышц. У животных с симптомами *Conium* развитие паралича происходит таким же образом — в начале заболевания отмечают слабость задних конечностей и медленное постепенное перемещение симптомов к передним конечностям. Характерна также сильная тошнота, которая возникает в положении лежа (у животных *Conium* все симптомы ухудшаются в покое). О назначении именно этого средства следует подумать в первую очередь при дегенеративной миелопатии у старых животных.

Gelsemium

Для *Gelsemium* характерно ощущение слабости, вялости, тяжести и усталости различных частей тела. Собакам с симптомами этого средства иногда трудно даже поднять веки. Отмечается психическая заторможенность в сочетании с тревожностью. Собаки *Gelsemium* часто боятся выходить из дома и предпочитают находиться в одиночестве; страх нередко вызывает

диарею. Слабость задних конечностей часто появляется после приступов соматических заболеваний или перенесенного горя.

Lathyrus

Lathyrus является почти специфическим средством при полиомиелите у людей. Характерно развитие глубокого безболезненного паралича, но с повышением сухожильных рефлексов. У животных развивается спастическая походка. Данное лекарство назначается в основном особям мужского пола. Типично ухудшение состояния при холодной сырой погоде.

Oleander

При отравлении этим ядовитым растением у животных возникает паралич задних конечностей. Соответственно гомеопатическое средство *Oleander* при подобной картине симптомов может значительно улучшить течение паралича. Характерна выраженная слабость и снижение кожной температуры конечностей, а также дрожание передних лап, особенно во время еды. Собаки испытывают сильный голод, но едят как-то медленно; часто отмечается метеоризм и диарея с выделением непереваренных остатков пищи. В некоторых случаях при отхождении газов возникает непроизвольная дефекация.

Picricum acidum

Симптомы данного препарата в виде восходящего паралича напоминают симптомы *Conium*, однако паралич прогрессирует значительно быстрее. Характерно чрезвычайное истощение собак при любых физических усилиях. Левая задняя конечность значительно слабее правой, однако в тех случаях, когда паралич достигает передних лап, наблюдается обратная картина — правая передняя конечность слабее левой. В некоторых случаях на фоне паралича возникает постоянная (иногда болезненная) эрекция полового члена.

Plumbum metallicum

Данное гомеопатическое средство готовится из металлического свинца. Типичными симптомами отравления свинцом являются анемия, коликообразные боли в животе и паралич мышц-разгибателей. У собак с симптомами *Plumbum* обычно

вялые слабые лапы. В отличие от типичных случаев дегенеративной миелопатии у собак этого типа отмечаются боли в области конечностей; тем не менее отсутствие болей не исключает возможности назначения *Plumbum*. Обычно собаки с симптомами данного средства тощие, болезненного вида. Каловые массы имеют желтый цвет, мягкую консистенцию и часто чрезвычайно зловонный запах.

Thuja occidentalis

Собаки с симптомами данного средства чрезвычайно зябкие; на коже у них обычно множество бородавок или других разрастаний. Задние конечности, как правило, неуклюжие и тугоподвижные — возможно, что у собак с симптомами *Thuja*, как и у людей с симптомами этого средства, в области конечностей отмечается ощущение одеревенения. Характерна также слабость, вялость и даже дряблость всего тела. Животные *Thuja* плохо переносят холод и сырость, реагируя на них ухудшением состояния.

ПАРАЛИЧ НОРНЫХ СОБАК

Это заболевание встречается достаточно редко. Предполагается, что паралич норных собак развивается вследствие вирусной инфекции, которая передается охотничьим собакам при укусах енотов; однако в некоторых случаях точных указаний на укус енота найти не удастся. Кроме норных собак в редких случаях этим заболеванием страдают собаки и других пород; у кошек это заболевание не встречается. При этом заболевании в течение нескольких дней развивается паралич задних конечностей, который постепенно перемещается к передним отделам туловища. Большинство собак полностью выздоравливают, однако процесс выздоровления может занять несколько недель. В очень редких случаях отмечается паралич дыхательной мускулатуры, приводящий к смерти животных. Картина паралича у норных собак во многом похожа на картину паралича задних конечностей у собак после укуса клеща (см. следующий раздел), однако паралич после укуса клеща развивается гораздо быстрее и так же быстро проходит; смертельных исходов не бывает.

При подозрении на это заболевание необходимо обратиться в ветеринарную лечебницу для уточнения диагноза. В домашних условиях можно попробовать лечить собаку одним из препаратов, описанных в разделе «Гомеопатические средства при дегенеративной миелопатии». Чаще всего полезно назначение или *Conium*, или *Lathyrus*, или *Picricum acidum*, однако картина симптомов у вашего питомца может соответствовать и другому средству. Если же после назначения гомеопатических лекарств состояние собаки не улучшится, то целесообразно обратиться к ветеринару-гомеопату.

ПАРАЛИЧ ВСЛЕДСТВИЕ УКУСА КЛЕЩА

Причиной данного типа паралича является токсин, который попадает в кровь собак при укусах коричневых собачьих клещей. Это заболевание достаточно редкое и встречается в основном на юге США — ареале обитания этого вида клещей. Развитие заболевания происходит за несколько часов, паралич начинается с задних конечностей и перемещается к передним. При осмотре кожи собаки обычно в области головы или шеи обнаруживается впившийся раздувшийся клещ. Для развития заболевания достаточно укуса всего лишь одного клеща, который вырабатывает данный тип токсина. Лечение очень простое и заключается в удалении клеща, после чего за несколько часов происходит полное выздоровление. Специального лечения не требуется.

СУДОРОЖНЫЕ ПРИПАДКИ

Судорожные припадки у вашего питомца являются показанием к обращению в ветеринарную лечебницу для уточнения диагноза. В некоторых случаях судороги являются одним из симптомов основного тяжелого заболевания, которое требует специального лечения. Если же очевидную причину судорожных припадков установить не удастся, то обычно считается, что собака страдает эпилепсией (эпилепсия намного чаще встречается у собак по сравнению с кошками). Однако говорить об эпилепсии у вашего питомца можно только в тех случаях, когда

вялые слабые лапы. В отличие от типичных случаев дегенеративной миелопатии у собак этого типа отмечаются боли в области конечностей; тем не менее отсутствие болей не исключает возможности назначения *Plumbum*. Обычно собаки с симптомами данного средства тощие, болезненного вида. Каловые массы имеют желтый цвет, мягкую консистенцию и часто чрезвычайно зловонный запах.

Thuja occidentalis

Собаки с симптомами данного средства чрезвычайно зябкие; на коже у них обычно множество бородавок или других разрастаний. Задние конечности, как правило, неуклюжие и тугоподвижные — возможно, что у собак с симптомами *Thuja*, как и у людей с симптомами этого средства, в области конечностей отмечается ощущение одеревенения. Характерна также слабость, вялость и даже дряблость всего тела. Животные *Thuja* плохо переносят холод и сырость, реагируя на них ухудшением состояния.

ПАРАЛИЧ НОРНЫХ СОБАК

Это заболевание встречается достаточно редко. Предполагается, что паралич норных собак развивается вследствие вирусной инфекции, которая передается охотничьим собакам при укусах енотов; однако в некоторых случаях точных указаний на укус енота найти не удастся. Кроме норных собак в редких случаях этим заболеванием страдают собаки и других пород; у кошек это заболевание не встречается. При этом заболевании в течение нескольких дней развивается паралич задних конечностей, который постепенно перемещается к передним отделам туловища. Большинство собак полностью выздоравливают, однако процесс выздоровления может занять несколько недель. В очень редких случаях отмечается паралич дыхательной мускулатуры, приводящий к смерти животных. Картина паралича у норных собак во многом похожа на картину паралича задних конечностей у собак после укуса клеща (см. следующий раздел), однако паралич после укуса клеща развивается гораздо быстрее и так же быстро проходит; смертельных исходов не бывает.

масла бурачника (5–10 мг на фунт веса ежедневно), которые обладают способностью уменьшать воспалительно-дегенеративные изменения нервной ткани. Назначение масла семян льна можно сочетать либо с маслом примулы, либо с маслом бурачника; если же вы решили применить все три растительных средства, то дозу масла примулы и масла бурачника следует уменьшить вдвое, оставив дозу масла семян льна неизменной.

Хорошим успокаивающим действием обладает фитопрепарат *Rescue Remedy*, который можно назначать вашему питомцу непосредственно перед развитием судорожного приступа (перед приступом судорог у животных обычно появляется выраженное беспокойство и возбуждение) или в промежутках между отдельными сериями судорог. В некоторых случаях это лекарство способствует прекращению приступа. Однако в подобных ситуациях необходимо соблюдать меры предосторожности, особенно если собака сильно скрежещет зубами — во время судорожных припадков она неумышленно может вас сильно укусить, поэтому не следует пытаться влить лекарство в рот, а лучше втереть несколько капель *Rescue Remedy* во внутреннюю поверхность ушной раковины или просто дать понюхать. Таким же образом во время приступа можно применять и гомеопатические средства, предварительно растворив несколько шариков в воде. Хорошим успокаивающим действием обладает также корень валерианы, однако давать это лекарство следует только вне приступа; пероральное применение каких-либо препаратов во время судорожного припадка опасно как для вас, так и для вашего питомца.

Гомеопатические средства первой помощи при судорожных припадках

Попробуйте применить одно из этих средств между сериями судорог, используя самые высокие потенции, которые вы сможете приобрести, в течение нескольких минут каждые два часа. Ответная реакция обычно наблюдается после приема трех-четырех доз.

Aconitum napellus

Данное средство эффективно при многих острых состояниях, к которым относятся и судорожные припадки. До начала

проанализированы и исключены все другие возможные причины судорожных приступов. Лечение эпилепсии лучше доверить опытному ветеринару-гомеопату — это заболевание слишком сложное для самостоятельного лечения в домашних условиях.

В этом разделе предлагаются некоторые дополнительные лекарства, которые целесообразно назначать при эпилепсии у животных, а также два гомеопатических средства, обладающих способностью предотвращать надвигающийся приступ судорог.

Особенности наблюдения и лечения судорожных припадков

Для всех животных с неврологическими заболеваниями, в том числе и с эпилепсией, полезно назначение витаминов группы В, которые оказывают положительное влияние на функцию всех отделов нервной системы. Обычно животным назначают «человеческий» комплекс витаминов группы В, применяя четверть человеческой дозы для кошек и собак мелких пород, половину дозы для собак средних пород (весом 25–60 фунтов) и полную дозу для собак крупных пород весом более 60 фунтов. Аминокислоты L-таурин и L-тирозин обладают способностью повышать устойчивость нервной ткани к возникновению судорожных припадков (эти аминокислоты обычно назначаются в дозе 5–10 мг на фунт веса животных 1–2 раза в день). Полезно также назначение аминокислоты L-триптофана. Несколько лет назад распространилась информация о токсическом влиянии на организм L-триптофана, после чего на продажу этого лекарства в США был наложен запрет. Однако при расследовании выяснилось, что виной всему была технологическая ошибка, допущенная при производстве L-триптофана методом генной инженерии, в результате которой произошло загрязнение одной из серий бактериальным токсином. На самом деле L-триптофан представляет собой безопасное и эффективное при многих заболеваниях лекарство. Я уверен, что в ближайшее время запрет на его применение будет снят. Триптофан назначается в тех же дозах, что и таурин и тирозин. Кроме этих лекарственных препаратов, животным с неврологическими заболеваниями полезно назначение таких антиоксидантов, как масло семян льна (четверть чайной ложки на 10 фунтов веса животных ежедневно), масла примулы вечерней (5–10 мг на фунт веса ежедневно) и

дельные случаи проявления рабического миазма у людей, однако это несопоставимо с частотой проявления рабического миазма у животных — возможно, из-за значительного количества вакцинаций, которые им проводятся. Это не означает, конечно, что у этих животных проявляются симптомы бешенства — скорее это симптомы состояния, которое вполне уместно было бы назвать «хроническое бешенство». При этом состоянии в организме животных отсутствуют живые вирусы бешенства, однако психические симптомы состояния напоминают симптомы этого заболевания, но выражены менее интенсивно.

Я далек от мысли, что все случаи агрессивного поведения животных прямо связаны с введением антирабической вакцины, однако имею веские основания подозревать, что большинство случаев агрессии так или иначе имеют какое-либо отношение к вакцинации. Случаи изменения поведения животных после введения антирабической вакцины очевидны. Однако не всегда удается доказать эту связь тогда, когда между вакцинацией и проявлением рабического миазма проходит длительное время (в том числе и в тех случаях, когда проявление рабического миазма у потомства связано с вакцинацией родителей). При антирабической вакцинации обычно вырабатывается пожизненный иммунитет (иногда после первой вакцинации, порой после второй, по крайней мере, после второй его имеют большинство привитых животных — 95 %). Необходимость ревакцинации является требованием закона и диктуется нашим страхом перед этим заболеванием; однако ревакцинация никак не может быть обоснована с точки зрения медицины. По моему убеждению, этот закон нуждается в дополнительной проработке — нельзя допускать, чтобы наши домашние животные страдали из-за непонятных страхов, распространенных в обществе, и из-за недостаточно накопленных знаний медицины (см. гл. 16 «Вакцинация»).

Гомеопатический метод лечения может помочь большинству животных с проявлением рабического миазма независимо от причины его возникновения. Эффективно также назначение дополнительных лекарств, которые обсуждались в разделе «Особенности лечения животных при судорожных припадках», в том числе витаминов группы В и аминокислоты триптофана. Лечение животных с выраженной агрессивностью сле-

судорог и после них у животных часто отмечается выраженное беспокойство и возбуждение. При отсутствии этих симптомов назначение *Aconitum* также не исключается.

Belladonna

Назначение *Belladonna* также эффективно при острых состояниях, в том числе и судорогах. У животных с симптомами данного средства больше выражена агрессивность, чем страх, отмечается расширение зрачков, гиперемия ушных раковин или других участков тела.

Если судороги у вашего питомца не прекращаются в течение нескольких минут, требуется экстренная помощь ветеринара. Короткий судорожный приступ обычно проходит без последствий, однако при затянувшихся судорожных припадках возможно поражение головного мозга и усиление в дальнейшем симптомов эпилепсии.

АГРЕССИВНОСТЬ И РАБИЧЕСКИЙ МИАЗМ

Ветеринары с большим стажем работы единодушно утверждают, что раньше собаки с агрессивным поведением встречались гораздо реже, чем в настоящее время. Причина этого явления непонятна, однако, если рассматривать эту проблему с точки зрения холистической медицины, то в большинстве случаев невозможно исключить влияние на психику животных введения антирабической вакцины. После проведения антирабической вакцинации поведение многих животных становится намного агрессивнее; подобное изменение поведения может бесследно исчезнуть через короткий промежуток времени, однако у некоторых остается на всю жизнь. В гомеопатической медицине для обозначения общей тенденции развития определенной болезни используется термин «миазм». Миазм представляет собой скорее модель проявлений болезни; сущность этого понятия не имеет ничего общего с термином «синдром» (совокупность симптомов), принятым в традиционной медицине. Одним из распространенных миазмов является рабический миазм, который как-либо связан с заболеванием бешенством или с вакцинацией против бешенства. В гомеопатической литературе описаны от-

ванные раны, чрезвычайно болезненные при прикосновении.

Hyoscyamus

Люди с симптомами *Hyoscyamus* часто не только агрессивны, но и похотливо-развратны; у животных *Hyoscyamus* также отмечается гиперсексуальное поведение, которое проявляется в виде мастурбации, характерной даже для кастрированных особей. Типичными симптомами картины данного препарата являются также подозрительность, презрительное отношение к окружающим и ревность; животные *Hyoscyamus* чрезвычайно недоверчивы. Приступы агрессивности могут сопровождаться судорогами.

Lachesis

Животные с симптомами *Lachesis*, как и представители типа *Hyoscyamus*, чрезвычайно ревнивы и подозрительны, однако приступы агрессии у них менее интенсивны. Чаще всего эти животные пассивны, но могут быть несколько раздражительны. Приступ агрессии чаще всего возникает в ответ на угрозу — однако этот ответ очень опасный и злобный (это средство готовится из яда змеи сурукуку — как тут не вспомнить о реакции этой змеи на потенциальную угрозу!). Животные с симптомами этого средства более агрессивны сразу после сна — старайтесь быть поосторожнее с *Lachesis*, который только что проснулся!

Lyssinum

Данное средство продается только по рецептам профессиональных гомеопатов, так как готовится путем потенцирования слюны собак, больных бешенством (однако, естественно, это лекарство не содержит живых вирусов бешенства). Гомеопаты, имеющие лицензию, могут назначать это средство тем животным с эпизодами агрессии, у которых не отмечается ответной реакции на применение других препаратов этой группы — иногда назначение *Lyssinum* бывает очень эффективным.

Mercurius (vivus, solubilis)

У животных с симптомами данного препарата часто отмечаются и соматические, и психические заболевания. Характерная черта этих животных — некоторая недоступность, т. е. они

дует доверить опытным ветеринарам-гомеопатам, однако при наличии отдельных черт легкой агрессии вполне допустимо самостоятельное лечение. Тем не менее при обращении с животными с агрессивным поведением необходимо соблюдать все меры предосторожности, в противном случае могут пострадать и дети, и взрослые, и другие домашние животные. Взрослые крупные собаки с явно агрессивным поведением слишком опасны, чтобы держать их дома. Будучи ветеринаром, я всегда стараюсь отстаивать права животных и при рассмотрении данной проблемы не хотел бы отступать от своих убеждений, однако в данном случае соображения безопасности окружающих имеют основное значение. Если у вас есть какие-либо сомнения, то непременно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Гомеопатические средства при агрессивности

В этом разделе приводится краткое описание основных гомеопатических средств при агрессивности. Если ни одно из этих средств не соответствует симптомам вашего питомца, то непременно проконсультируйтесь с ветеринаром-гомеопатом.

Belladonna

Для агрессивных животных с симптомами *Belladonna* характерно внезапное появление приступов ярости, при этом у животных расширяются зрачки и взгляд становится застывшим. Часто отмечается покраснение ушных раковин и глаз. У таких животных нередко отмечаются черты деструктивного поведения (характерный симптом бешенства) — они раздирают свою подстилку, бросаются грызть мебель и т. п. Кроме того, у них часто отмечается головокружение.

Hepar sulphuris calcareum

Животные с симптомами данного средства чрезвычайно раздражительные и упрямые, именно поэтому их агрессивность часто направлена против того, кто пытается принудить их к повиновению. Как правило, причиной вспышки ярости становится какой-либо малозначащий случай, с которым совершенно несопоставима ответная агрессия животных. Животные *Hepar sulphuris calcareum* обычно зябкие и отличаются повышенной чувствительностью; у них часто обнаруживаются инфициро-

случаях при травмах головного и спинного мозга мы мало что можем сделать; нам остается только ждать, пока организм самостоятельно справится с повреждением, и помогать ему, назначая гомеопатические средства для ускорения процесса излечения. Даже в тех случаях, когда животным показано хирургическое лечение, применение гомеопатических средств вполне оправданно и целесообразно. Назначьте вашему питомцу *Arnica* сразу же после получения травмы и продолжайте давать это средство в первые несколько дней; назначение следующего препарата будет зависеть от картины симптомов. При необходимости хирургического вмешательства следует назначить *Arnica* до и после дня операции, если не проявится четко картина другого гомеопатического средства. Обычно симптомы, указывающие на подобное лекарство, отчетливо проявляются после окончания острой стадии травматического повреждения. Назначение гомеопатических средств при смещении межпозвонковых дисков описано в главе 12 «Костно-мышечная система».

Гомеопатические средства при травмах головного и спинного мозга

Arnica montana

Почти при всех видах травм *Arnica* является главным гомеопатическим средством, о назначении которого следует подумать в первую очередь. Данное лекарство обладает способностью предотвращать дальнейшее поражение и ускорять заживление. Характерным для *Arnica* симптомом является настолько интенсивная боль, что животные боятся любых прикосновений и даже приближения к пораженному участку. Именно из-за боли животные не могут найти комфортного положения, даже мягкая подстилка кажется им неудобной и твердой.

Cicuta virosa

Данное средство более эффективно при травмах головного мозга по сравнению с травмами спинного мозга. Характерным симптомом *Cicuta virosa* является поражение глазодвигательных мышц, вследствие которого после сотрясения головного мозга остается сходящееся или расходящееся косоглазие. Обычно животные с симптомами *Cicuta virosa* избегают обще-

производят впечатление созданий, которые не нуждаются в чьей-либо любви и заботе, в том числе и членов семьи, где они живут. Они ненавидят, когда их пытаются приучить к дисциплине, реагируя на это рычанием и даже укусами. Для животных этого типа характерны заболевания десен.

Nux vomica

Животные с симптомами данного лекарства скорее раздражительные и злые, чем агрессивные, особенно когда они не очень хорошо себя чувствуют. У них часто отмечается диарея или запор в сочетании с характерными тенезмами. В анамнезе у животных *Nux vomica* нередко встречаются указания на избыточное применение аллопатических лекарств.

Stramonium

На основании собственного практического опыта я могу сказать, что *Stramonium* является одним из лучших гомеопатических средств при агрессивности животных, появляющейся после введения антирабической вакцины. Агрессия у этих животных вызвана страхом. Вспышка агрессии и нападение на тех, кто находится рядом (неважно, человек это или другие животные), могут быть спровоцированы каким-либо посторонним шумом за окном, который воспринимается как угроза. Эта особенность поведения отмечается в картине и других гомеопатических средств, но наиболее ярко выражена именно у *Stramonium*. Животные с симптомами этого препарата чрезвычайно боятся темноты или ярких вспышек света. Такое поведение животных *Stramonium* неудивительно — ведь это лекарство готовится из растения, обладающего выраженными галлюциногенными свойствами.

ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Несомненно, что всех животных с травматическим повреждением любого вида, в том числе и с травмой головного и спинного мозга, прежде всего должен осмотреть ветеринар — это необходимо для уточнения диагноза и определения показаний для возможного хирургического вмешательства. Однако во многих

Natrum sulphuricum

Показанием к назначению *Natrum sulphuricum* являются случаи изменения психического статуса животных после травмы головного или спинного мозга. Характерна интенсивная головная боль в области основания черепа и задней поверхности шеи; боль вызывает раздражительность животных и состояние депрессии. Если боли подобного характера сохраняются несколько месяцев после травмы, то назначение данного лекарства будет эффективным. Головная боль может сочетаться с выраженной реакцией на солнечный свет или вспышку яркого света.

Ruta graveolens

Данное средство, подобно *Arnica*, облегчает боли при переломах и вывихах. Назначение *Ruta* полезно при травме спинного мозга, которая сопровождается сильными болями, беспокойством, выраженной слабостью нижних конечностей в положении стоя и после физической нагрузки. При движении боли облегчаются, поэтому часто животные с симптомами этого средства не могут лежать спокойно и вынуждены постоянно двигать задними конечностями.

Thuja occidentalis

При травмах спинного мозга назначение *Thuja* особенно полезно в тех случаях, когда преобладает онемение и скованность движений задних конечностей, а не боли. Эти симптомы могут сочетаться с нарушением мочеиспускания.

Репродуктивная система

Обзор

Мужская половая система

Функции

Выделения из половых путей
(баланопостит, воспаление крайней плоти)

Фимоз и парафимоз

Крипторхизм

Воспаление яичек (орхит)

Травмы яичек

Заболевания простаты

Гиперсексуальное поведение

Женская половая система

Функции

Выделения из влагалища

Беременность и неонатальный период

Беременность

Роды

Послеродовые состояния

Неонатальный период

Заболевания молочных желез

ОБЗОР

В настоящее время многим ветеринарам редко приходится иметь дело с интактными животными и их проблемами. Многие домашние животные по ряду причин подвергаются кастрации еще до наступления половой зрелости; основными причинами этого явления можно считать избыточную численность (сверхпопуляцию) домашних животных и некоторые неудобства совместного проживания с интактными особями. Доля людей, которые занимаются разведением домашних животных, в целом незначительна. Однако некоторые мои клиенты решаются на спаривание своих домашних животных и принимают активное участие в заботах об их потомстве. Возможно, поэтому моя точка зрения на проблему размножения домашних животных несколько отличается от общепринятой.

Некоторые проблемы этического характера, связанные с кастрацией и необходимостью ограничения рождаемости домашних животных, решить достаточно сложно (я применяю термин «кастрация» к особям как женского, так и мужского пола). Любое обсуждение данной темы лишь подстегивает многочисленные споры. Признавая это, я тем не менее считаю, что данную тему нельзя игнорировать; на основании собственного практического опыта у меня тоже сформировалось собственное мнение по ряду вопросов, которым я хотел бы поделиться со своими читателями. Я ни в коем случае не считаю свою точку зрения единственно верной и не призываю слепо ей следовать; однако я надеюсь, что обсуждение некоторых актуальных тем вдохновит вас на размышления и будет способствовать принятию более разумных и взвешенных решений. В отношении кастрации или размножения ваших питомцев вам надлежит принять свое собственное решение – но при этом вам непременно следует учитывать интересы тех живых существ, которые полностью находятся на вашем попечении. Я всего лишь призываю вас всесторонне обдумать этот вопрос на основе равноправных отношений.

С моей точки зрения, основной вопрос при решении всех проблем, связанных с разведением домашних животных – «Чьи же интересы мы должны защищать?» Что бы вы ни выбрали для своих подопечных – кастрировать ли их или оставить ин-

тактными и принять участие в заботе об их потомстве, — вам необходимо четко представлять себе, в чьих интересах вы действуете. Далее, вам необходимо во всех случаях отчетливо понимать, не причинят ли ваши действия вред психическому и физическому здоровью ваших питомцев.

Я совершенно убежден, что во всех случаях, при решении всех проблем мы должны действовать только исходя из интересов наших питомцев. С подобной точкой зрения согласны далеко не все — многие люди убеждены, что на первом месте должны стоять их собственные интересы, а потом уж интересы домашних животных. В данном случае уместно этих людей назвать «владельцы» домашних животных, но уж никак не «опекуны и защитники». Ну а в тех случаях, когда люди пытаются решать свои проблемы за счет домашних животных, можно ли вообще говорить о добродетели?

Кастрация

Возвращаясь к конкретной теме данной главы, прежде всего рассмотрим поподробнее вопросы, связанные с кастрацией животных. В основном домашних животных подвергают кастрации по одной из следующих причин — или нас не устраивают особенности поведения животных, связанные с их репродуктивной функцией, или же мы считаем, что следует значительно ограничить рождаемость из-за чрезмерной численности домашних животных. С идеальной точки зрения мы, безусловно, не имеем никакого морального права подвергать кастрации другие живые существа без их согласия, однако в данном случае, естественно, их согласие получить просто невозможно. Но на самом деле такая точка зрения является умозрительной и далекой от реальности, так как все, что связано с избыточной численностью домашних животных, в той же степени связано и с жизнью человека. Если полностью прекратить проведение кастрации, то в итоге может пострадать множество домашних животных — таким образом, кастрация в целом проводится в интересах всего вида. Кроме того, многие люди не хотели бы содержать интактных (некастрированных) животных, поэтому изменение их поведения после кастрации позволит им иметь свой дом и жить в семьях, где их будут любить и заботиться об их здоровье.

В настоящее время, однако, многие люди считают проведение

кастрации неэтичным — они готовы содержать интактных животных и заботиться о них, но при этом не допуская их спаривания и размножения и не увеличивая таким образом численность их популяции. На первый взгляд это хорошее компромиссное решение проблемы — фактически именно так и поступают во многих семьях, считая, что животные рождаются интактными и в таком состоянии должны прожить всю свою жизнь. Однако, если рассмотреть эту ситуацию более пристально, то прослеживается некоторая нелогичность. Если животные рождаются интактными и должны оставаться интактными в течение всей своей жизни, *то они должны размножаться.*

У интактных животных с нереализованной репродуктивной функцией возникает масса проблем со здоровьем. Кроме того, вследствие подавления гормонального «всплеска» у значительного числа интактных животных возникают нарушения со стороны психоэмоциональной сферы. Так следует кастрировать домашних животных или нет? По моему мнению, после кастрации у них уменьшается количество стрессовых факторов и, следовательно, улучшается их здоровье — в отличие от тех особей, у которых есть все возможности для реализации своей репродуктивной функции, но эта функция искусственно подавляется и ограничивается в течение всей жизни.

Какой же возраст у кошек и собак считается оптимальным для проведения кастрации? В течение многих лет кастрация проводилась в возрасте примерно шести месяцев, после полного анатомического развития всех органов репродукции, но до первого гормонального всплеска. Однако, на мой взгляд, рациональнее проводить кастрацию у особей мужского пола чуть позднее — в возрасте примерно восьми месяцев, учитывая их более медленное созревание. Это небольшое отличие особенно важно учесть при кастрации котов — дело в том, что все представители семейства кошачьих подвержены заболеваниям мочевыводящей системы, а полное формирование уретры нормального диаметра заканчивается именно к этому возрасту. Таким образом, кастрация котов в возрасте восьми месяцев имеет некоторое профилактическое значение, предупреждая возникновение в будущем обструкции уретры. (Некоторые ветеринары не придают этому особого значения, однако при исследованиях установлено, что ранняя кастрация котов часто

тактными и принять участие в заботе об их потомстве, — вам необходимо четко представлять себе, в чьих интересах вы действуете. Далее, вам необходимо во всех случаях отчетливо понимать, не причинят ли ваши действия вред психическому и физическому здоровью ваших питомцев.

Я совершенно убежден, что во всех случаях, при решении всех проблем мы должны действовать только исходя из интересов наших питомцев. С подобной точкой зрения согласны далеко не все — многие люди убеждены, что на первом месте должны стоять их собственные интересы, а потом уж интересы домашних животных. В данном случае уместно этих людей назвать «владельцы» домашних животных, но уж никак не «опекуны и защитники». Ну а в тех случаях, когда люди пытаются решать свои проблемы за счет домашних животных, можно ли вообще говорить о добродетели?

Кастрация

Возвращаясь к конкретной теме данной главы, прежде всего рассмотрим поподробнее вопросы, связанные с кастрацией животных. В основном домашних животных подвергают кастрации по одной из следующих причин — или нас не устраивают особенности поведения животных, связанные с их репродуктивной функцией, или же мы считаем, что следует значительно ограничить рождаемость из-за чрезмерной численности домашних животных. С идеальной точки зрения мы, безусловно, не имеем никакого морального права подвергать кастрации другие живые существа без их согласия, однако в данном случае, естественно, их согласие получить просто невозможно. Но на самом деле такая точка зрения является умозрительной и далекой от реальности, так как все, что связано с избыточной численностью домашних животных, в той же степени связано и с жизнью человека. Если полностью прекратить проведение кастрации, то в итоге может пострадать множество домашних животных — таким образом, кастрация в целом проводится в интересах всего вида. Кроме того, многие люди не хотели бы содержать интактных (некастрированных) животных, поэтому изменение их поведения после кастрации позволит им иметь свой дом и жить в семьях, где их будут любить и заботиться об их здоровье.

В настоящее время, однако, многие люди считают проведение

рации сводятся к следующему. У особей женского пола обоих видов разумнее проводить кастрацию не ранее чем в возрасте шести месяцев (и, как вариант, после первого полового цикла). У особей мужского пола кастрацию следует проводить не ранее чем в возрасте восьми месяцев, но и не позднее 10 месяцев, так как в этом возрасте уже сформированы основные особенности «мужского» типа поведения.

Размножение

Конечно, у меня как у ветеринара несколько особое отношение к данному вопросу. Безусловно, некоторые породы кошек и собак кажутся мне необычайно привлекательными по своей красоте и оригинальности. Но, с другой стороны, мне приходилось лечить множество животных, слабость которых была обусловлена генетически и происходила из-за близкородственного спаривания их предков. Термин «близкородственное спаривание» я в данном случае применяю для обозначения чистокровных породистых животных, поскольку выведение любой породы животных подразумевает спаривание именно генетически близких родственных особей. Отклонения в развитии случаются время от времени среди животных чистых линий любой породы, однако истинным источником этих врожденных дефектов является инбридинг в течение нескольких поколений. За некоторым редким исключением породистые животные в целом не отличаются крепким здоровьем, в отличие от животных «смешанного происхождения», к которым принадлежат, например, самые обычные дворняги.

Я понимаю, что в этом утверждении есть много спорного, однако уверен, что большинство ветеринаров согласятся со мной. У породистых животных обычно бывает масса проблем со здоровьем, однако виновата в этом не только генетика. Породистые животные в течение своей жизни получают значительно больше различных аллопатических лекарств и вакцин, чем их беспородные собратья; по моему убеждению, именно этот фактор пагубным образом влияет на состояние их здоровья. Однако врожденную слабость тоже нельзя исключать, так как, возможно, именно из-за нее чистопородные животные более подвержены действию различных стрессовых факторов.

Таким образом, спаривание породистых животных происхо-

дит явно не в интересах этих животных и их потомков. Мне кажется сомнительным, что собак и кошек так уж интересуется собственный оригинальный внешний вид. Конечно, и кошки, и собаки заботятся о своей внешности — о чистоте шерсти, например, и о некоторых других аспектах, но при спаривании породистых животных обычно имеют в виду несколько иные критерии. Кроме того, спаривание близкородственных породистых животных, несомненно, может повлиять на здоровье их потомков. Во многих случаях здоровье потомков может и не пострадать так уж сильно; однако известно множество случаев, когда при близкородственном спаривании особей с многочисленными нарушениями здоровья рождались потомки с большими отклонениями от нормы. Я уверен, что в данном случае размножение таких животных — самый настоящий грех. Конечно, могут быть самые различные мнения относительно того, каких животных можно считать здоровыми и где проходит граница между «здоровьем» и «нездоровьем», однако в большинстве случаев это можно определить достаточно четко.

Мой опыт работы в приюте для животных лишь укрепил мои сомнения, касающиеся бесконтрольного размножения домашних животных. Мне пришлось не только работать в совете директоров одного из приютов, но и выполнять работу ветеринара. Одной из самых жутких обязанностей, которую я вынужден был выполнять, было проведение летальных инъекций нежелательным щенкам и котят (я мог бы употребить термин «эвтаназия», однако это не изменило бы сущности дела). Худшего дела в жизни просто невозможно себе представить, даже обладая более богатым воображением, — ведь из-за недостатка места для их обитания по всей стране в течение часа могли быть убиты тысячи только что родившихся животных. Именно поэтому я никогда не смогу поддержать идею бесконтрольного размножения домашних животных. Для сохранения жизни одного породистого животного мы вынуждены лишать жизни другое животное, иначе их численность просто превысит все допустимые значения.

Я вполне понимаю, что в этом утверждении содержится какая-то доля непорядочности по отношению к тем, кто ответственно подходит к вопросу размножения своих домашних питомцев, всем сердцем любит их и заботится о них и их потом-

стве. Встречается и другая крайность, когда ради дохода, который может принести продажа щенков, люди безжалостно спаривают собак, продавая помет за пометом; этих людей не интересует ни здоровье своих питомцев, ни здоровье щенков, ни условия жизни, в которых эти щенки будут жить в дальнейшем. Нам не следует забывать, что все наши действия должны быть обдуманными, так как никто из нас не может жить в изоляции от остального мира. Как пишут на наклейках на бампере — «Думай глобально, но действуй локально».

Тем же, кто считает необходимым размножение своих питомцев, следует позаботиться о тех, кто придет в наш мир, и прежде всего позаботиться об их здоровье. Хотелось бы быть уверенным, что вы для этого сделаете все, что возможно.

Содержание данной главы

Прежде всего в данной главе рассматриваются основные функции и заболевания мужской половой системы; однако объем информации относительно небольшой по сравнению с информацией по функциям и заболеваниям женской половой системы. В разделе «Женская половая система» рассматриваются также некоторые вопросы, связанные с беременностью и неонатальным периодом. Как уже поняли мои читатели, я сторонник обдуманного ограничения рождаемости домашних животных; если же вы их оставляете интактными, то вопрос об их размножении следует всесторонне обдумать. Я не ставил своей задачей обсуждение некоторых специальных проблем, в частности проблемы бесплодия — я убежден, что в целом все имеет свою причину и свое биологическое обоснование. Известно, что в тех случаях, когда у женщин имеются проблемы с зачатием, очень высока вероятность рождения детей с пороками развития. Я убежден, что у природы имеются свои собственные методы уменьшения числа пороков развития, поэтому не следует грубо вторгаться в эту область.

По сравнению с другими главами книги, посвященными лечению, в данной главе заболевания описываются более специфично. Однако при выборе подобного гомеопатического средства вам следует руководствоваться основными принципами гомеопатии и стараться подобрать такое средство, в картине которого были бы возможно более полно отражены все симпто-

мы, которые наблюдаются у вашего питомца.

– МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА –

ФУНКЦИИ

Органы мужской половой системы выполняют две основные функции. Во-первых, в яичках продуцируется гормон тестостерон, который инициирует развитие организма по мужскому типу и соответствующее поведение. Во-вторых, в органах мужской половой системы вырабатывается сперма для воспроизведения потомства. Сперматогенез происходит при температуре более низкой, чем температура внутренней среды организма, поэтому в норме яички располагаются в мошонке. Процесс формирования яичек у зародыша происходит в брюшной полости, затем яички постепенно опускаются в мошонку. В норме яички должны локализоваться в мошонке в возрасте 4–8 недель жизни. При крипторхизме в яичках, которые остались в брюшной полости, сперматогенез не происходит, однако продукция гормонов сохраняется. Повышенная температура внутренней среды организма может спровоцировать развитие злокачественных опухолей яичек, которые вовремя не опустились в мошонку, поэтому животных с крипторхизмом следует подвергнуть кастрации.

Головка полового члена покрыта крайней плотью или препуцием, который у кобелей прикрепляется к коже передней брюшной стенки, а у котов – к мошонке. У кобелей половой член выходит из препуциального мешка при эрекции, а у котов – и при эрекции, и во время мочеиспускания.

Предстательная железа или простата также является частью мужской половой системы; простата кольцеобразно охватывает уретру и окружает семявыносящий проток в месте входа его в мочеиспускательный канал. Именно в предстательной железе секретируется жидкая часть спермы, которая при эякуляции вместе со сперматозоидами извергается наружу.

Помимо различных заболеваний, приводящих к бесплодию особей мужского пола, в разных отделах мужской половой си-

стемы могут возникать воспалительные процессы. В некоторых случаях у кобелей отмечается сужение крайней плоти, которое затрудняет экструзию и ретракцию полового члена при спаривании. У котов такие проблемы возникают крайне редко. Крипторхизм также является уделом кобелей, а у котов практически не наблюдается.

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ (БАЛАНОПОСТИТ, ВОСПАЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ)

Выделения из половых путей — явление, достаточно распространенное у собак, однако в общем им это не приносит большого вреда. Гораздо труднее устранить полностью эти выделения. Выделения из половых путей обычно имеют желтый или желто-зеленый цвет, иногда они достаточно густые и могут выделяться по каплям. Собаки интенсивно и часто вылизывают область гениталий. Ветеринары называют это состояние *баланопостит*, или воспаление крайней плоти.

Местное лечение баланопостита заключается в промывании препуциального мешка один-два раза в день солевым раствором *Calendula* или солевым раствором *Hypericum*. Для приготовления раствора для промывания надо растворить в одном стакане теплой прокипяченной воды четверть чайной ложки поваренной соли и добавить 10–20 капель аптечной настойки *Calendula* или *Hypericum*. Данный раствор обладает выраженным противобактериальным действием.

Гомеопатические средства для лечения выделений из половых путей

При выделениях из половых путей прежде всего следует назначить гомеопатическое средство *Thuja*; если особого эффекта не будет, то примените одно из следующих средств. Не забывайте, что *Mercurius* и *Silicea* никогда не назначаются друг за другом.

Cinnabaris

У собак с симптомами данного средства отмечаются не только обильные выделения, но и выраженное воспаление препу-

циального мешка. Область крайней плоти гиперемированная, отечная и болезненная. У собак выражена сильная жажда; она вздрагивает во сне.

Hepar sulphuris calcareum

Собаки с симптомами данного средства чрезвычайно раздражительны; выделения из половых путей обычно имеют зловонный запах.

Mercurius (vivus, solubilis)

В сущности, свойства *Mercurius vivus* и *Mercurius solubilis* практически одинаковые; *Mercurius corrosivus* отличается от этих средств лишь некоторыми особенностями. Однако в целом показания для назначения средств меркуриальной группы очень сходны между собой. Выделения у собак с симптомами данных препаратов скорее зеленоватого, а не желтого цвета. У этих животных отмечается выраженная раздражительность и нежелание подчиняться дисциплине.

Nitricum acidum

Собаки с симптомами данного средства при осмотре могут выявлять признаки агрессии из-за непереносимых болей в области воспаления, которые напоминают боли от глубокой болезненной занозы. Характерным симптомом является зябкость. Часто боли отмечаются также и при мочеиспускании, поэтому собаки поскуливают и даже отказываются выходить на улицу для опорожнения своих надобностей. После мочеиспускания собаки интенсивно вылизывают наружные половые органы.

Silicea (Silica)

У собак с симптомами данного средства воспаление выражено в минимальной степени, выделения обычно желтого цвета и нераздражающего характера. По характеру животные *Silicea* обычно дружелюбные и благодушные. Из-за слабого здоровья они чаще всего тощие, изящного телосложения.

Sulphur

Собаки с симптомами данного средства также дружелюбные и благодушно настроенные; они выглядят несколько неопрят-

но, так как мало заботятся о своей внешности. Наверное, они считают, что жизнь — это такая чудесная штука, что незачем тратить время зря на какое-то там вылизывание шерсти и приведение себя в порядок.

ФИМОЗ И ПАРАФИМОЗ

Причиной и фимоза, и парафимоза является сужение крайней плоти, что затрудняет или даже делает невозможным движения полового члена. При фимозе затрудняется экструзия полового члена; при парафимозе затруднена ретракция полового члена и возвращение его в обычное положение. Парафимоз является намного более серьезным состоянием, так как из-за сужения крайней плоти происходит сдавление полового члена и резкое нарушение кровообращения, что может привести к гангрене.

Сужение крайней плоти может быть врожденным и приобретенным, чаще всего за счет воспаления и отека препуция. При врожденном сужении требуется оперативное вмешательство; при воспалении и отеке крайней плоти возможно гомеопатическое лечение.

Причиной воспаления крайней плоти чаще всего является инфекция, однако в редких случаях отек и воспаление могут быть следствием травматического повреждения.

Особенности наблюдения и лечения при фимозе и парафимозе

При парафимозе необходима экстренная помощь ветеринара, особенно если не удалась репозиция полового члена и устранение его сдавления за 15–30 минут. В норме половой член у особей мужского пола обоих видов имеет ярко-красный цвет, напоминающий цвет десен у здоровых животных. В тех случаях, когда вследствие сдавления суженной крайней плотью половой член у животных приобретает темный цвет, следует немедленно обратиться в ветлечебницу.

Для ускорения и облегчения ретракции полового члена можно приложить холодный солевой раствор (одна чайная ложка соли на один стакан воды) на несколько минут и дать одно из гомеопатических лекарств, перечисленных в данном разделе.

циального мешка. Область крайней плоти гиперемированная, отечная и болезненная. У собак выражена сильная жажда; они вздрагивают во сне.

Hepar sulphuris calcareum

Собаки с симптомами данного средства чрезвычайно раздражительны; выделения из половых путей обычно имеют зловонный запах.

Mercurius (vivus, solubilis)

В сущности, свойства *Mercurius vivus* и *Mercurius solubilis* практически одинаковые; *Mercurius corrosivus* отличается от этих средств лишь некоторыми особенностями. Однако в целом показания для назначения средств меркуриальной группы очень сходны между собой. Выделения у собак с симптомами данных препаратов скорее зеленоватого, а не желтого цвета. У этих животных отмечается выраженная раздражительность и нежелание подчиняться дисциплине.

Nitricum acidum

Собаки с симптомами данного средства при осмотре могут выявлять признаки агрессии из-за непереносимых болей в области воспаления, которые напоминают боли от глубокой болезненной занозы. Характерным симптомом является зябкость. Часто боли отмечаются также и при мочеиспускании, поэтому собаки поскуливают и даже отказываются выходить на улицу для опорожнения своих надобностей. После мочеиспускания собаки интенсивно вылизывают наружные половые органы.

Silicea (Silica)

У собак с симптомами данного средства воспаление выражено в минимальной степени, выделения обычно желтого цвета и нераздражающего характера. По характеру животные *Silicea* обычно дружелюбные и благодушные. Из-за слабого здоровья они чаще всего тощие, изящного телосложения.

Sulphur

Собаки с симптомами данного средства также дружелюбные и благодушно настроенные; они выглядят несколько неопрят-

раздражительность. Боли спастического характера могут быть настолько сильными, что собаки постоянно крутятся, извиваются и сгибаются пополам, чтобы хоть немного облегчить боли.

Mercurius (vivus, solubilis), Mercurius corrosivus

См. раздел «Гомеопатические средства при выделениях из половых путей».

Nitricum acidum

См. раздел «Гомеопатические средства при выделениях из половых путей».

Rhus toxicodendron

Мягкий ненапряженный отек напоминает состояние *Apis*, однако крайняя плоть гиперемирована и раздражена. У собак с симптомами данного средства отмечается беспокойство и жажда.

КРИПТОРХИЗМ

Мы уже говорили, что яички развиваются в брюшной полости и опускаются в мошонку в возрасте примерно 4–5 недель. В тех случаях, когда до возраста 6–8 недель нормального опускания яичек в мошонку не происходит, диагностируется крипторхизм (или монорхизм, если в мошонку опускается только одно яичко). Чаще всего при крипторхизме яичко обнаруживается в брюшной полости, однако в некоторых случаях отмечается неполное его опускание — тогда яичко можно пропальпировать позади полового члена. Крипторхизм значительно чаще встречается у собак. При крипторхизме мы всегда рекомендуем кастрацию из-за значительного риска злокачественного перерождения неправильно расположенного яичка, особенно при локализации яичка в брюшной полости.

В редких случаях с помощью гомеопатических средств удастся нормализовать процесс опускания яичек в мошонку, однако в этой ситуации следует назначать лечение в раннем возрасте. Крипторхизм часто передается по наследству, поэтому животные с данным типом патологии не должны участвовать в племенной работе. Кроме того, мне кажется неэтичным учас-

Затем следует смазать половой член вазелином или мазью *Calendula*; возможно, что при помощи этих лекарств удастся справиться с парафимозом. Если вправление полового члена произвести не удалось, то следует обратиться в экстренном порядке к ветеринару. Если же вправление было удачным, то следует промыть область крайней плоти физиологическим раствором с добавлением настойки *Calendula* или настойки *Hypericum* (см. раздел «Выделения из половых путей»). В дальнейшем лечение проводить так же, как и лечение баланопостита и выделений из половых путей.

Фимоз часто протекает скрыто и распознается только при спаривании, когда отчетливо видна невозможность экструзии полового члена. Фимоз следует лечить с помощью тех же гомеопатических средств, что и баланопостит. Непременно проконсультируйтесь с ветеринаром, так как, возможно, потребуются оперативное лечение.

Гомеопатические средства при фимозе и парафимозе

В тех случаях, когда фимоз или парафимоз развиваются вследствие травматического повреждения полового члена, назначьте *Arnica*; если состояние не облегчается, то затем примените *Bellis perennis* или *Conium*.

Если причиной развития фимоза или парафимоза является воспаление, то можно назначить одно из следующих гомеопатических средств.

Apis mellifica

Отмечается отек крайней плоти, бледный цвет и снижение кожной температуры. Для данного средства характерен мягкий ненапряженный отек.

Cinnabaris

См. раздел «Гомеопатические средства при выделениях из половых путей».

Colocynthis

У животных *Colocynthis* состояние фимоза или парафимоза может возникнуть вследствие эпизода сильной злобы или раздражения; для этих животных вообще типична выраженная

не безопасно, *Syphilinum* и *Tuberculinum* являются глубоко действующими средствами, с которыми могут работать только профессиональные гомеопаты.

ВОСПАЛЕНИЕ ЯИЧЕК (ОРХИТ)

Воспаление яичек у особей мужского пола обоих видов встречается достаточно редко, причем у котов это заболевание расценивается как казуистический случай. При развитии воспаления в области яичек возникает сильнейшая болезненность, быстро нарастает отек, яички становятся горячие на ощупь. В случаях сильного воспаления мошонка приобретает ярко-красный цвет и через половые пути выделяется прозрачный простатический секрет. В тяжелых случаях возможно развитие абсцессов и их самопроизвольное вскрытие с отделением гноя.

При развитии подобного состояния животное непременно следует показать ветеринару и провести диагностические тесты на наличие бруцеллеза. Возбудителем бруцеллеза у собак является *Brucella canis*, заболевание передается при половых контактах, а также при контакте с мочой или выделениями из уретры больных животных. Различают несколько типов бруцелл, которые поражают крупный рогатый скот, овец, коз, свиней и лошадей. При контакте с больными животными могут заражаться и люди; обычно у людей бруцеллез протекает достаточно тяжело (другое название бруцеллеза у людей — волнообразная или Мальтийская лихорадка). У собак бруцеллы могут вызывать не только воспаление яичек, но и воспаление предстательной железы. У особей женского пола бруцеллы могут явиться причиной привычного выкидыша и бесплодия.

Последствием орхита у собак является бесплодие, возникающее вследствие значительного поражения ткани яичек. Конвенциональное лечение заключается в кастрации кобелей и назначении антибиотиков. При бруцеллезе некоторые ветеринары рекомендуют эвтаназию больных животных из-за возможности заражения людей.

Если диагноз бруцеллеза при развитии орхита не подтверждается, то можно попробовать лечение одним из следующих гомеопатических средств. Однако в тех случаях, когда назна-

тие этих животных в выставках, даже если после оперативного лечения удалось восстановить нормальные анатомические взаимоотношения наружных половых органов.

Гомеопатические средства при крипторхизме

Вероятность излечения крипторхизма гомеопатическим методом невелика; при неполном опускании яичек результаты несколько лучше. В тех случаях, когда вы не считаете нужным провести кастрацию, все же следует попытаться провести гомеопатическое лечение.

Aurum

Характерными симптомами данного средства являются подавленное состояние животных и наличие множества других заболеваний, в частности конъюнктивита, хронических выделений из носа и т. п. Для этих животных характерна также «тяжелая поступь» и неприятие правил дисциплины.

Calcareo carbonica

Животные с симптомами данного средства обычно ширококостные, с избыточным весом и неуклюжие. Часто щенки поздно начинают ходить. Кроме того, одним из характерных симптомов является диарея после употребления молока.

Calcareo phosphorica

Симптомы данного средства во многом напоминают симптомы *Calcareo carbonica*, однако для животных *Calcareo phosphorica* характерно изящное и хрупкое телосложение.

Psorinum

Данное гомеопатическое средство продается только по рецепту. Назначение *Psorinum* может быть полезным у щенков с грязной, шелушащейся кожей и жирной шерстью.

Syphilinum и *Tuberculinum*

Назначение данных гомеопатических лекарств при крипторхизме вполне целесообразно, однако лечение следует проводить только по назначениям ветеринара-гомеопата. В отличие от *Psorinum*, применение которого в домашних условиях впол-

Conium maculatum

У животных с симптомами данного средства причиной орхита может быть как чрезмерная половая активность, так и подавление сексуальной функции. Кроме того, симптомы *Conium* можно выявить и при орхите посттравматической этиологии. Для *Conium* характерна «каменистая» плотность яичек (как у *Clematis*), однако в данном случае боль менее интенсивная. Обычно у кобелей с симптомами этого препарата быстро возникает сексуальное возбуждение.

Hamamelis

Данное лекарство, как и *Arnica*, полезно при орхите посттравматической этиологии, однако далеко не все состояния *Hamamelis* возникают вследствие травмы. Типичными симптомами орхита *Hamamelis* являются отечность этой области, повышение местной температуры, чрезвычайная болезненность при прикосновении, движении и сотрясении. Животные с симптомами данного препарата предпочитают лежать не двигаясь на одном месте; также отмечается ухудшение состояния на свежем воздухе.

Mercurius (vivus, solubilis)

Типичными симптомами орхита *Mercurius* являются выделения из половых путей зеленоватого цвета, иногда с примесью крови, отек и поверхностные изъязвления кожи мошонки. Часто отмечается сопутствующее воспаление десен и разрушение зубов.

Pulsatilla

Назначение данного средства эффективно при правостороннем поражении (как и *Clematis*) и реже при левостороннем. Воспаленное яичко болезненно при пальпации, однако сильного его уплотнения не отмечается; часто при орхите *Pulsatilla* наблюдаются выделения из половых путей желтого цвета. Орхит в некоторых случаях может сочетаться с простатитом. Животные с симптомами данного препарата ласковые, привязчивые и требующие внимания; у них отсутствует жажда и выражена непереносимость душных помещений.

Rhododendron

Характерной особенностью данного лекарства является ухудшение состояния при приближении бури с дождем, ветром или грозой; улучшение состояния отмечается при восстановлении нормальной погоды. Холодная сырая погода и длительное сидение на холодных камнях провоцирует начало заболевания. Область воспаления весьма болезненна на ощупь; чаще всего отмечается правостороннее поражение.

Rhus toxicodendron

Для орхита *Rhus* характерен мягкий ненапряженный отек и явления дерматита с мокнутием кожи в области мошонки и прилегающих участков бедер. Кроме того, типична постоянная или периодически возникающая эрекция.

ТРАВМЫ ЯИЧЕК

При тупой травме и ушибе области яичек прежде всего следует подумать о назначении *Bellis perennis* или *Arnica*. В тех случаях, когда после применения этих средств состояние не улучшается и развивается выраженный отек, следует назначить *Conium*.

При наличии рваных ран в области яичек прежде всего назначьте *Staphysagria*. Местно для промывания ран целесообразно использовать разведенную официальную настойку *Calendula*, при этом на 1 стакан прокипяченной охлажденной воды следует добавить четверть чайной ложки соли и 10–20 капель настойки *Calendula*. При отсутствии улучшения можно использовать гомеопатическое лекарство *Calendula* в потенции, например, 6С или 30С. При местном применении аптечную настойку *Calendula* можно заменить аптечной настойкой *Hypericum*.

При колотых ранах в области мошонки и яичек прежде всего назначьте *Hypericum*; если же улучшения состояния не отмечается, то следует использовать *Ledum*. В тех случаях, когда кожа вокруг раны холодная на ощупь, *Ledum* следует назначить прежде других средств. Местное лечение колотых ран в принципе такое же, как и рваных.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОСТАТЫ

С возрастом заболевания предстательной железы развиваются у многих некастрированных собак, особенно у тех, которых в течение жизни редко участвовали в вязке. Для котов заболевания простаты не характерны и отмечаются чрезвычайно редко. Редкие вязки некастрированных, но активных в сексуальном отношении животных являются одной из основных проблем их содержания — как и у людей, для нормальной функции простаты у собак необходимы достаточно регулярные половые контакты. У собак заболевания простаты могут начаться уже в возрасте года–двух лет, чаще всего — в возрасте примерно шести лет, при этом отмечаются увеличение размеров предстательной железы, затруднения при мочеиспускании и иногда при дефекации. Причиной увеличения простаты могут быть процессы как воспалительной (простатит), так и невоспалительной этиологии (гипертрофия простаты). Начальные этапы гипертрофии простаты не связаны с развитием опухолевой ткани, однако впоследствии у достаточно большого числа таких животных отмечается злокачественное перерождение, особенно в тех случаях, когда не предпринимается каких-либо мер лечебного характера.

Причиной воспалительных заболеваний предстательной железы обычно считается бактериальная инфекция; однако, как и при большинстве инфекционных процессов, воспалению предшествует развитие восприимчивости организма к инфекции. Таким образом, бактериальная инвазия не служит основной причиной простатита. Симптомами простатита являются болезненность в области простаты и примесь крови в моче. Дифференциальным признаком, который позволяет отличить простатит от других заболеваний мочеполовой сферы, является появление крови в конце мочеиспускания.

Особенности наблюдения и лечения заболеваний предстательной железы

Во всех случаях, когда у некастрированного кобеля отмечаются нарушения мочеиспускания и дефекации, а также при появлении крови в моче в конце мочеиспускания, необходим осмотр ветеринара для точного определения причины заболевания (при задержке мочеиспускания и отсутствии стула необ-

Rhododendron

Характерной особенностью данного лекарства является ухудшение состояния при приближении бури с дождем, ветром или грозой; улучшение состояния отмечается при восстановлении нормальной погоды. Холодная сырая погода и длительное сидение на холодных камнях провоцирует начало заболевания. Область воспаления весьма болезненна на ощупь; чаще всего отмечается правостороннее поражение.

Rhus toxicodendron

Для орхита *Rhus* характерен мягкий ненапряженный отек и явления дерматита с мокнутием кожи в области мошонки и прилегающих участков бедер. Кроме того, типична постоянная или периодически возникающая эрекция.

ТРАВМЫ ЯИЧЕК

При тупой травме и ушибе области яичек прежде всего следует подумать о назначении *Bellis perennis* или *Arnica*. В тех случаях, когда после применения этих средств состояние не улучшается и развивается выраженный отек, следует назначить *Conium*.

При наличии рваных ран в области яичек прежде всего назначьте *Staphysagria*. Местно для промывания ран целесообразно использовать разведенную официальную настойку *Calendula*, при этом на 1 стакан прокипяченной охлажденной воды следует добавить четверть чайной ложки соли и 10–20 капель настойки *Calendula*. При отсутствии улучшения можно использовать гомеопатическое лекарство *Calendula* в потенции, например, 6С или 30С. При местном применении аптечную настойку *Calendula* можно заменить аптечной настойкой *Hypericum*.

При колотых ранах в области мошонки и яичек прежде всего назначьте *Hypericum*; если же улучшения состояния не отмечается, то следует использовать *Ledum*. В тех случаях, когда кожа вокруг раны холодная на ощупь, *Ledum* следует назначить прежде других средств. Местное лечение колотых ран в принципе такое же, как и рваных.

собакам малых пород ежедневно назначается 125–250 мг, собакам средних пород — 500–1000 мг, а собакам крупных пород — до 1500 мг этих препаратов. Наилучший антиоксидант при заболеваниях простаты — это *витамин Е*, который назначается в дозе 5–10 мг/фунт веса животных ежедневно. Необходим также и *витамин С*, который назначается в дозе 5–10 мг/фунт веса 2–3 раза в день. Таблетированный препарат бурых водорослей прописывается по 1–3 таблетки в день (или от четверти до полной чайной ложки сухого сырья). Лецитин следует давать от половины чайной ложки до полной столовой ложки (в зависимости от веса) ежедневно, желательно до еды. Несомненно полезным будет также ежедневное добавление в пищу щепотки маточного молочка.

Гомеопатические средства при заболеваниях простаты

Эти гомеопатические средства можно назначать как при воспалительных процессах, так и при гипертрофии предстательной железы, причем одни более эффективны при воспалении, другие — при гипертрофии.

Chimaphila umbellata

Данное средство особенно эффективно при воспалительных заболеваниях простаты с нарушением мочеиспускания. Для появления струи мочи необходимо сильное натуживание. В моче часто содержится значительное количество слизи. В некоторых случаях мочеиспускание возможно только при широко расставленных задних конечностях. Оно не только затруднено, но и болезненно, причем боли облегчаются во время ходьбы. Симптомы *Chimaphila* часто возникают при холодной сырой погоде.

Conium maculatum

Данное лекарство является одним из наиболее эффективных средств при гипертрофии простаты как у пожилых мужчин, так и у старых псов. Отмечаются значительные затруднения при мочеиспускании, причем оно может несколько раз прерываться. В некоторых случаях моча отделяется по каплям. Кроме того, нередко отмечается слабость задних конечностей. При

пальпации обнаруживается значительное уплотнение предстательной железы.

Ferrum picricum

Данное средство также эффективно при возрастной гипертрофии простаты с нарушениями мочеиспускания, причем отмечается учащение мочеиспускания по ночам. Нередко на коже видны бородавки.

Picricum acidum

У собак с симптомами данного средства отмечается выраженная общая слабость, истощение, а также слабость задних конечностей. Их состояние напоминает состояние *Conium*, однако выражено в более сильной степени и гораздо быстрее прогрессирует. Обычно обнаруживается гипертрофия предстательной железы, однако назначение этого препарата более эффективно на ранних стадиях заболевания. Характерным симптомом данного средства является сочетание гипертрофии простаты с длительной болезненной эрекцией, которая возникает, когда собака начинает засыпать.

Pulsatilla

Pulsatilla — одно из главных средств при заболеваниях предстательной железы; наиболее эффективно назначение данного препарата при воспалительных процессах. Предстательная железа чрезвычайно болезненна, отмечают также густые выделения из половых путей, иногда с примесью крови. У животных с симптомами данного лекарства отсутствует жажда, они обычно плохо переносят душные помещения, предпочитая находиться на свежем воздухе. Этим животным нравится ласка и внимание.

Sabal serrulata

Гомеопатическое средство *Sabal* готовится из растения «сabalь зазубренный» семейства пальмы. Как у растительного, так и у гомеопатического лекарства выражена тропность к заболеваниям предстательной железы. Типичным симптомом является истечение секрета простаты и атрофия яичек. Собаки с симптомами данного препарата не любят проявлений внимания и быстро раздражаются.

Selenium

Назначение данного средства эффективно у слабых и немощных собак, состояние которых ухудшается от жары. Отмечается гипертрофия предстательной железы и отделение мочи по каплям во время ходьбы. Кроме того, почти постоянно по каплям отделяется секрет простаты. Эти животные крайне плохо переносят жару; их состояние улучшается после захода солнца и наступления ночной прохлады.

Staphysagria

Подобно *Pulsatilla* данное лекарство эффективно при остром воспалении предстательной железы, которое сопровождается отеком. Вне мочеиспускания собак беспокоит жжение в области уретры, поэтому у них часто бывают позывы к мочеиспусканию; из-за боли и жжения они постоянно вылизывают половые органы. Мочеиспускание иногда требует длительного натуживания.

Thuja occidentalis

В тех случаях, когда ни одно из перечисленных выше средств вам не кажется соответствующим или когда назначение препарата не привело к желаемому результату, попробуйте назначить *Thuja*. Часто заболевания мочеполовых органов возникают вследствие вакцинации — в таком случае назначение данного лекарства будет незаменимым.

ГИПЕРСЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В большинстве случаев гиперсексуального поведения, особенно при мастурбации кастрированных особей, требуется назначение конституционального лечения, так как подобное поведение свидетельствует чаще всего о развитии хронического заболевания. Исключение составляет поведение особей мужского пола маленьких пород собак, для которых частая имитация копуляции является типичным образцом поведения. Иногда такое поведение исчезает после назначения гомеопатического препарата *Yohimbium*. Однако не следует назначать фитопрепарат йохимбе — полученный результат может быть обратным.

– ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА –

ФУНКЦИИ

Женская половая система выполняет три основные функции. Во-первых, в яичниках продуцируются женские половые гормоны – эстроген и прогестерон, под влиянием которых происходит развитие организма по женскому типу; кроме того, гормоны регулируют половой цикл, включая период беременности и лактации. Во-вторых, в яичниках продуцируются яйцеклетки, из которых после оплодотворения развиваются эмбрионы. После того, как из эмбриона развивается новый представитель данного вида, эмбрион получает название «плод». Третьей функцией женской половой системы является вынашивание плода в матке до тех пор, пока плод не приобретет возможность жить индивидуально вне связи с организмом матери.

Как и яички мужских особей, яичники женских особей развиваются у зародыша в брюшной полости из того же эмбрионального зачатка, что и почки. Однако в отличие от яичек яичники не выходят за пределы брюшной полости; после созревания яйцеклетки выходят из яичников и по маточным трубам продвигаются в полость матки. В норме оплодотворение происходит в матке, после чего яйцеклетка имплантируется в слизистую оболочку матки, где и происходит ее дальнейшее развитие. Терминальный отдел матки называется «шейка матки»; шейка матки остается в закрытом состоянии вплоть до родов. За счет канала шейки матка соединяется с влагалищем. Влагалище представляет собой канал, в который при спаривании вводится половой член. Наружное отверстие влагалища называется вульва.

Молочные железы обычно рассматриваются как часть женской половой системы, несмотря на их особое анатомическое расположение. Таким образом, мы можем говорить о четвертой функции женской половой системы, которая заключается в продукции молока для вскармливания новорожденных. В соответствующем разделе данной главы мы рассмотрим некоторые заболевания молочных желез и состояния, при которых нарушается лактация.

Половой цикл женских особей обоих видов связан со сменой биологических ритмов в природе, которые обусловлены потоками солнечных лучей. У собак циклические изменения в норме происходят два раза в год, обычно весной и осенью. Однако на самом деле проявления циклических изменений весьма вариабельны, что, возможно, связано с оторванностью этого вида от обычной среды обитания с естественным уровнем освещения. Эструс, или течка, у собак длится 21 день; при этом в начале эструса отмечаются выделения из матки кровянистого характера. Овуляция наступает примерно в середине цикла, причем до овуляции самка не подпускает к себе самцов несмотря на их настойчивое внимание с самого начала течки. Если оплодотворения не происходит, то в некоторых случаях у собак развивается ложная беременность, которая длится примерно столько же, сколько истинная. Истинная беременность у собак продолжается 58–70 дней, в среднем 63–65 дней. При наличии ложной беременности самки, как и при истинной беременности, организуют себе «гнездо» (или логово), причем в некоторых случаях у них даже может начаться лактация. Ложная беременность не представляет собой патологического отклонения от нормального поведения — скорее всего ложная беременность является рудиментарным элементом поведения в стае, когда неоплодотворенные самки помогали истинным матерям ухаживать за новорожденными щенками. Длительность полового цикла собак варьирует у отдельных особей. В некоторых случаях для определения индивидуального цикла проводится специальное тестирование гормонального уровня.

У кошек циклические изменения имеют по сути своей несколько иной характер. Эструс у кошек в естественных условиях также регулируется уровнем освещенности и возникает весной и ранней осенью, однако овуляция происходит только после спаривания. Эструс у кошек длится примерно одну неделю. Если спаривание не состоялось, то эструс на короткое время прекращается и возобновляется примерно через неделю. Такой «прерывистый» эструс может продолжаться до четырех недель; если по прошествии этого времени спаривания не происходит, то эструс заканчивается, чтобы возобновиться следующей весной или осенью. Обычно у кошек кровянистых выделений из половых путей не отмечается, однако может быть неко-

– ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА –

ФУНКЦИИ

Женская половая система выполняет три основные функции. Во-первых, в яичниках продуцируются женские половые гормоны – эстроген и прогестерон, под влиянием которых происходит развитие организма по женскому типу; кроме того, гормоны регулируют половой цикл, включая период беременности и лактации. Во-вторых, в яичниках продуцируются яйцеклетки, из которых после оплодотворения развиваются эмбрионы. После того, как из эмбриона развивается новый представитель данного вида, эмбрион получает название «плод». Третьей функцией женской половой системы является вынашивание плода в матке до тех пор, пока плод не приобретет возможность жить индивидуально вне связи с организмом матери.

Как и яички мужских особей, яичники женских особей развиваются у зародыша в брюшной полости из того же эмбрионального зачатка, что и почки. Однако в отличие от яичек яичники не выходят за пределы брюшной полости; после созревания яйцеклетки выходят из яичников и по маточным трубам продвигаются в полость матки. В норме оплодотворение происходит в матке, после чего яйцеклетка имплантируется в слизистую оболочку матки, где и происходит ее дальнейшее развитие. Терминальный отдел матки называется «шейка матки»; шейка матки остается в закрытом состоянии вплоть до родов. За счет канала шейки матка соединяется с влагалищем. Влагалище представляет собой канал, в который при спаривании вводится половой член. Наружное отверстие влагалища называется вульва.

Молочные железы обычно рассматриваются как часть женской половой системы, несмотря на их особое анатомическое расположение. Таким образом, мы можем говорить о четвертой функции женской половой системы, которая заключается в продукции молока для вскармливания новорожденных. В соответствующем разделе данной главы мы рассмотрим некоторые заболевания молочных желез и состояния, при которых нарушается лактация.

тельного количества гноя. В типичных случаях пиометра развивается примерно через месяц после окончания эструса. Одним из факторов, способствующих развитию пиометры, является повышение уровня прогестерона во время эструса. Под влиянием гормона прогестерона слизистая оболочка матки подвергается соответствующим изменениям, готовясь к имплантации эмбриона. Кроме того, повышение уровня прогестерона снижает иммунитет — это не менее важный аспект подготовки организма к беременности; снижение уровня иммунной защиты организма означает снижение вероятности отторжения эмбрионов организмом матери на ранних сроках беременности. Все эти факторы, вместе взятые, приводят к усилению восприимчивости организма к инфекции. В отдельных случаях пиометра у собак развивается после инъекции эстрогенов на ранних сроках беременности — подобные инъекции способствуют прерыванию нежелательной беременности, возникшей в результате спаривания со «случайным» партнером (однако сами собаки совсем не считают его «случайным»!). Введение эстрогена усиливает воздействие на организм прогестерона и способствует еще большему снижению иммунитета. Я ни в коем случае не советую подобным образом прерывать у собак течение беременности из-за возможности фатальных последствий.

Пиометра является тяжелым заболеванием, во многих случаях с непосредственной угрозой для жизни собаки. Именно поэтому ни в коем случае не пытайтесь лечить пиометру самостоятельно в домашних условиях. При развитии пиометры ветеринары чаще всего производят оперативное удаление яичников вместе с маткой; операция проводится на фоне интенсивной терапии и назначения антибиотиков. При пиометре на фоне тяжелого состояния у собаки развивается вялость, жажда, гнойные выделения из половых путей, боли в животе и полиурия (увеличение продукции мочи). Отмечается синюшная окраска десен, что свидетельствует об интоксикации и глубоком нарушении микроциркуляции (в норме после прекращения надавливания окраска десен восстанавливается сразу же, однако при интоксикации ее восстановление происходит через 2–3 секунды). При развитии всех этих симптомов требуется немедленная ветеринарная помощь.

В некоторых случаях цервикальный канал (т. е. канал шей-

торая отечность вульвы и минимальное количество прозрачных выделений. Во время эструса у кошек значительно изменяется поведение – в некоторых случаях эти изменения принимаются за начало какой-то странной болезни. Кошки в этот период чаще всего более ласковые и требуют повышенного внимания, однако иногда становятся более раздражительные. Отмечается также выраженное беспокойство и своеобразные (похотливые?) «скорбные» вопли. Когда я работал в экстренной ветеринарной клинике, то, помню, несколько раз кошек в подобном состоянии даже приносили на прием – в семьях, где они жили, все были уверены, что их мучает какая-то неведомая болезнь или тяжкий стресс, и искренне радовались, когда выяснялась истинная причина их «страданий». Ветеринарам, к сожалению, не часто удается так порадовать людей.

Длительность беременности у кошек и собак примерно одинаковая и составляет от 58 до 70 дней, в среднем 63–65 дней. У кошек ложная беременность практически не встречается.

Основным симптомом со стороны репродуктивной системы у особей женского пола, который не связан с беременностью, является наличие выделений из влагалища инфекционно-воспалительного характера. У некоторых собак отмечаются нарушения нормального течения полового цикла и кистозные изменения яичников, однако у кошек подобная патология встречается чрезвычайно редко. Эти хронические заболевания требуют лечения у ветеринара-гомеопата. Вначале мы рассмотрим гомеопатическое лечение выделений из влагалища, затем некоторые особенности течения беременности и неонатального периода, а затем отдельные заболевания молочных желез.

ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГАЛИЩА

Выделения из влагалища, особенно у интактных (некастрированных) самок, могут быть признаком самых различных по своей природе заболеваний. Гнойные выделения из влагалища являются одним из симптомов пиометры – редкого заболевания, которое встречается в основном у собак (у кошек пиометра развивается крайне редко). Фактически пиометра представляет собой абсцесс матки со скоплением в ее полости значи-

самке, хотя никаких признаков эструса у нее не отмечается. Во многих случаях этот «симптом» позволяет заподозрить воспалительный процесс на самой начальной стадии. Аналогичный «симптом» отмечается у особей женского пола и при цистите; кроме того, в некоторых случаях развитие вагинита сопровождается учащенным мочеиспусканием. Объем порции мочи является дифференциально диагностическим признаком, позволяющим отличить пиометру от вагинита — при пиометре отмечается полиурия, а при вагините — учащенное мочеиспускание малыми порциями.

Особенности наблюдения и лечения при выделениях из влагалища

При появлении *выделений из влагалища* прежде всего следует *оценить тяжесть состояния собаки или кошки, ответив на следующие вопросы:*

- Была ли раньше проведена операция стерилизации?
- Когда последний раз отмечались признаки эструса?
- Нет ли вялости?
- Какой цвет имеют десны?
- Как быстро восстанавливается окраска десен после прекращения надавливания — сразу же или спустя 2–3 секунды?
- Не отмечается ли полиурии и выраженной жажды?
- Не отмечается ли раздражения кожи вокруг вульвы за счет выделений?

Непременно в экстренном порядке проконсультируйтесь с ветеринаром в следующих случаях:

- если вы подозреваете развитие пиометры (см. выше основные симптомы — жажда, вялость, полиурия, выделения из влагалища или их отсутствие, нарушение окраски десен, признаки интоксикации),
- если развивается вялость независимо от наличия или отсутствия других симптомов.

Не откладывайте надолго обращение в ветеринарную лечебницу:

- если выделения из влагалища раздражают кожу,
- если выделения не становятся прозрачными в течение одной-двух недель.

Для выбора гомеопатического подобного средства следует оценить природу симптомов:

- Какого цвета выделения?
- Не отмечается ли раздражения кожи в области вульвы?
- Не вылизывает ли собака или кошка постоянно область гениталий?
- Не отмечается ли учащенного мочеиспускания малыми порциями?
- Какие сопутствующие симптомы можно выявить? Не отмечается ли изменений психоэмоциональной сферы?

Для усиления сопротивляемости инфекции вполне целесообразно назначение *витамина С* в дозе 5–10 мг/фунт веса 2–3 раза в день. Повышению сопротивляемости мочеполовой системы к инфекции способствует настой крапивы. Для укрепления иммунитета целесообразно также назначение таких фитопрепаратов, как эхинацея, кошачий коготь, астрагал и желтокорень канадский, причем эти фитопрепараты можно использовать как по отдельности, так и в сочетании. Наилучшим методом применения фитопрепаратов является приготовление настоя, для чего следует одну чайную ложку сухого сырья залить одним стаканом кипящей воды и оставить до полного остывания. Настой следует давать в дозе четверть чайной ложки на 10–20 фунтов веса животных 2–3 раза в день. Настой желтокорня канадского представляет собой довольно сильный фитопрепарат, поэтому не следует применять его дольше недели. Если вам не удастся найти необходимое растительное сырье, то можно использовать соответствующие официнальные настойки в дозе 5–10 капель на 10–20 фунтов веса животных 2–3 раза в день. У животных лучше всего применять настойки на глицерине, так как животным крайне неприятен привкус спирта. Если же вам не удастся найти настойку на глицерине, то перед применением спиртовой настойки налейте нужное количество капель в ложку и оставьте на некоторое время – пусть спирт испарится. Это особенно важно при применении спиртовых настоек для лечения кошек.

Местно для орошения области воспаления можно применять настой или официальную настойку *Calendula* или *Hypericum*. Настой готовится по описанной выше методике; при приме-

нии настойки *Calendula* на один стакан кипяченой воды добавляется 10–20 капель. Кроме этих средств можно местно применять разбавленный уксус — одну-две ложки 7% -ного столового уксуса на стакан воды. Орошение влагалища проводится с помощью шприца Жанэ, который аккуратно вводится во влагалище на глубину четверть или половина дюйма. У кошек или собак маленьких пород орошение влагалища проводится либо с помощью пипетки, либо с помощью пластмассового шприца без иглы.

При выделениях из влагалища можно назначить одно из следующих гомеопатических средств. При отсутствии улучшения в течение нескольких дней можно назначить другое лекарство, однако лучше всего проконсультироваться с ветеринаром-гомеопатом. Прежде чем назначать гомеопатическое лечение, непременно убедитесь, что отсутствуют признаки пиометры (см. предыдущий раздел). В разделе «Гомеопатические средства при выделениях из влагалища» перечисляются некоторые препараты для лечения пиометры, однако не могу не повторить, что в подобных случаях рациональнее всего хирургическое лечение. При пиометре у животных развивается тяжелое состояние, которое требует наблюдения либо ветеринара, либо ветеринара-гомеопата.

Гомеопатические средства при выделениях из влагалища

Aletris farinosa

Типичными симптомами данного средства являются слабость и анемия; животные двигаются как будто прогнувшись под тяжестью собственного веса. Выделения из влагалища тягучие, белого цвета. Часто отмечается тошнота при употреблении небольших количеств пищи. В анамнезе особей женского пола часто имеются указания на самопроизвольные выкидыши из-за слабости.

Alumina

Для животных с симптомами этого препарата также характерны слабость и ухудшение состояния при любом физическом усилии, а также хрупкое телосложение, сухость и склонность

Для выбора гомеопатического подобного средства следует оценить природу симптомов:

- Какого цвета выделения?
- Не отмечается ли раздражения кожи в области вульвы?
- Не вылизывает ли собака или кошка постоянно область гениталий?
- Не отмечается ли учащенного мочеиспускания малыми порциями?
- Какие сопутствующие симптомы можно выявить? Не отмечается ли изменений психоэмоциональной сферы?

Для усиления сопротивляемости инфекции вполне целесообразно назначение *витамина С* в дозе 5–10 мг/фунт веса 2–3 раза в день. Повышению сопротивляемости мочеполовой системы к инфекции способствует настой крапивы. Для укрепления иммунитета целесообразно также назначение таких фитопрепаратов, как эхинацея, кошачий коготь, астрагал и желтокорень канадский, причем эти фитопрепараты можно использовать как по отдельности, так и в сочетании. Наилучшим методом применения фитопрепаратов является приготовление настоя, для чего следует одну чайную ложку сухого сырья залить одним стаканом кипящей воды и оставить до полного остывания. Настой следует давать в дозе четверть чайной ложки на 10–20 фунтов веса животных 2–3 раза в день. Настой желтокорня канадского представляет собой довольно сильный фитопрепарат, поэтому не следует применять его дольше недели. Если вам не удастся найти необходимое растительное сырье, то можно использовать соответствующие официнальные настойки в дозе 5–10 капель на 10–20 фунтов веса животных 2–3 раза в день. У животных лучше всего применять настойки на глицерине, так как животным крайне неприятен привкус спирта. Если же вам не удастся найти настойку на глицерине, то перед применением спиртовой настойки налейте нужное количество капель в ложку и оставьте на некоторое время – пусть спирт испарится. Это особенно важно при применении спиртовых настоек для лечения кошек.

Местно для орошения области воспаления можно применять настой или официальную настойку *Calendula* или *Hypericum*. Настой готовится по описанной выше методике; при приме-

репления иммунитета, причем в некоторых случаях назначение *Echinacea* способствует обратному развитию симптомов (в подобных случаях необходимо постоянное наблюдение ветеринара). Выделения из влагалища раздражающие и зловонные.

Graphites

Для данного лекарства характерны тяжелые поражения кожи и выделения из влагалища. На коже отмечаются многочисленные трещины и участки раздражения с отделяемым цвета меда. Выделения из влагалища обильные, раздражающие и имеют белый цвет. Причиной такой картины симптомов является хроническое заболевание, поэтому в подобном случае требуется консультация ветеринара-гомеопата.

Hydrastis

Для данного лекарства характерны густые, вязкие выделения из влагалища раздражающего характера. Выделения чаще всего желтого цвета и имеют вид тягучих нитей. Выделения такого же характера могут наблюдаться и из других естественных отверстий. Отмечается жжение и зуд вульвы, поэтому животные интенсивно вылизывают эту область. Данное средство особенно эффективно у старых, слабых и истощенных собак.

Kali bichromicum

Выделения из влагалища, типичные для данного средства, напоминают выделения *Hydrastis* — они обычно желтые, тягучие и раздражающие, вызывающие зуд и жжение вульвы. Однако животные *Kali bichromicum* в отличие от животных *Hydrastis* либо более индифферентные, либо раздражительные и предпочитают находиться в одиночестве, тогда как особи типа *Hydrastis* старше по возрасту и всегда находятся в подавленном настроении.

Kreosotum

Для данного средства также типичны едкие, жгучие выделения из влагалища, из-за которых животные постоянно вылизывают эту область. Выделения обычно кровянистые, желтоватого цвета; иногда подобные выделения отмечаются в течение беременности. Выделения могут сочетаться с выраженным

воспалением полости рта, разрыхлением и кровоточивостью десен, а также самопроизвольным выпадением зубов. Кроме того, нередко выделения из влагалища сочетаются со слабостью задних конечностей и заболеваниями мочевыводящих путей. Обычно животные с симптомами данного препарата чрезвычайно раздражительные.

Lilium tigrinum

Животные с симптомами данного препарата обычно подавленные, нервные и злые; часто выявляются признаки гиперсексуального поведения в виде мастурбации и постоянных поисков полового партнера. Выделения обычно жидкие и раздражающие; типичен коричневый цвет выделений. Из-за постоянного полового возбуждения особи женского пола непрерывно вылизывают область вульвы.

Mercurius (vivus, solubilis)

Для данного препарата характерна тропность к заболеваниям слизистых оболочек полости рта и влагалища. В типичных случаях отмечается воспаление и раздражение десен. Выделения из половых путей могут быть либо белыми и тягучими, либо зеленоватыми, зловонными и кровянистыми, однако и в том и в другом случае выделения имеют раздражающий характер. Воспалительный процесс во влагалище часто сочетается с диареей и сильным натуживанием во время дефекации. Эти животные чрезвычайно отрицательно относятся к дисциплине и могут укусить, если их заставляют подчиняться против их воли.

Nitricum acidum

Для данного лекарства типичны жидкие едкие, жгучие выделения, имеющие зеленовато-коричневый цвет. Постоянное раздражение кожи вокруг вульвы способствует выпадению шерсти в этой области. На слизистой оболочке влагалища могут отмечаться изъязвления. Воспаление влагалища сопровождается выраженной болезненностью, что усиливает раздражительность и агрессивность этих животных — при попытках осмотра или орошения влагалища антисептическими растворами они могут даже укусить. Типичным для этих животных симптомом является зябкость.

Pulsatilla

Животные *Pulsatilla* обычно ласковые и дружелюбные, настойчиво требующие внимания. Выделения из влагалища в типичных случаях густые, вязкие, слегка раздражающие, белого или желтого цвета, но иногда могут приобретать зеленоватый оттенок. Назначение данного средства обычно эффективно у молодых особей, когда выделения из влагалища появляются еще до первой течки. *Pulsatilla* является одним из главных лекарств при заболеваниях матки; назначение данного средства может быть полезным при развитии пиометры. Животные *Pulsatilla* предпочитают находиться на свежем воздухе и не переносят душных помещений; обычно они пьют мало жидкости (что совершенно нетипично для пиометры).

Pyrogenium

Подобно *Echinacea* данное средство эффективно при тяжелых септических состояниях, при которых отмечаются выделения из влагалища зловонного характера и острые боли в животе, которые вынуждают животных постоянно перемещаться в поисках более или менее удобного положения. Назначение данного препарата полезно при пиометре; кроме того, применение *Pyrogenium* целесообразно даже в тех случаях, когда имеются показания к хирургическому вмешательству. Состояние животных *Pyrogenium* обычно тяжелое, поэтому следует непременно обратиться в ветеринарную лечебницу, не пытаясь лечить их самостоятельно.

Sabina

Выделения из половых путей у животных с симптомами данного средства обычно густые, желтоватые, зловонные и раздражающие. У самок выявляются признаки гиперсексуального поведения, однако не в такой степени, как у особей *Lilium tigrinum*. Животные *Sabina* обычно крайне чувствительны к шуму, особенно внезапному — они быстро пугаются и вздрагивают. Выделения из влагалища нередко сочетаются с заболеваниями мочевыводящей системы; первая течка, как правило, у них возникает гораздо раньше обычного. Возможность назначения данного лекарства следует также рассмотреть и при пиометре.

Secale cornutum

Подобно *Caulophyllum* данное лекарство обладает способностью тонизировать матку и стимулировать ее сокращения. Чаще всего *Secale cornutum* назначается после родов, однако это средство может быть полезным также при пиометре и выделениях из влагалища. Типичны чрезвычайно зловонные выделения коричневатого цвета, но в некоторых случаях выделения могут быть жидкими и кровянистыми.

Sepia

У данного препарата отмечается выраженная тропность к заболеваниям матки. Животные с симптомами данного средства обычно равнодушны к окружающим, в том числе и к собственному потомству. Для них типична зябкость, даже если они находятся в теплом помещении. Выделения из половых путей обычно зеленовато-желтого цвета, вызывающие зуд в области вульвы. Комковатые выделения белого цвета нередко отмечаются у юных представителей типа *Sepia* еще до начала первой течки.

– БЕРЕМЕННОСТЬ И НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД –

Ко всем вопросам, связанным с размножением собак и кошек, следует относиться с особым вниманием, особенно учитывая существующую проблему избыточной численности (сверхпопуляции) этих животных. Меркантильная причина получения дохода от продажи потомства не является достаточным основанием для спаривания животных. Нельзя считать веской причиной для воспроизводства животных и чудо появления на свет новой жизни – каким бы удивительным ни был процесс появления потомства и какими бы глубокими эмоциями он ни сопровождался.

Надеюсь, что после прочтения данной главы вы подойдете к вопросам размножения домашних животных с полной ответственностью. Непременно прочтите книги по ветеринарии, где подробно рассказывается о течении беременности у кошек и собак, об особенностях кормления в этот важный период, а также об организации ухода за потомством. Я рекомендую вам также

прочитать главу 16 «Вакцинация», так как именно вакцинация способствует ухудшению здоровья юных особей и впоследствии провоцирует развитие хронических заболеваний.

Некоторые из рекомендаций данного раздела имеют общий характер, другие более конкретны и индивидуальны. Вообще сделать индивидуальное назначение при беременности достаточно сложно еще и потому, что известно не так уж много гомеопатических средств, которые оказывают влияние на этот процесс.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Для нормального течения последних двух недель беременности и подготовки матки к родам можно назначить *Caulophyllum* в потенции 6С, 12С или 30Х, чередуя его через день с *Calcarea phosphorica* 6Х или 6С. Эти средства нормализуют тонус матки в конце беременности и в родах; кроме того, *Calcarea phosphorica* обладает выраженным влиянием на обмен кальция, усиливая его усвоение, что чрезвычайно важно и для нормального течения беременности и родов, и для адекватной последующей лактации. В пищевом рационе беременных особей должно содержаться повышенное количество кальция, особенно в последние три недели беременности и после родов во время лактации. Наилучшим источником кальция и фосфора является костная мука; кроме того, если в рационе собаки есть костная мука, то не возникает необходимости искусственно регулировать соотношение кальция и фосфора в пище. Нет необходимости также давать этот продукт в значительном количестве — вполне достаточно четверти или половины чайной ложки на каждые 10 фунтов веса животных ежедневно. Однако все же наилучшим методом регуляции кальциевого обмена у животных является добавление к пище сырых костей (но ни в коем случае не вареных!) — при этом животные получают естественным путем необходимое количество как кальция, так и фосфора.

Для беременных особей очень полезен также настой листьев малины. Для приготовления настоя следует одну столовую ложку сухого сырья залить примерно одним литром кипящей воды и оставить до полного остывания. Назначается настой

Secale cornutum

Подобно *Caulophyllum* данное лекарство обладает способностью тонизировать матку и стимулировать ее сокращения. Чаще всего *Secale cornutum* назначается после родов, однако это средство может быть полезным также при пиометре и выделениях из влагалища. Типичны чрезвычайно зловонные выделения коричневатого цвета, но в некоторых случаях выделения могут быть жидкими и кровянистыми.

Sepia

У данного препарата отмечается выраженная тропность к заболеваниям матки. Животные с симптомами данного средства обычно равнодушны к окружающим, в том числе и к собственному потомству. Для них типична зябкость, даже если они находятся в теплом помещении. Выделения из половых путей обычно зеленовато-желтого цвета, вызывающие зуд в области вульвы. Комковатые выделения белого цвета нередко отмечаются у юных представителей типа *Sepia* еще до начала первой течки.

– БЕРЕМЕННОСТЬ И НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД –

Ко всем вопросам, связанным с размножением собак и кошек, следует относиться с особым вниманием, особенно учитывая существующую проблему избыточной численности (сверхпопуляции) этих животных. Меркантильная причина получения дохода от продажи потомства не является достаточным основанием для спаривания животных. Нельзя считать веской причиной для воспроизводства животных и чудо появления на свет новой жизни – каким бы удивительным ни был процесс появления потомства и какими бы глубокими эмоциями он ни сопровождался.

Надеюсь, что после прочтения данной главы вы подойдете к вопросам размножения домашних животных с полной ответственностью. Непременно прочтите книги по ветеринарии, где подробно рассказывается о течении беременности у кошек и собак, об особенностях кормления в этот важный период, а также об организации ухода за потомством. Я рекомендую вам также

ПОСЛЕРОДОВЫЕ СОСТОЯНИЯ

Боли

При болях в послеродовом периоде целесообразно назначение *Arnica*; если же это средство не помогает, то можно использовать *Hypericum*, *Ruta graveolens* или *Bellis perennis*. Все эти лекарства назначаются каждые несколько часов в любой потенции до 30С.

Кровотечение

Кровотечение сразу же после родов представляет собой вполне нормальное явление, однако оно должно прекратиться в течение 1–4 часов. В некоторых случаях незначительное выделение крови в виде отдельных капель может продолжаться еще в течение одного-двух дней. Если кровотечение продолжается дольше, то назначьте гомеопатическое средство *Iresacianha* каждые 15–16 минут по необходимости. Если после применения этого препарата кровотечение не остановится, то назначьте *Phosphorus* или *Millefolium*. При выделении крови темного цвета целесообразно применение *Lachesis*. При задержке отхождения плаценты (см. далее) и при значительном кровотечении попробуйте применить *Pulsatilla*.

Задержка отхождения плаценты

В редких случаях отмечается или задержка отхождения плаценты, или неполное ее отхождение. В норме плацента отделяется через несколько часов после родов. Задержка ее отхождения сопровождается кровотечением и выделениями из половых путей, которые через некоторое время приобретают зловонный запах. При задержке отхождения плаценты следует дать роженице *Caulophyllum* или *Secale* в наивысшей потенции, которая у вас есть. Возможно, что через несколько часов дозу средства придется повторить еще раз. Если же кровотечение из-за задержки плаценты продолжается, то назначьте *Pulsatilla*.

Инфекции в послеродовом периоде

Причиной развития инфекционных осложнений в послеродовом периоде может быть задержка отхождения плаценты,

листьев малины в дозе 1–2 полных пипетки на 10–20 фунтов веса животных 1–2 раза в день.

РОДЫ

По мере приближения родов нарастает беспокойство животных – они стараются найти какое-нибудь укромное и темное место, где и произведут на свет потомство. За несколько дней до родов собаки и кошки обычно организуют себе нечто вроде «гнезда» или логова, куда они могут стаскивать различные мягкие вещицы. За один-два дня до родов они перестают принимать пищу, а в день родов становятся еще более беспокойными. В некоторых случаях они просто исчезают из виду, все время оставаясь в своем «гнезде». По всем этим признакам можно примерно определить день предполагаемых родов. Накануне родов следует назначить животным *Arnica* каждые 6–12 часов, чтобы подготовить их к болям во время родов. Если начались легкие схватки, но начало родовой деятельности затягивается, то назначьте 3–4 дозы *Caulophyllum* с интервалом 0,5–1 час. Если после назначения *Caulophyllum* полноценная родовая деятельность не начинается, то можно по той же схеме назначить 3–4 дозы *Secale cornutum*. Если у кошки или собаки отмечается вялый тонус матки и отсутствуют ее сокращения, то можно дать препараты, в состав которых входит кальций, необходимый для полноценной родовой деятельности. Если же применение *Secale cornutum* оказалось неэффективным, то можно назначить дозу *Plumbum metallicum*, особенно в тех случаях, когда развивается общая слабость. При слабости родовой деятельности хорошо помогает гомеопатическое средство *Orium*, однако в США это средство приравнено к наркотикам (хотя в нем не содержится материальных количеств *Orium*), поэтому вряд ли возможно это назначение осуществить в реальности. Если перед родами выражено беспокойство, то можно назначить *Rescue Remedy* или эквивалентное средство. Кроме того, в этих случаях можно назначить *Gelsemium*.

При болях в родах эффективно назначение *Arnica*, *Secale*, *Nux vomica* или *Coffea*.

Rhus toxicodendron

Картина симптомов данного средства напоминает картину *Arsenicum*, однако состояние не такое тяжелое. Часто отмечается гиперемия и отек век и вульвы.

Эклампсия

В редких случаях в конце периода беременности наступает выраженное нарушение обмена кальция, связанное с его усиленным потреблением, в результате чего уровень кальция в плазме и межтканевой жидкости резко снижается. Возникающее при этом состояние эклампсии намного чаще отмечается у собак и как казуистический случай — у кошек. При снижении в плазме уровня кальция нарушается нервно-мышечная проводимость и возникают постоянные судорожные сокращения и подергивания мышц. Одним из симптомов эклампсии является нарушение функции миокарда. На фоне непрерывных судорожных сокращений различных групп мышц у собак с эклампсией развивается хриплое дыхание, перевозбуждение нервной системы и перегревание. Собака выглядит так, как будто ее «подключили» к источнику тока. *Состояние эклампсии может быстро привести к смертельному исходу, поэтому в подобных случаях требуется экстренная ветеринарная помощь.* Состояние быстро улучшается при внутривенном введении препаратов кальция. При развитии эклампсии можно попробовать влить собаке в рот препараты кальция и дать одно из гомеопатических средств, перечисленных в данном разделе, однако эти мероприятия не должны ни на минуту задержать экстренное обращение в ветлечебницу. При введении препаратов кальция в полость рта необходимо соблюдать осторожность, так как при непроизвольном судорожном сжатии челюстей собаки очень велика вероятность травмирования вашей руки.

Гомеопатические средства при эклампсии

Не тратьте время на поиски гомеопатических средств и дайте то, что есть у вас дома. Состояние эклампсии требует немедленного обращения в ветеринарную лечебницу. Если есть возможность выбора, то дайте самые высокие потенции, какие только есть.

травма родовых путей или инфицирование в процессе родов. Во всех этих случаях необходимо обратиться в ветеринарную лечебницу. Традиционно при наличии инфекции в послеродовом периоде назначаются антибиотики, однако через материнское молоко эти же антибиотики получают и новорожденные котята или щенки. При нетяжелом течении инфекции можно попробовать обойтись без антибиотиков, назначая гомеопатические средства, однако при ухудшении состояния необходим осмотр ветеринара.

Начните гомеопатическое лечение с назначения *Caulophyllum* или *Secale* (см. раздел «Задержка отхождения плаценты»), которые обладают свойством стимулировать сокращения матки, в результате чего могут отойти оставшиеся участки плаценты. Для активизации иммунной системы дайте матери новорожденных настой эхинацеи или желтокорня канадского. Для приготовления настоя залейте одну столовую ложку сухого сырья примерно полулитром кипящей воды и остудите. Настой следует давать по одной полной пипетке на 10 фунтов веса 2–3 раза в день. Кроме того, назначьте витамин С в дозе 5–10 мг/фунт веса 2–3 раза в день. Затем выберите одно из гомеопатических лекарств из раздела «Гомеопатические средства при выделениях из влагалища», причем следует обратить внимание на *Echinacea*, *Pyrogenium*, *Sabina* или *Sepia*; однако вполне возможно, что симптомы роженицы будут соответствовать симптомам какого-либо другого средства.

Рассмотрите также возможность назначения следующих препаратов.

Arnica montana

Назначение данного лекарства полезно при последствиях травматичных родов, особенно если в послеродовом периоде сохраняется выраженная болезненность и страх прикосновений.

Arsenicum album

Назначение данного средства будет эффективным при ознобе, беспокойстве и выраженной жажде. Помимо этих симптомов отмечается также слабость, рвота и выделения из влагалища темного цвета с примесью крови.

речисленных выше лекарств, то воспользуйтесь *Calcareo carbonica* или *Calcareo phosphorica*, так как эти средства также способствуют нормализации обмена кальция в организме.

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Отторжение (неприятие) котят и щенков

После родов большинство матерей сразу же берутся ухаживать за своими новорожденными детьми, тщательно вылизывают их и начинают кормить. В редких случаях, однако, матери новорожденных не настолько погружаются в заботы о своем потомстве. Некоторые игнорируют новорожденных и требуют внимания к своей персоне; возможны также случаи полного неприятия и отторжения своих детей и агрессивное отношение к ним. Для тех матерей, которые совершенно не интересуются своими новорожденными котятами или щенками, прежде всего рассмотрите возможность назначения *Sepia*. При агрессивном отношении к новорожденным назначьте такой мамаше *Secale cornutum* — вполне возможно, что после применения этого средства ее отношение изменится в лучшую сторону. Тем мамам, которые озабочены собственной персоной больше, чем детьми, следует назначить *Pulsatilla*. Возможно, однако, что у матерей *Pulsatilla* либо не хватает молока, либо кормление настолько болезненно и неприятно, что они часто даже повизгивают во время кормления.

Ослабленные котята и щенки

Очень слабым и вялым новорожденным котятам и щенкам для преодоления стресса и травмы, связанной с родами, можно назначить *Arnica* или *Rescue Remedy*. Если их состояние не улучшится, то назначьте *Thuja* или, если у них холодные кожные покровы, *Carbo vegetabilis*. В тех случаях, когда новорожденные постоянно поскуливают и повизгивают, полезно назначение *Thuja* и *Pulsatilla*.

В тех случаях, когда при заботливом уходе, хорошем кормлении и отсутствии других видимых причин новорожденные остаются хилыми и вялыми, рассмотрите возможность назна-

Belladonna

У собаки могут быть расширены зрачки; кроме того, отмечается весьма горячая кожа и повышенная агрессивность.

Cicuta virosa

Зрачки расширены, отмечается сходящееся или расходящееся косоглазие. Можно наблюдать вынужденное отведение головы в сторону, выгибание шеи и спины и судорожные сокращения лицевых мышц. Возможно отхождение кровянистой пены изо рта.

Hyoscyamus

Мышечные спазмы и дрожь сопровождаются развитием слабости. В некоторых случаях отмечается расширение зрачков. На ранних стадиях развития эклампсии мышечные подергивания могут сменяться эпизодами заторможенности.

Nux vomica

Мышечные спазмы сопровождаются выраженной раздражительностью; часто непроизвольные сокращения мышц провоцируются шумом. Из всех средств, перечисленных в данном разделе, *Nux vomica* – наиболее распространенное и, следовательно, наиболее доступное средство.

Stramonium

Отмечается чередование сторон судорожных сокращений мышц конечностей и тела, а также запинаяся «пьяная» походка. Судорожные сокращения мышц провоцируются вспышками яркого света. В некоторых случаях отмечается расширение зрачков.

Strychninum

Картина симптомов при отравлении стрихнином напоминает картину эклампсии. Наблюдаются сильнейшие судороги и подергивания мышц, причем приступы судорог провоцируются шумом и прикосновением. Данное гомеопатическое средство готовится из стрихнина и при такой картине симптомов может быть очень эффективным.

Если нет возможности быстро дать вашей собаке одно из пе-

дующих средств в соответствии с симптомами.

Asafoetida

В этих случаях лактация начинается с запозданием и очень быстро количество молока уменьшается. Матери новорожденных могут быть просто чрезвычайно чувствительными особями.

Calcarea carbonica

Матери новорожденных с избыточным весом, значительными размерами молочных желез, но чрезвычайно скудной лактацией.

Calcarea phosphorica

Матери новорожденных данного типа производят впечатление недокормленных, хотя на самом деле получают полноценную пищу. Для них характерно нарушение обмена кальция. При назначении данного средства необходимы также препараты, в состав которых входит кальций.

Lac caninum

Лактация начинается в положенное время, однако очень быстро заканчивается.

Pulsatilla

Характерным симптомом для матерей данного типа является их желание привлечь ваше внимание, а не отдавать себя заботам о малышах. Лактация часто снижена, молочные железы отекают и болезненны, поэтому они часто взвизгивают, особенно в процессе кормления.

Если ни одно из этих средств вам не кажется соответствующим, то назначьте одно из следующих (перечислены в соответствии с частотой применения):

Urtica urens — в потенциях 30С и выше (низкие потенции уменьшают лактацию).

Ricinus communis — в низких потенциях (3Х, 6Х, 6С).

Lactuca virosa — в низких потенциях (3Х, 6Х, 6С).

Spirantes — в низких потенциях.

чения им *Baryta carbonica*, *Calcareo carbonica*, *Magnesia carbonica* или *Calcareo phosphorica*. Щенки и котята с симптомами *Calcareo carbonica* крупные и неуклюжие. Для *Magnesia carbonica* характерно постоянное беспокойство щенков или котят и «нервное» поведение. Новорожденные с симптомами *Baryta carbonica*, как правило, заторможенные и постоянно прячутся. Котята или щенки с симптомами *Calcareo phosphorica* тощие и хилые. У всех ослабленных и хилых щенков и котят возможно наличие тех или иных пороков развития, поэтому их необходимо показать ветеринару.

Отставание в росте

Карликовость или резкое отставание в росте представляет собой также врожденный порок развития. На мой взгляд, всех таких щенков или котят необходимо как можно раньше показать ветеринару-гомеопату, так как лечение в данном случае достаточно сложное и может потребоваться назначение глубоко действующих конституциональных средств, которые можно приобрести только по рецепту. Назначение *Baryta carbonica*, *Calcareo carbonica*, *Magnesia carbonica* или *Calcareo phosphorica* также может принести определенную пользу. Для маленьких щенков, которых принято называть «маменькин сынок» (как правило, это действительно щенки мужского пола), рассмотрите возможность назначения *Lycorodium clavatum* или *Sulphur*, если эти щенки тощие и неопрятные.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Недостаточная продукция молока

В некоторых случаях продукция молока у матери начинается не сразу после родов, как положено, а позже. Кроме того, иногда молока просто недостаточно, чтобы выкормить все потомство. Одно из растительных средств, которые резко снижают продукцию молока, — петрушка. Проследите, чтобы мать новорожденных не получала петрушку ни в каком виде. В некоторых случаях гомеопатические средства могут принести огромную пользу, стимулируя лактацию. Выберите одно из сле-

день, то это тоже будет ей очень полезно. Кроме того, при любом виде инфекции животным полезно давать ацидофилин.

Можно также назначить одно из следующих гомеопатических средств. Если за несколько дней инфицирование молока не ликвидируется, то следует обратиться в ветеринарную лечебницу.

Borax

Молоко слишком густое и имеет неприятный вкус, поэтому новорожденные щенки или котята отказываются от него. На слизистой оболочке полости рта как у матери, так и у новорожденных могут отмечаться изъязвления. Характерным симптомом является страх при движении вниз по лестнице у матери котят или щенков; сами новорожденные тоже пугаются, когда их опускают на пол после того, как носили на руках.

Calcareo carbonica

Молоко обычно жидкое и имеет неприятный для новорожденных вкус. Молочные железы у матери часто отечны, продукция молока нарушена, в области сосков отмечается болезненность и множественные трещины. Мать новорожденных может быть ширококостной и иметь избыточный вес.

Chamomilla

У молока неприятный вкус, новорожденные часто отказываются от него. Как мать, так и новорожденные постоянно повизгивают и поскуливают, чрезвычайно беспокойны, однако успокоить их довольно трудно. Иногда помогает постоянное ношение их на руках. Отмечается выраженная болезненность молочных желез и сосков.

Mercurius (vivus, solubilis)

Матери новорожденных с симптомами *Mercurius* очень раздражительны; у них отмечаются гнойные выделения из влагалища и почти прозрачное молоко. Часто эти симптомы сочетаются с диареей.

Silicea (Silica)

Матери новорожденных с симптомами данного средства очень быстро устают. Как правило, у них изящное телосложе-

Как прекратить продукцию молока после завершения кормления

Давайте *Urtica urens* в низких потенциях – 3Х, 6Х или 6С каждые несколько часов. Если *Urtica urens* не помогает, то попробуйте *Lac caninum* или *Spirantes* в потенции 30С одну или две дозы. Прекращению лактации способствует настой или отвар петрушки. Неприятные ощущения у матери новорожденных облегчаются теплыми компрессами.

Неполноценное молоко

В некоторых случаях может произойти инфицирование молока с изменением его вкусовых свойств, при этом новорожденные щенки или котята или отказываются от него, или могут заболеть, если естественное кормление будет продолжаться. При инфицировании капля молока, которая выделяется при легком надавливании на сосок, может иметь желтоватый или розоватый цвет (если в молоке есть примесь крови) вместо обычного белого цвета. В этом случае следует перейти на кормление новорожденных из бутылочки до тех пор, пока признаки инфицирования не ликвидируются и молоко не приобретет обычный вид. Кроме того, в некоторых случаях кормление становится чрезвычайно болезненным для матери новорожденных. Если же цвет молока изменился незначительно и новорожденные продолжают питаться естественным путем, то с помощью гомеопатических средств и фитопрепаратов можно попытаться избавиться от инфекции.

Для улучшения свойств неполноценного инфицированного молока можно применять настой листьев малины, настой одуванчика, крапивы, эхинацеи и настой желтокорня канадского, причем настои этих средств можно применять как по отдельности, так и в сочетании. При приготовлении настоя одну столовую ложку сухого сырья заливают примерно полулитром кипящей воды и дают настояться до полного остывания. Настой назначается по одной полной пипетке на 10–20 фунтов веса животных 2–3 раза в день. Настой желтокорня канадского не следует применять дольше двух недель у собак и дольше одной недели у кошек – это достаточно сильное фитосредство. Если вам удастся заставить мать новорожденных проглотить 1–2 полных пипетки разведенного яблочного уксуса (1 столовая ложка яблочного уксуса на один стакан воды) 2–3 раза в

день, то это тоже будет ей очень полезно. Кроме того, при любом виде инфекции животным полезно давать ацидофилин.

Можно также назначить одно из следующих гомеопатических средств. Если за несколько дней инфицирование молока не ликвидируется, то следует обратиться в ветеринарную лечебницу.

Borax

Молоко слишком густое и имеет неприятный вкус, поэтому новорожденные щенки или котята отказываются от него. На слизистой оболочке полости рта как у матери, так и у новорожденных могут отмечаться изъязвления. Характерным симптомом является страх при движении вниз по лестнице у матери котят или щенков; сами новорожденные тоже пугаются, когда их опускают на пол после того, как носили на руках.

Calcareo carbonica

Молоко обычно жидкое и имеет неприятный для новорожденных вкус. Молочные железы у матери часто отечны, продукция молока нарушена, в области сосков отмечается болезненность и множественные трещины. Мать новорожденных может быть ширококостной и иметь избыточный вес.

Chamomilla

У молока неприятный вкус, новорожденные часто отказываются от него. Как мать, так и новорожденные постоянно повизгивают и поскуливают, чрезвычайно беспокойны, однако успокоить их довольно трудно. Иногда помогает постоянное ношение их на руках. Отмечается выраженная болезненность молочных желез и сосков.

Mercurius (vivus, solubilis)

Матери новорожденных с симптомами *Mercurius* очень раздражительны; у них отмечаются гнойные выделения из влагалища и почти прозрачное молоко. Часто эти симптомы сочетаются с диареей.

Silicea (Silica)

Матери новорожденных с симптомами данного средства очень быстро устают. Как правило, у них изящное телосложе-

во время движения (например, при ходьбе по лестнице). Характерным симптомом *Lac caninum* является чередование сторон поражения – воспаление молочной железы справа может затем смениться воспалением левой молочной железы и вслед за этим вновь переместиться на правую сторону. Чередование сторон поражения может происходить удивительно быстро.

Phytolacca

У данного средства отмечается резко выраженная тропность к заболеваниям молочных желез. Для *Phytolacca* характерна выраженная болезненность молочных желез при прикосновении, их уплотнение и пурпурный цвет кожи. Воспаление такого типа протекает медленно. Боли могут быть настолько сильными, что животные жалобно стонут. Для данного средства характерно возникновение мастита после переохлаждения.

Urtica urens

Для данного лекарства характерен мягкий отек молочной железы при мастите и пятнистая сыпь красноватого цвета. Мы уже говорили, что низкие потенции *Urtica urens* уменьшают, а высокие потенции (выше 30C) – усиливают лактацию. Поскольку при мастите целесообразнее усилить лактацию, используйте, если возможно, потенции 30C.

Травмы молочной железы

Сразу же после травмы назначьте *Arnica* или *Bellis perennis*; если в дальнейшем будет развиваться посттравматическое воспаление, то рассмотрите возможность назначения *Conium* или *Phytolacca* (см. выше описания этих средств).

Показания к назначению гомеопатических средств при различных состояниях



Обзор
Абсцессы
Аллергические реакции
Укушенные раны у кошек и собак
Укусы змей
Резаные и рваные раны
Сахарный диабет
Реакции при введении некоторых
лекарственных препаратов
Эвтаназия
Страх
Боязнь громких звуков
Лихорадка и инфекции
Блохи
Отравление пищей и пищевыми
отбросами
Горе
Болезни сердца
Дирофиляриоз
Кровотечение
Повышенная двигательная активность
Нарушения функции печени
Новые обитатели вашего дома
Перегревание (солнечный удар)
Хирургические вмешательства
Заболевания щитовидной железы
Вакцинальные реакции
Гельминтозы у животных (кишечные)

ОБЗОР

В данной главе мы рассмотрим различные заболевания, которые не вошли в предыдущие главы книги. Кроме того, мы обсудим некоторые специфические ситуации, в частности травматические повреждения или хирургические вмешательства, а также поговорим о ваших действиях в этих случаях. Не следует предпринимать попыток самостоятельного лечения таких серьезных заболеваний, как, например, болезни щитовидной железы. Эти заболевания вполне успешно можно лечить (и излечить) гомеопатически, однако из-за их сложности этим может заниматься только профессиональный гомеопат. Именно поэтому гомеопатические средства, приведенные в соответствующих разделах, назначаются в виде дополнения к лечению, а не как основные препараты.

Учитывая специфику читательской аудитории, я не привожу в данной книге классического описания большинства заболеваний с позиций гомеопатии. Однако при выборе подобного средства для лечения вашего питомца применять гомеопатические принципы все же необходимо. Картина выбранного вами гомеопатического лекарства должна соответствовать картине симптомов вашего пациента, будь то собака или кошка. Например, при растяжении связок у вашей собаки вы сразу же вспомните о таком средстве, как *Arnica*. Действительно, если у собаки сильнейшие боли в пораженной конечности и она боится любого прикосновения, то ваш выбор будет совершенно правильным. Однако назначение *Arnica* будет малоэффективным, если боли не такие уж сильные, а хромота проходит после первых шагов — в этом случае картина симптомов у собаки будет указывать на *Rhus toxicodendron*, и именно от назначения *Rhus* ваша собака получит максимальную пользу. В этом и состоит основная трудность понимания гомеопатии — вы должны научиться видеть в каждом животном индивидуальность и уметь распознавать особенности ответной реакции каждого вашего пациента на стресс или иные воздействия. Если вы не прочитали первые главы книги, в которых мы достаточно подробно обсуждали основные принципы гомеопатического лечения, то я настоятельно рекомендую это сделать. Возможно, что придется прочесть первые главы несколько раз — я знаю, что при беглом чтении понять

гомеопатические приципы сложно, если не невозможно. Не следует забывать, что выбор подобного средства для лечения – только первый шаг; вам необходимо каждый раз читать описание гомеопатического средства в *Materia Medica*, чтобы убедиться в правильности вашего выбора.

АБСЦЕССЫ

Первым признаком абсцесса у животных являются мягкий воспалительный инфильтрат и локальная болезненность определенного участка кожи (однако в некоторых случаях болезненности может и не быть). Возможно, вам удастся припомнить, что за пару дней до появления отека ваш питомец – кошка или собака – участвовал в драке. Гораздо чаще абсцессы возникают у кошек; в целом организм кошки справляется с этим заболеванием намного лучше, чем организм собаки. Причиной развития абсцессов у собак нередко бывает какое-либо хроническое заболевание. Именно поэтому течение абсцессов у собак всегда более тяжелое, хотя в большинстве случаев с ними можно справиться и при домашнем лечении.

Обычно причина возникновения абсцесса состоит в повреждении кожи незначительных размеров, напоминающем колотую рану, через которую в организм проникают бактерии. Как правило, раны такого типа возникают у животных в результате укусов «партнеров» во время драки. Однако возможен и другой механизм развития абсцесса. Он формируется в тех областях организма, где имеется некое пространство в виде «кармана», в котором возникают благоприятные условия для размножения бактерий – так, например, образуются абсцессы в области челюсти вокруг корня зуба. На проникновение бактерий во внутреннюю среду организм реагирует развитием воспаления. Если лейкоцитам не удастся справиться с бактериями, то начинается формирование абсцесса в виде полости, ограниченной стенками; постепенно в этой полости скапливается гнойное содержимое. В состав гноя входят некротизированные клетки зоны воспаления, фрагменты бактерий и огромное количество лейкоцитов. Формирование стенок абсцесса представляет собой проявление защитной реакции организма –

стенки абсцесса ограничивают распространение инфекции, локализуя очаг воспаления.

Скопление гнояного содержимого и повышение внутреннего давления в полости абсцесса продолжается до тех пор, пока не произойдет самостоятельного вскрытия абсцесса и истечения гноя наружу. Выходное отверстие абсцесса формируется там, где из-за нарушения микроциркуляции клетки всех слоев кожи некротизируются. Обычно абсцесс вскрывается во внешнюю среду; таким образом гной и содержащиеся в нем бактерии эвакуируются наружу. В достаточно редких случаях внутренние абсцессы могут вскрыться в одну из полостей организма — например, в брюшную или грудную полости, что представляет собой чрезвычайно опасное осложнение. Однако в данном разделе мы будем рассматривать только абсцессы подкожной клетчатки, которые самостоятельно вскрываются во внешнюю среду.

В большинстве случаев после самостоятельного вскрытия абсцесса и эвакуации гнояного содержимого организму удастся справиться с заболеванием. Рецидив (повторное развитие) абсцесса возможен в тех случаях, когда кожная рана закрывается до того, как эвакуируется весь гной. В некоторых случаях абсцессы рецидивируют многократно. Обычно выходное отверстие абсцесса, особенно если оно достаточно большое, представляется опасной и страшной раной. Однако на самом деле большое выходное отверстие гнояной полости способствует быстрой эвакуации гноя и, следовательно, быстрому заживлению абсцесса. Абсцессы с большим выходным отверстием рецидивируют значительно реже.

Традиционно при абсцессах у животных принято назначать антибиотики, однако на самом деле необходимость их применения возникает достаточно редко. Большинство абсцессов удается вылечить с помощью гомеопатических средств.

Особенности наблюдения и лечения животных с абсцессами

Основными показаниями для обращения к ветеринару являются случаи выраженной вялости животных (при развитии вялости всегда требуется осмотр ветеринара) и замедленное заживление раны после самостоятельного вскрытия абсцесса. Следует немедленно обратиться в ветеринарную лечебницу в

том случае, если на фоне ухудшения состояния вашего питомца самостоятельное вскрытие созревшего абсцесса затягивается или отмечается уменьшение его размеров. Кроме того, осмотр ветеринара необходим при локализации абсцесса в области глазницы, анального отверстия и гениталий из-за опасности развития осложнений. Причиной локализации абсцесса в области стоп часто является инородное тело (например, колючки лисохвоста) – см. раздел «Лисохвост и инородные тела» в гл. «Кожные покровы и уши».

При развитии любого типа инфекции, в том числе и при формировании абсцесса, прежде всего необходимо укрепление иммунной системы организма. Подобным действием обладают витамины и настои некоторых трав. При абсцессах животным следует назначать *витамин С* (5–10 мг/фунт веса 2–3 раза в день), *витамин Е* (5–10 мг/фунт 1 раз в день) и *витамин А* (75–100 МЕ 1 раз в день). Полезно назначение водного настоя эхинацеи (*Echinacea*) и желтокорня канадского (*Goldenseal – Hydrastis gen.*), однако настой желтокорня я не рекомендую применять у животных дольше одной недели. Для приготовления водного настоя высушенное растительное сырье заливается кипятком (обычно одна чайная ложка сухого сырья заливается одним стаканом кипятка), настаивается до полного охлаждения и процеживается. Настои трав обычно назначаются 2–3 раза в день по половине или полной пипетке на 10 фунтов веса животных. Настои, приготовленные аптечным способом (официнальные), обычно более концентрированные, поэтому их назначают по 5 капель на 10 фунтов веса, также 2–3 раза в день.

Следы укусов и раны, полученные в драке, хорошо видны в области отека кожи до вскрытия абсцесса. В большинстве случаев для улучшения состояния животных следует ускорить самопроизвольное вскрытие абсцесса, прикладывая к пораженной области теплые компрессы 2–3 раза в день. Можно просто несколько раз в день орошать очаг поражения теплой водой в течение 5–10 минут, а после полного пропитывания шерсти положить на область воспаления компресс на 5 минут (или даже подольше). Для некоторых животных такая манипуляция весьма мучительна из-за сильной болезненности в области абсцесса – во многих случаях этот симптом помогает в выборе правильного гомеопатического средства. Назначение правиль-

ного «подобного» лекарства часто ускоряет самопроизвольное вскрытие абсцесса. В некоторых случаях при небольших абсцессах гомеопатическое средство стимулирует рассасывание воспалительного инфильтрата и самостоятельное выздоровление — в этих случаях на *фоне улучшения общего состояния* животных отек и болезненность в области воспалительного очага просто постепенно исчезают.

Если самостоятельное вскрытие абсцесса задерживается, но размеры его не уменьшаются, то возникают показания для хирургического вмешательства — это происходит в среднем в 10–15% случаев. При вскрытии созревшего абсцесса общего обезболивания обычно не требуется, так как быстро произведенный разрез менее травматичен для организма, чем общий наркоз с последующей госпитализацией. Если же требуется общий наркоз для вскрытия абсцесса, то показания для него должны быть четко обозначены.

Рана, которая образуется после вскрытия абсцесса, нуждается в специальном уходе и лечении. Рана должна оставаться открытой до полной эвакуации скопившегося гноя. Этого можно добиться за счет теплых компрессов и частого промывания раны солевыми растворами *Calendula* и *Hypericum*. Для приготовления раствора надо взять четверть чайной ложки поваренной соли, по 10 капель аптечной настойки каждого из этих средств, залить полученную смесь одним стаканом кипятка и затем охладить до комнатной температуры. Этим раствором с помощью шприца проводится аккуратное промывание раны 2–3 раза в день до ее полного очищения и заживления. Не забывайте, что *Calendula* стимулирует не только очищение раны, но и срастание ее кожных краев. В некоторых случаях при глубоких абсцессах края раны срастаются до того, как эвакуируется весь гной из полости гнойника. При глубоко расположенных и больших абсцессах первые несколько дней после вскрытия следует пользоваться только раствором *Hypericum*, увеличивая его дозу до 20 капель на один стакан солевого раствора, а *Calendula* добавить позже.

После эвакуации всего гнойного содержимого и полного очищения раны можно пользоваться мазью *Calendula* для стимуляции заживления кожной раны.

Гомеопатические средства при лечении абсцессов

Arnica montana

Данное средство применяется в основном при травматических повреждениях; если *Arnica* назначить сразу же после травмы, то во многих случаях это лекарство предупредит развитие абсцесса. Назначение *Arnica* особенно полезно в тех случаях, когда симптомы заболевания соответствуют картине данного средства — т. е. при выраженной болезненности в области абсцесса и паническом страхе прикосновения к ней. Подобные симптомы имеются также в картине *Hepar sulphuris*, однако при попытке осмотра животные с симптомами *Arnica* стремятся удрать, а животные с симптомами *Hepar sulphuris* становятся агрессивными и могут даже укусить.

Calcareo sulphurica

Данное лекарство полезно в тех случаях, когда абсцесс уже вскрылся самостоятельно и началось отторжение некротических тканей и истечение гноя — в подобной ситуации назначение *Calcareo sulphurica* ускоряет заживление раны. Для этого препарата характерно истечение гноя желтого цвета. Следует подумать о назначении данного средства (или *Sulphur*) и тогда, когда абсцесс вскрылся, полость его дренируется, однако заживление идет медленно.

Calendula officinalis

Гомеопатическое средство *Calendula* применяется для стимуляции заживления ран; пероральный прием данного лекарства можно сочетать с его местным применением. Не следует забывать, что данное средство стимулирует заживление в основном поверхностных ран, поэтому *Calendula* назначается только в тех случаях, когда глубокие участки раны уже зажили.

Hepar sulphuris calcareum

Это одно из двух главных гомеопатических средств при абсцессах. Характерными симптомами данного лекарства является особенно зловонный запах гноя (это не опечатка — гной тоже может пахнуть по-разному!) и сильная болезненность в области абсцесса. Как правило, животные с симптомами этого пре-

парата отчаянно сопротивляются всякой попытке осмотреть или промыть рану, при этом весьма свирепо рычат и даже могут укусить.

Lachesis

Данное средство готовится из яда змеи сурукуку. Если представить себе внешний вид раны, полученной в результате укуса змеи, то сразу становится понятным, в каких случаях следует назначать *Lachesis*. Для этого препарата характерна выраженная воспалительная реакция и тяжелое течение заболевания; цвет гнойного отделяемого, а также цвет краев раны варьирует от синеватого до черноватого; в некоторых случаях в составе гноя имеется примесь крови темного цвета. Животные с симптомами данного лекарства могут перетерпеть некоторые манипуляции или осмотр раны, прежде чем их терпение истощится и они начнут сопротивляться. (Несмотря на расхожее мнение об агрессивности змей, большинство из них не нападают на человека первыми и кусают только в порядке самозащиты. Исключение составляют ситуации, когда змея охотится за добычей. Змеи никогда не тратят свой яд «просто так»).

Mercurius (vivus, solubilis)

Данное средство также назначается при тяжелом течении абсцесса. Гной обычно имеет зеленовато-желтый цвет и раздражает края раны, отмечается увеличение региональных лимфоузлов. Симптомы данного препарата напоминают симптомы *Hepar sulphuris calcareum*. У животных данного типа формирование абсцесса может сопровождаться диареей, вялостью и развитием достаточно тяжелого состояния.

Myristica sebifera

Основным показанием для назначения *Myristica* является наличие инородных тел. Часто именно инородные тела в подкожной клетчатке становятся причиной формирования абсцесса, а образование гноя представляет собой защитную реакцию организма, целью которой является удаление инородного тела. В подобных случаях *Myristica* незаменима.

Nitricum acidum

Животные с симптомами данного препарата не менее злобные, чем животные *Hepar sulphuris*, и иногда даже опасны. Из-за сильной болезненности в области раны они могут напасть на любого человека, который попытается дотронуться до места поражения. Гнойное отделяемое имеет зловонный запах. Часто абсцессы располагаются в области естественных отверстий организма (анальное отверстие, рот, нос и т. п.) на границе кожи и слизистой оболочки.

Phosphorus

Для животных с симптомами данного лекарства характерно частое вздрагивание (см. введение в данный раздел). В гнойном отделяемом из полости абсцесса часто отмечается примесь ярко-красной крови.

Pyrogenium

Назначение данного средства полезно при плохом общем состоянии животных и зловонном запахе гнойного отделяемого. Для животных с симптомами *Pyrogenium* характерно выраженное беспокойство, так как из-за болей, связанных с распространением инфекции, они не могут найти удобное положение. Отмечается зловонный запах, исходящий от раны и гнойного отделяемого, однако в некоторых случаях раневое отделяемое скудное из-за снижения реактивности организма. Назначение данного препарата может быть эффективным при повторных абсцессах, которые возникают на фоне ухудшения общего состояния (сравните с *Silicea* и *Sulphur*).

Silicea (Silica)

Вероятно, именно *Silicea* является наилучшим гомеопатическим лекарством для лечения абсцессов. Для данного средства характерно жидкое гнойное отделяемое желтовато-коричневого цвета; запах гноя, как правило, менее неприятен. У кошек *Silicea* отмечается вялость и слабость, однако эти симптомы не так резко выражены, как у кошек с симптомами *Pyrogenium* или *Mercurius*. Назначение данного препарата полезно также при постоянном гнойном отделяемом из полости абсцесса при сравнительно общем неплохом состоянии животных (см. *Sulphur*).

Сущностью состояния *Silicea* является недостаточность ответной реакции организма и слабость процессов заживления. Назначение данного препарата ускоряет самопроизвольное вскрытие абсцессов при их замедленном формировании.

Sulphur

Назначение данного лекарства полезно при рецидивирующих абсцессах на фоне относительно неплохого состояния животных. Часто такие особи выглядят достаточно неопрятными и грязными – они просто не считают нужным особо заботиться о своем внешнем виде (кстати, это довольно редко встречается у кошек). Обычно животные данного типа «тепнокровные», однако при развитии абсцесса могут стать зябкими. Как и у животных *Silicea*, у животных *Sulphur* отмечается недостаточно выраженная защитная воспалительная реакция в ответ на внедрение инфекции.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

В данном разделе описываются аллергические реакции немедленного типа, которые возникают в организме сразу же после контакта с аллергеном; хроническая аллергия, лежащая в основе значительного количества кожных заболеваний, имеет несколько иной механизм развития. Большинство аллергических реакций у животных развивается в ответ на укусы насекомых; эти реакции описаны в соответствующем разделе главы 6 «Заболевания кожи и ушей». Причиной аллергических реакций другого типа часто является введение вакцин – это явление мы подробно обсудим в главе 16 «Вакцинация». Однако во многих случаях определить «виновника» развития аллергической реакции просто невозможно – в этих случаях назначение одного из гомеопатических средств, описанных в данном разделе, может оказаться эффективным.

Наиболее распространенные симптомы аллергической реакции – отек, покраснение кожи и сыпь по типу крапивницы. Эти симптомы во многих случаях сопровождаются зудом. Иногда на фоне отека развиваются нарушения дыхания, что представляет собой непосредственную угрозу для жизни животных.

Обычно дыхательные нарушения развиваются через 15–60 минут после появления других симптомов аллергии.

Большинство аллергических реакций возникает при освобождении из тканей гистамина и гистаминаподобных веществ. Сам по себе гистамин не является причиной аллергии – он освобождается из тканей в ответ на проникновение в организм аллергена, однако общие и местные симптомы аллергической реакции вызываются именно гистамином.

Антигистаминными средствами называется группа лекарств, которые при введении в организм блокируют действие гистамина – именно поэтому при развитии аллергической реакции назначение антигистаминных средств может быть эффективным. Я не сторонник назначения аллопатических лекарств, и даже при аллергии я бы не назначал антигистаминные средства, однако при развитии отека и дыхательных нарушений (и даже лишь при подозрении на возможность развития нарушений дыхания!) введение антигистаминных средств может спасти жизнь животных. Антигистаминные препараты следует вводить животным сразу же после появления первых симптомов аллергии, так как они блокируют действие гистамина, но не вызывают обратного развития симптомов аллергии. Если в анамнезе вашего питомца есть указания на развитие аллергических реакций с отеком и дыхательными нарушениями, немедленное введение антигистаминных средств при появлении первых симптомов аллергической реакции является совершенно правильным. Если же аллергическая реакция проявляется в основном раздражением кожи и зудом, то я бы не рекомендовал вводить антигистаминные препараты, разве что при чрезмерно выраженной кожной реакции и неэффективности гомеопатических лекарств.

Особенности наблюдения за животными при развитии аллергической реакции

Следует немедленно обратиться к ветеринару:

- если у вашего питомца развиваются нарушения дыхания,
- если развивается выраженный отек морды, так как вслед за этим нарушения дыхания могут последовать очень быстро. Лучше предотвратить дыхательные нарушения, вовремя обратившись в ветеринарную лечебницу.

Не откладывайте надолго обращение к ветеринару:

- если вы не отмечаете улучшения состояния вашего питомца после лечения (в течение нескольких часов после развития отека морды или в течение нескольких дней после появления крапивницы),
- если состояние ухудшается несмотря на лечение.

У животных с предрасположенностью к аллергическим реакциям риск их развития может снизить назначение *витамина С* в дозе 5–10 мг/фунт веса животных 2–3 раза в день и *витамина Е* в дозе 5–10 мг/фунт 1 раз в день. Минимизировать реакцию позволит назначение *витамина В* в дозе, соответствующей весу животного, и коэнзима Q10 (*Coenzyme Q*).

Если возникает необходимость введения антигистаминных препаратов, то у животных лучше использовать бенадрил в дозе 1–2 мг/фунт (*Benadryl, diphenhydramin*) и хлорфенирамин (*Chlorpheniramin*) в дозе 2 мг на 10–20 фунтов веса животного, но не более 8 мг у собак крупных пород. Бенадрил можно давать животным каждые 8 часов, а хлорфенирамин – каждые 12 часов. Во многих случаях 1–2 дозы бенадрила полностью купируют дальнейшее развитие аллергической реакции.

При аллергической реакции возможно также назначение кортикостероидов, которые обладают свойством обратного развития симптомов аллергии. Однако лекарства данной группы следует применять только в экстренных случаях при развитии дыхательных нарушений. При отсутствии же признаков расстройств дыхания эти препараты применять все же не следует. Предоставьте организму возможность самостоятельно справиться с аллергической реакцией или же при необходимости используйте антигистаминные средства. Другие проявления аллергии (кроме дыхательных расстройств) не представляют собой непосредственной угрозы для жизни животных.

Гомеопатические средства при аллергических реакциях

Apis mellifica

Apis является основным препаратом при отеке с развитием дыхательных нарушений. Если у вашего питомца появился

нарастающий отек в области морды, то немедленно дайте ему это средство. Своевременное назначение *Apis* предотвратит развитие расстройств дыхания. Однако, если дыхательные нарушения уже проявились, то сразу же после приема данного лекарства отправляйтесь вместе со своим питомцем в ветеринарную лечебницу.

Arsenicum album

Это средство особенно полезно у слабых и беспокойных животных. На коже отмечаются высыпания по типу крапивницы и выраженный зуд, однако в некоторых случаях зуда и высыпаний может и не быть. Данное лекарство эффективно при развитии дыхательных нарушений, протекающих без отека морды.

Rhus toxicodendron

Данное средство эффективно при сочетании крапивницы с сильнейшим зудом и беспокойством животных. Зуд уменьшается при применении горячих ванн и горячих компрессов.

Urtica urens

Гомеопатическое лекарство *Urtica urens* готовится из крапивы жгучей и представляет собой наилучшее средство при крапивнице. Характерной особенностью являются жгучие высыпания с сильнейшим зудом. Часто на коже отмечаются пятна красного цвета, высыпания сопровождаются учащением мочеиспускания.

См. также гл. 6 «Кожные покровы и уши», особенно раздел «Укусы и ужаливания».

УКУШЕННЫЕ РАНЫ У КОШЕК И СОБАК

Во всех случаях укушенных ран у кошек и собак я рекомендую показать вашего питомца ветеринару, так как рана, которая на первый взгляд кажется поверхностной, на самом деле может оказаться достаточно глубокой. Особенно необходим осмотр специалиста при ранах, полученных в результате собачьих укусов, так как их мощные челюсти при укусе могут значитель-

но травмировать ткани. Обследование в ветеринарной лечебнице является абсолютно необходимым в тех случаях, когда укушенная рана располагается в проекции жизненно важных органов. Самостоятельно в домашних условиях можно лечить только поверхностные раны небольшого размера, да и то при полной вашей уверенности, что рана не проникает глубже мышечного слоя – однако, по моему мнению, в данном случае излишняя самоуверенность может повредить вашему питомцу.

Дважды за время своей работы я видел совершенно необъяснимые случаи повреждений кишечника у кошек при укусах их собаками. В обоих случаях были свидетели, которые отчетливо видели, как на кошек нападали именно собаки. И в том и в другом случае на коже кошек не было ни единого следа укуса, однако при осмотре я обнаружил разрывы мышечного слоя передней брюшной стенки; кроме того, во время операции у обеих кошек обнаружились разрывы кишечника. В обоих случаях во время операции я внимательно осмотрел кожу передней брюшной стенки у пострадавших животных и не обнаружил никаких ран. На первый взгляд механизм подобной травмы кажется совершенно непонятным, даже загадочным. Думаю, что все дело в эластичности кожи животных, особенно кошек, что позволяет ей растягиваться – именно поэтому при незначительных кожных ранах (и даже при их отсутствии) возможны серьезные повреждения подлежащих тканей и внутренних органов. Укушенные раны – один из самых коварных видов ран, так как объем глубоких повреждений может и не соответствовать видимым повреждениям кожи. Таким образом, во всех случаях укушенных ран осмотр ветеринара является обязательным.

Даже при поверхностных укушенных ранах ветеринары склонны назначать антибиотики, однако показания для их применения на самом деле возникают нечасто. Самым важным в домашнем лечении поверхностных укушенных ран является тщательный их туалет (см. раздел «Абсцессы», где описываются средства для местного лечения ран). Туалет ран заключается в их промывании антисептическими растворами не менее 3–4 раз в день. Если вы ощущаете некротический запах, исходящий от раны, или видите, что процесс заживления идет замедленно, то непременно проконсультируйте вашего питомца в ветеринарной лечебнице. Одно из гомеопатических средств,

описанных в данном разделе, может ускорить процесс заживления.

Гомеопатические средства при лечении укушенных ран у кошек и собак

Aceticum acidum

Назначение этого средства полезно в тех случаях, когда у вашего питомца отмечается выраженная вялость, особенно если она не соответствует объему повреждения. *Aceticum acidum* поможет восстановить силы и ускорит выздоровление.

Arnica montana

Назначение *Arnica montana* полезно при всех видах травматических повреждений; именно это средство следует назначать сразу же после травмы. *Arnica* обладает способностью уменьшать боли, предупреждать развитие абсцессов и снижать степень травматизации тканей, что в конечном итоге ускоряет заживление. Особенно полезно назначение данного лекарства у тех животных, которые из-за болей боятся любых прикосновений к поврежденной области.

Hypericum perforatum

Данное лекарство необычайно эффективно при травматических повреждениях тех областей тела, где имеется значительное количество нервных окончаний — например, при повреждении пальцев или хвоста. В этих случаях *Hypericum* облегчает боли даже быстрее, чем *Arnica*. Если у вашего питомца имеется укушенная рана в одной из этих областей и при назначении *Arnica* боли не уменьшились, то прием данного средства вполне целесообразен. Как-то раз во время осмотра меня за палец укусила кошка, и мне пришлось принять *Hypericum*. Я удивился, насколько эффективно данное лекарство — боли в области раны прошли буквально минуты через две.

Lachesis

Назначение *Lachesis* эффективно в тех случаях, когда цвет раны варьирует от багрового до темно-синего или черного. Часто такой вид имеют раны, полученные в жестокой драке. Для

данного лекарства характерно быстрое инфицирование укушенных ран вследствие нарушения микроциркуляции в пораженной области.

Ledum palustre

Ledum является главным гомеопатическим препаратом при колотых ранах; назначение данного средства вполне оправдано и при укушенных ранах, особенно если рана по внешнему виду напоминает колотую и не отмечается значительных разрывов кожи. В некоторых случаях в области раны обнаруживаются подергивания мышц; по периферии раны кожа может быть холодной на ощупь. Считается, что назначение *Ledum palustre* эффективно предупреждает развитие столбняка. В целом данное средство особенно эффективно при колотых ранах, причиной которых явился, например, ржавый гвоздь или что-либо подобное.

Lyssinum

Препарат представляет собой нозод бешенства. В США данное средство продается только по рецептам профессиональных гомеопатов, имеющих лицензию. Своевременное назначение данного нозода при обширных ранах, полученных во время жестокой драки, в какой-то степени может предупредить передачу склонности к агрессии от одного животного другому (см. гл. 13 «Нервная система», раздел «Агрессивность и рабический миазм »).

УКУСЫ ЗМЕЙ

В США распространено свыше 20 видов ядовитых змей, принадлежащих к четырем семействам. Чаще всего встречаются представители семейства гремучих змей (*Crotalus* и *Sistrurus*); затем идут змеи семейства щитомордников (*Agkistrodon contortrix*) и семейства мокасиновых змей (*Agkistrodon piscivorus*). Реже других встречается коралловая змея (*Micrurus*), однако она же и является наиболее ядовитой (коралловые змеи – близкие родственники кобр). Коралловые змеи, щитомордники и мокасиновые змеи встречаются в южных

районах США, а гремучие змеи везде чувствуют себя как дома.

На основании моего опыта могу сказать, что, несмотря на свою репутацию, змеи далеко не так агрессивны, как мы привыкли думать; большинство змей нападают на человека только тогда, когда чувствуют угрозу. Некоторый опыт «общения» со змеями я приобрел в детстве; позже, уже работая врачом-ветеринаром в штате Северная Каролина, мне тоже приходилось встречаться с ними. Моими «учителями» были, как правило, щитомордники и гремучие змеи (в основном древесная гремучая змея *Crotalus horridus*); два раза мне удалось увидеть мокасиновую змею. В 95% случаев на собак нападают змеи семейства щитомордников, однако я ни разу не видел, чтобы змея укусила кошку – кошки достаточно быстры и проворны, чтобы успеть увернуться. Иногда кошки сами нападают на змей, однако не на ядовитых. Наибольшей агрессивностью и быстротой обладают щитомордники. Очевидно, что щитомордники менее толерантны к нарушению их покоя, воспринимая как угрозу любое событие, которое происходит в окружающем их мире.

В отличие от щитомордников большинство видов гремучих змей совершенно пассивны и невозмутимы. Однажды в лесу я увидел неподвижно лежащего на дорожке бурундука – я подумал, что с ним что-то случилось, нагнулся и дотронулся до него. К своему удивлению, я почувствовал, что его тело еще теплое. Однако когда я оглянулся, то вдруг буквально в футах от бурундука увидел гремучую змею, которая спокойно поджидала, когда же он умрет. Я медленно выпрямился и (хотите верьте, хотите нет) также медленно отошел. Змея даже не пошевелилась. Раньше я слышал подобные рассказы о встречах людей с гремучими змеями, однако теперь смог убедиться на собственном опыте, что гремучие змеи действительно малоагрессивны, скорее даже пассивны. Говорят, что не все представители этого вида такие невозмутимые, однако, по-моему, все дело в генетическом страхе, который испытывают большинство людей при виде змей.

Мокасиновые змеи скорее всего будут защищать свою территорию и не убегут при виде человека, однако я не знаю, так ли стремительно они нападают, как их сородичи-щитомордники. Я мало что знаю о коралловых змеях, но, насколько я слышал, они малоагрессивны – скорее даже, миролюбивы. Кроме того, у

коралловых змей ротовая щель небольшая, и укусить они могут не больше чем за палец, хотя их яд чрезвычайно опасный, практически смертельный.

К нашему счастью, яд щитомордника не настолько опасен. Я ни разу не видел, чтобы собаки погибали от их укусов. Конечно, вокруг зоны укуса развивается ужасный отек и болезненность, однако практически всегда организм собак справляется с ядом самостоятельно. У гремучих змей яд значительно токсичнее, кроме того, вокруг укуса развиваются выраженные местные повреждения с некрозом кожи и образованием огромных инфицированных ран. Большинство собак после укуса гремучей змеи выживают, но возможны и смертельные исходы. Яд мокасиновой змеи напоминает яд щитомордника, может, чуть токсичнее. Яд коралловой змеи обладает выраженным нейротоксическим действием и практически смертелен, однако местные повреждения тканей невелики.

Самое лучший способ «общения» со змеями – стараться просто избегать встречи с ними и соблюдать определенные меры предосторожности при прогулках в лесу. Однако собакам это объяснить невозможно. Поэтому старайтесь, чтобы в лесу ваш питомец все же бегал по дорожкам, не углубляясь в заросли, – это в какой-то степени может предотвратить нежелательные встречи со змеями. И ни в коем случае не убивайте змей – это тоже часть природы, часть окружающего нас мира. Я думаю, что змеи будут относиться к нам с большим уважением, если мы просто оставим их в покое.

Особенности наблюдения за животными с укусами змей

Если вашу собаку укусила змея, то непременно следует обратиться к ветеринару. Если вы точно уверены, что это была гремучая змея, то самое лучшее лечение – введение противоядия (если у вас есть это средство и укус получен не более двух часов назад). Я не рекомендую применять противоядие при укусах щитомордника, так как риск при введении противоядия превышает риск от яда щитомордника, попавшего при укусе в организм. У меня нет собственного опыта лечения укусов других змей, в частности мокасиновой змеи, но я бы лечил эти укусы так же, как и укусы щитомордника (конечно, если бы

точно знал, что яд мокасиновой змеи не такой смертельно опасный, как яд гремучей). При укусе коралловой змеи необходимо ввести противоядие, однако, по-моему, шансы выжить после этого укуса невелики — но собственного опыта лечения укусов коралловой змеи у меня нет (коралловая змея в основном обитает на самом юге США и в некоторых южных районах Техаса. К счастью, вероятность встречи с ней мала).

Раны, полученные в результате укусов змей, следует лечить в соответствии с общими принципами лечения укушенных ран, местно применяя те же средства, о которых мы говорили в разделе «Абсцессы». Кроме того, детоксикации яда змей помогает местное применение настоя эхинацеи (*Echinacea*), цедрона (*Cedron*) и голондрины (*Golondrina*), произрастающей в некоторых западных штатах. Можно также назначить одно из гомеопатических средств, описанных в данном разделе. Однако обращение к ветеринару во всех случаях является обязательным.

Гомеопатическое лечение при укусах змей

Выбор гомеопатического средства при укусах змей ограничивается теми препаратами, которые имеются в вашей домашней аптеке. Следует назначать самые высокие потенции лекарств, которые только у вас есть. Не забывайте, что в данных случаях назначение гомеопатического средства не заменяет обращения в ветеринарную лечебницу.

Сразу же после того как вы обнаружили факт укуса змеей, дайте вашему питомцу либо *Ledum*, либо *Lachesis*, либо *Belladonna*. Показания к назначению этих средств мы рассматривали в разделе «Укушенные раны у кошек и собак». Если ваша собака тороплива, беспокойна и у нее отмечается расширение зрачков, то можно назначить ей *Belladonna*. Местно можно приложить компресс с настоем трав, о которых говорилось в разделе «Абсцессы». При наличии выраженных местных изменений в области укуса дайте собаке *Arsenicum album*, *Lachesis*, *Cedron* или *Vipera*. При развитии коллаптоидного состояния дайте *Arsenicum* или, если отмечается похолодание кожных покровов, *Camphora*. Если вскоре после укуса развиваются признаки генерализованной инфекции, то целесообразно назначить *Echinacea* либо *Cedron*. Признаки инфекции развиваются обычно через 24–48 часов после укуса гремучей змеи и реже —

при укусах других змей. При развитии выраженной слабости у вашего питомца следует подумать также о назначении *Aceticum acidum* или *Carbo vegetabilis*, а при развитии инфекции – о назначении *Pyrogenium* или *Carbolicum acidum*.

При последствиях укусов змей следует рассмотреть возможность назначения *Mercurius* или *Phosphorus* (конечно, если картина симптомов не указывает на другое гомеопатическое средство). Если процесс выздоровления затягивается, непременно обратитесь к специалисту-гомеопату.

РЕЗАНЫЕ И РВАНЫЕ РАНЫ У КОШЕК И СОБАК

При лечении резаных и рваных ран у животных следует применять средства для местного лечения, описанные в разделе «Абсцессы». Обязательно обратите внимание на особенности назначения гомеопатического лекарства *Calendula*. В острой фазе раневого процесса тщательный туалет ран и их промывание обычно проводится не менее 3–4 раз в день. Если резаная рана в длину более дюйма и шириной более полдюйма, то в первые часы после травмы ее следует ушить (естественно, обратившись к ветеринару). Для ускорения процесса заживления можно назначать одно из гомеопатических средств, описанных в данном разделе.

Arnica montana

Данное средство чаще всего используется при тупой травме, однако назначение *Arnica* полезно также и при резаных ранах при их сочетании с тупой травмой. Это лекарство обладает способностью уменьшать боли при травматичных рваных ранах.

Calendula officinalis

Данное средство значительно ускоряет процесс заживления значительных по площади рваных ран. Ярко выраженной особенностью *Calendula* является ее способность ускорять срастание краев кожной раны, при этом в некоторых случаях в глубине раны остаются «карманы», т. е. полости, заполненные гнойным содержимым, которое после срастания краев раны не может самостоятельно эвакуироваться наружу. Именно из-за этой осо-

бенности данное средство следует применять или при лечении поверхностных ран, или на поздних этапах раневого процесса, когда глубокие участки раны уже зажили. Настой *Calendula* для местного применения обладает такими же свойствами.

Carbolicum acidum

Назначение данного средства особенно полезно при инфицированных ранах и замедленной способности ран к самостоятельному заживлению.

Hypericum perforatum

Назначение *Hypericum* необычайно эффективно как в потенцированной форме, так и местно. Данное средство значительно облегчает боли в области ран, особенно если повреждение располагается в областях с развитой иннервацией, например в области пальцев или хвоста. Следует обдумать назначение *Hypericum* также при сильной болезненности в области раны.

Staphysagria

Назначение данного средства особенно показано при болях в области ран, нанесенных острыми предметами, в том числе и при болях в области хирургических разрезов.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Сахарный диабет представляет собой очень серьезное заболевание, лечение которого следует проводить только под руководством опытного врача-гомеопата или ветеринара-гомеопата. Гомеопатическое лечение помогает улучшить состояние пациента, однако случаи излечения диабета у животных — чрезвычайная редкость. У кошек наблюдаются случаи транзиторного развития симптомов диабета, а иногда кошки выздоравливают самостоятельно.

Все животные с диабетом нуждаются в назначении препаратов хрома либо в виде пиколината хрома (*Chrominum picolinate*), либо в виде *GTF chromium* (можно назначать любое из этих средств). Кошкам обычно назначается 50 мкг хрома дважды в день, а собакам доза хрома рассчитывается в зависи-

мости от их веса, в среднем 50 мкг хрома на 15–25 фунтов веса животного дважды в день. Можно также разбить суточную дозу не на два, а на три-четыре приема. Препараты хрома стимулируют собственную продукцию инсулина островками Лангерганса поджелудочной железы; поэтому необходимо внимательно наблюдать за состоянием животных, если вы решили назначить препараты хрома на фоне инъекций инсулина.

Уровень глюкозы в крови животных, больных диабетом, может снизиться при применении некоторых пищевых продуктов и настоев трав, в частности настоя одуванчика, настоя ягод черники или настойки женьшеня. Сахароснижающим эффектом обладает спаржевая фасоль и мескитские бобы. У людей при ювенильных формах диабета в некоторых случаях помогает назначение ниацинамида (*Niacinamide*). Все эти средства совершенно безопасны, однако ответная реакция организма у больных животных обычно индивидуальна. Действуя методом проб, вы можете найти наиболее эффективные препараты. Хорошим сахароснижающим действием обладает чеснок, однако длительное его применение у животных может вызвать развитие анемии (кошки особенно подвержены этому заболеванию).

РЕАКЦИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В данном разделе речь идет о реакциях организма, которые проявляются сразу же после введения некоторых аллопатических лекарств, а не о тех, которые развиваются длительно в виде, например, хронического гепатита. Лечение хронических реакций типа гепатита следует доверить опытному врачу-гомеопату.

Побочная реакция организма животных на введение некоторых аллопатических лекарств, например антибиотиков, чаще всего проявляется в виде рвоты и диареи, так как эти препараты (особенно антибиотики) подавляют деятельность нормальной микрофлоры кишечника. Кроме того, возможно развитие острого гепатита и гломерулонефрита. Прежде всего при развитии подобных осложнений следует прекратить прием токсичного препарата (конечно, если это возможно), однако толь-

ко после консультации с ветеринаром. Если после отмены препарата диарея продолжается, то можно добавить в пищу ацидофилин или назначить препараты, которые восстанавливают нормальную микрофлору кишечника (например, ацидофилин в капсулах). Полезно также назначение активированного угля или настоя коры вяза. Кроме того, полезным будет назначение одного из следующих гомеопатических средств.

Arsenicum album

У животных с симптомами данного средства развивается и рвота и диарея, причем рвота провоцируется даже небольшим количеством съеденной пищи или выпитой жидкости. Характерно, что диарея и рвота могут возникать одновременно.

China

Это средство полезно при диарее, особенно в тех случаях, когда диарея длительная и вызывает слабость.

Lycorodium clavatum

Назначение *Lycorodium* эффективно при повышенной чувствительности организма животных к лекарственным препаратам, а также при развитии диареи с обильным количеством кишечных газов. Характерно, что у таких животных диарея развивается при изменении пищевого рациона.

Nux vomica

По моему мнению, *Nux vomica* является основным средством при развитии реакций на аллопатические препараты. У таких животных развивается диарея и тенезмы до, во время и после дефекации. Создается впечатление, что у них не происходит полного опорожнения прямой кишки. Обычно эти животные раздражительные; в некоторых случаях отмечается также нарушение мочеиспускания.

Pulsatilla

Для животных с симптомами данного средства характерно развитие диареи или запора после введения антибиотиков. Эти животные обычно очень привязчивые и требуют постоянного внимания. Характерно, что у них не возникает жажды несмотр-

ря на потерю жидкости при диарее.

Thuja occidentalis

Назначение *Thuja* также полезно при возникновении реакций на введение некоторых аллопатических препаратов, однако в отличие от большинства животных эти реакции у представителей типа *Thuja* проявляются в виде нарушений мочеиспускания.

ЭВТАНАЗИЯ

В начале своей практической работы у меня, как и у многих ветеринаров, не возникало никаких сомнений в разумности и ценности эвтаназии. Мне казалось, что возможность прекратить страдания смертельно больных животных — это благо, данное нам нашей профессией. Однако со временем я начал понимать, что этот вопрос гораздо сложнее и деликатнее, чем мне казалось раньше, особенно если принять во внимание ту огромную степень моральной ответственности, которая на нас лежит. Три года назад мне пришлось прибегнуть к эвтаназии моего кота Рампла, который долгие годы жил в нашей семье, — это было тяжелое и мучительное решение. Не менее тяжелым и мучительным этот выбор бывает для всех тех, кто любит своих животных, особенно если они еще не достигли критического возраста.

Основной фактор, который мы всегда должны учитывать при принятии решения об эвтаназии, — это, безусловно, интересы наших питомцев. Но в этом случае возникает огромное количество вопросов. Где пределы страданий? Страдают ли кошки и собаки так же, как и мы? Страдают ли в одинаковой степени представители одного и того же вида? Где та черта, за которой страдания и мучения, которые приносит болезнь, становятся невыносимыми? Является ли смерть и избавление от страданий достойной наградой за предсмертные мучения? И наконец, возникает вопрос морально-этического характера: «Имеем ли мы право распоряжаться жизнью других существ?» Если нам дано это право, то какими критериями мы должны руководствоваться?

Все эти вопросы мучили меня, когда я должен был решиться на эвтаназию своего кота Рампла. С одной стороны, я не мог себе позволить так грубо вмешиваться в его жизнь. Но его страдания разрывали мне сердце. Какой же выход предпочел бы он сам, если бы у него была такая возможность? Мне не дано было узнать это. Я попробовал назначить ему гомеопатические средства, чтобы облегчить переход в иной мир, но безрезультатно. В конце концов, после длительных мучительных раздумий, я решился на эвтаназию, думая только об одном – прекратить его мучения и страшные боли, которые он испытывал. Когда все было кончено, в комнате воцарилось ощущение покоя и какого-то странного умиротворения. Только тогда я четко осознал, что это действительно был наилучший выход и я сделал для него все, что мог.

В конечном счете самое главное в подобных ситуациях – это полная уверенность, что все наши действия предпринимаются именно в интересах наших питомцев. При решении вопроса об эвтаназии не может быть шаблонного подхода – каждый случай индивидуален и требует индивидуального рассмотрения. Если у вас есть хоть какие-то сомнения в правильности вашего решения – подождите, пока не станет понятной причина сомнений. Я вспоминаю в связи с этим один случай из моей практики. Как-то раз мне на прием принесли больную кошку – я был третьим или четвертым ветеринаром, к которому обратились за консультацией. В семье, где жила эта кошка, все ее очень любили и делали для нее все, что только могли. Казалось, несчастному животному уже невозможно помочь, и в конце концов встал вопрос о прекращении ее страданий путем эвтаназии. Однако в тот момент, когда я уже приготовился сделать внутривенную инъекцию, кошка вдруг рванулась изо всех сил и начала отчаянно сопротивляться. Мы одновременно поняли, что ее час еще не пробил. После неудавшейся попытки эвтаназии состояние кошки улучшилось, и она, прожив еще несколько месяцев, умерла естественной смертью.

Я всегда советую ждать до тех пор, пока не будет уверенности в том, что эвтаназия в данном случае – наилучший для животного выход и единственная возможность избавления от тяжелых непереносимых страданий. Многие животные просто тихо угасают и покидают этот мир в срок, назначенный приро-

дой. По моему убеждению, такой исход без вмешательства человека, несомненно, более естественный как для самих животных, так и для всей семьи, в которой они жили. Однако порой эвтаназия является действительно благом и возможностью избавить животных от мучений.

Некоторые гомеопатические средства обладают способностью облегчить переход в иной мир. Эту возможность непременно следует рассмотреть до того, как решиться на эвтаназию вашего питомца. Нельзя исключить возможность некоей психической связи между вашим питомцем и вами; иногда именно эта связь не позволяет животным покинуть этот мир без вашего разрешения.

При умирании большинство живых существ страшится неизвестности – так происходит и с людьми, и с животными. Именно по этой причине в последние часы жизни помогает гомеопатическое средство *Arsenicum album*, так как в картине симптомов *Arsenicum* присутствует страх смерти и страх одиночества. Часто именно из-за этого страха животные перед смертью бывают беспокойны. Назначенный умирающим животным *Arsenicum*, однако, не является причиной смерти – смерть наступает в силу естественных причин, а данное лекарство уменьшает сопротивление естественному исходу и облегчает наступление смерти у тех животных, у которых картина симптомов в предсмертный период все более напоминает картину *Arsenicum*. Это действительно так – если по мере приближения смерти у животных определяется картина какого-либо гомеопатического средства, то его назначение облегчает естественный исход. Я наблюдал подобное у собаки с четкой картиной симптомов *Phosphorus* перед смертью – назначение *Phosphorus* успокоило животное и облегчило уход из жизни.

В предсмертном состоянии у животных часто наблюдаются симптомы *Tarentula cubensis*, особенно если причиной их терминального состояния является злокачественная опухоль и связанные с ней мучительные боли. Состояние *Tarentula cubensis* намного тяжелее, чем состояние *Arsenicum* (не путайте это средство с *Tarentula hispanica*).

Помимо гомеопатических средств облегчить состояние животных перед смертью помогают некоторые фитопрепараты. Например, фитопрепарат *Rescue Remedy* эффективен при выра-

женном страхе и стрессе, грецкий орех и *Mimulus* помогают преодолеть страх смерти и неизвестности. Все эти лекарства можно дать перорально, но можно также втереть во внутреннюю поверхность ушной раковины или просто поставить рядом с умирающим животным.

Если вы решитесь на эвтаназию вашего питомца, то все эти фитопрепараты помогут ему преодолеть страх смерти и испуг. Хорошим седативным действием обладает гомеопатическое лекарство *Passiflora incarnata*. Кроме того, для релаксации и уменьшения страха можно перед инъекцией дать вашему питомцу комбинированное средство *Calms and Calms Forte* или настойку валерианы (несколько полных пипеток).

СТРАХ

Все естество некоторых животных буквально пронизано страхом, что находит несомненное отражение в их поведении. Этот страх не имеет ничего общего с осторожностью некоторых кошек с присущей им робостью. Это парализующий страх; именно он заставляет кошек и собак исчезать и надолго прятаться, если в дом приходят незнакомые им люди. Именно этот страх заставляет собак набрасываться на людей в ситуациях, когда им вроде бы ничего не угрожает. Именно из-за этого страха у некоторых кошек возникают проблемы с физиологическими отправлениями — они испытывают чувство безотчетного страха при виде своего «туалета», отказываясь даже приближаться к помещению, где он расположен.

Такие особенности поведения требуют назначения конституциональных лекарств и лечения у ветеринара-гомеопата. Однако некоторые гомеопатические лекарства из этого раздела вы можете назначать самостоятельно, при условии, конечно, что картина симптомов у вашего питомца будет подобна картине симптомов одного из этих средств.

Aconitum napellus

Aconitum является одним из главных средств при страхе. Обычно страх у животных с симптомами этого лекарства имеет всеобъемлющий характер и развивается вследствие психоэмо-

циональной травмы. Эти животные боятся всего на свете; следствием этого чувства является их постоянная встревоженность и беспокойство. Их ответная реакция обычно быстрая и выраженная.

Arsenicum album

Классические симптомы этого лекарства отмечаются у пугливых кошек, которые в ужасе убегают и прячутся при виде незнакомцев, однако дружелюбны и ласковы с теми, кого хорошо знают.

Calcareo carbonica

Животные с симптомами этого препарата боятся новых ситуаций и незнакомых людей. Страх, владеющий ими, проявляется обычно не в том, что и как они делают, а в том, что они делать отказываются – например, они никогда не заходят в определенные помещения в доме и т. п. Страх перемен заставляет их панически бояться переезда; из-за смены места жительства у таких животных могут развиваться соматические заболевания. Создается впечатление, что некто или нечто управляет их поведением, так как в некоторых случаях они просто не реагируют на обращенные к ним слова.

Passiflora incarnata

Данное лекарство обладает успокаивающим действием, однако не предотвращает появление страха. Я обычно использую его в низких потенциях – 3X, 6X, 3C или 6C. *Passiflora* входит в состав комплексного средства *Calms and Calms Forte*, однако его применение в течение длительного времени не рекомендуется.

Stramonium

Характерным симптомом данного препарата у животных является чувство ужаса, которое иногда приводит к агрессии, – именно это чувство заставляет собак нападать на людей. Возможно, что причиной такой реакции является непонятный для них посторонний шум, а агрессивное поведение возникает как защитная реакция. В некоторых случаях собаки с симптомами *Stramonium* могут наброситься даже на случайных прохожих. Помимо шума такую же ответную реакцию может спровоциро-

вать темнота или яркая вспышка света.

БОЯЗНЬ ГРОМКИХ ЗВУКОВ

Боязнь громких звуков представляет собой отдельный симптом, который можно наблюдать у достаточно большого числа животных. Этот симптом является частью картины многих гомеопатических лекарств, некоторые из них рассматриваются в этом разделе.

Боязнь грома и молний

Самое известное средство, в картине которого имеется данный симптом, — *Phosphorus*. Назначение этого препарата помогает некоторым животным, хотя и немногим (примерно 10%). Такие животные сильно вздрагивают при внезапном шуме и могут буквально подпрыгнуть на месте, если рядом с ними на пол упадет какой-то предмет. Кошка при внезапном шуме даже может вас сильно поцарапать, если в этот момент нежится у вас на коленях. Менее известно гомеопатическое средство *Electricitas*, которое готовится из молочного сахара при насыщении его электричеством. Это средство полезно животным, которые ранее испытали сильнейший испуг при близком ударе молнии; после такого испуга у животных часто развивается сильнейший страх звуков грозы.

Боязнь выстрелов и хлопучек

В этих случаях также эффективно назначение *Phosphorus*. Назначение *Borax* помогает животным, которые боятся и вздрагивают при звуках отдаленных выстрелов.

Боязнь звуков льющейся воды и водопада

Данный симптом расценивается как часть картины рабического миазма (см. «Агрессивность и рабический миазм» в гл. 13 «Нервная система») и возникает обычно после вакцинации против бешенства. Лечение таких животных не следует проводить самостоятельно — в этих случаях требуется консультация профессионального гомеопата. При страхе такого типа обычно назначаются *Hyoscyamus*, *Lyssinum* или *Stramonium*.

ЛИХОРАДКА И ИНФЕКЦИИ

Традиционные ветеринары и «человеческие» врачи-аллопаты обычно рассматривают лихорадку (т. е. повышение температуры тела) как симптом, который требует быстрого устранения. Это вполне соответствует традиционным взглядам аллопатов на развитие болезни, согласно которым симптом – это и есть болезнь, а не попытка организма справиться с болезнью. В большинстве случаев заболеваний врачи-гомеопаты считают повышение температуры тела хорошим признаком, предпочитая не прямо купировать лихорадку, а воздействовать на ее источник.

По мнению традиционных ветеринаров, лихорадка считается признаком инфекции, которую надо непременно лечить антибиотиками, – т. е. назначение антибиотиков рассматривается как метод устранения причины лихорадки. Фактически же лихорадка указывает на наличие в организме воспалительного процесса, но не обязательно вследствие бактериальной инфекции. Причиной развития воспаления может быть и вирусная инфекция, при которой назначение антибиотиков бесполезно, а также ряд других причин, не связанных с бактериальной инфекцией. Таким образом, в значительном количестве случаев лихорадочной реакции назначение антибиотиков нецелесообразно.

Развитие лихорадочной реакции у животных часто сопровождается появлением ряда специфических симптомов – именно эти особые симптомы представляют собой хорошее подспорье в выборе подобного гомеопатического средства. Соответствующие препараты представлены в тех разделах, где описываются такие симптомы. Если же специфических симптомов нет (обычно так бывает у кошек), то одно из гомеопатических средств, представленных в данном разделе, позволит избежать назначения антибиотиков и ускорить выздоровление вашего питомца.

Нормальной температурой тела у кошек и собак считается $38,6^{\circ}$ по Цельсию (или $101,5^{\circ}$ по Фаренгейту). Повышение температуры до $39,2^{\circ}\text{C}$ ($102,5^{\circ}\text{F}$) большинством ветеринаров не считается признаком заболевания, особенно у кошек, которые склонны к повышению температуры тела при некоторых стрессовых ситуациях (например, при осмотре в ветеринарной лечебнице). У собак при лихорадке температура тела может

повыситься до 40°C (104°F), в редких случаях до $40,5^{\circ}\text{C}$ (105°F). У кошек при лихорадке температура обычно повышается до $40,3^{\circ}\text{C}$ (106°F), в редких случаях до $41,3^{\circ}$ (свыше 106°F). По моему мнению, высокая температура тела при лихорадке не приносит особого вреда, поэтому не стоит сильно волноваться, если у собаки температура поднимается до $40,5^{\circ}\text{C}$ (105°F), а у кошки до $41,1^{\circ}\text{C}$ (106°F). В подобных случаях я обычно не назначаю животным какие-либо специальные средства для снижения температуры, так как лихорадка, в сущности, правильная и полезная ответная реакция организма. Если же температура тела у животных превышает эти значения, особенно если лихорадочная реакция длится долго, то следует обратиться к ветеринару для выяснения причины.

Особенности наблюдения за животными при лихорадке и инфекции

Если у вашего питомца развивается вялость на фоне лихорадочной реакции, которая длится более двух дней, то необходимо обратиться в ветеринарную лечебницу и определить причину этого состояния.

При лихорадке и инфекциях вполне целесообразно назначение средств для укрепления иммунитета, о которых мы говорили в разделе «Особенности наблюдения за животными при развитии абсцесса». Полезно назначение настоев астрагала и кошачьего когтя, которые применяются в тех же дозах, что и настои эхинацеи и желтокорня канадского. Если вам точно известна причина сильной лихорадки у вашего питомца, то можно назначить ему китайское растительное лекарство *Yinpan raigua* (см. раздел «Кровотечение» в данной главе). Кроме того, из предложенных в этом разделе гомеопатических средств можно выбрать наиболее подобное, соответствующее симптомам заболевания у вашей кошки или собаки. Если же после назначения гомеопатического препарата температура не снижается в течение 12–24 часов и состояние не улучшается, то можно дать другое средство или же обратиться к ветеринару. Ни в коем случае не давайте вторую дозу выбранного вами лекарства из-за возможности ухудшения состояния. При ухудшении состояния необходимо повторно проанализировать симптомы и либо дать другое средство, либо обратиться к ветеринару.

Aconitum napellus

По моему мнению, назначение данного средства является эффективным у животных с лихорадкой при отсутствии других специфических симптомов. Характерно внезапное повышение температуры тела. Особенно полезно назначение *Aconitum* при лихорадке вследствие длительного пребывания животных на холодном ветру, а также при сочетании лихорадки с беспокойством и тревожностью.

Belladonna

Для данного препарата характерно внезапное появление лихорадки (как и у животных с симптомами *Aconitum*), однако обычно животные этого типа более «теплокровные» (не из-за высокой температуры, а по своей природе) и более возбужденные. При возбуждении могут отмечаться расширение зрачков, раздражительность, даже эпизоды агрессивного поведения.

Echinacea

Назначение гомеопатического лекарства *Echinacea*, как и травяного настоя, полезно при развитии инфекции. Характерными симптомами данного средства является очень тяжелое течение инфекционного процесса, слабость и изменение физиологической окраски десен. Животные с подобной картиной заболевания часто нуждаются в неотложной ветеринарной помощи.

Ferrum phosphoricum

Данное лекарство в основном показано на ранних стадиях развития инфекции у животных, а также при инфекциях, напоминающих грипп. Характерна выраженная вялость, может развиваться анемия. В некоторых случаях тяжелого течения отмечается изменение окраски десен до бледной или синюшной — в этих случаях требуется помощь ветеринара. Иногда симптомы сочетаются с выделениями из носа и конъюнктивитом.

Gelsemium

Назначение *Gelsemium* особенно полезно при развитии слабости у животных после перенесенного инфекционного заболевания, а также в тех случаях, когда затягивается процесс выздоровления. Назначение данного средства эффективно на ран-

них стадиях заболевания, при выраженной вялости и слабости. У животных *Gelsemium* слабость выражена сильнее, чем у животных *Ferrum phosphoricum*.

Pyrogenium

Данное средство эффективно при постоянной тяжелой лихорадке, приводящей к развитию сильной слабости. Кроме лихорадочной реакции у животных с симптомами *Pyrogenium* отмечаются боли в области спины и, как следствие, беспокойное поведение. В некоторых тяжелых случаях отмечается темная окраска десен (десны выглядят как будто испачканные землей).

Sulphur

Назначение данного лекарства эффективно у животных при отсутствии полноценного иммунного ответа на развитие инфекции. Характерна постоянная, но невысокая лихорадка, которая не уменьшается, но и не усиливается. Обычно такие животные неопрятные и грязные. Если на назначение *Sulphur* не отмечается соответствующей реакции организма, то не следует длительно применять данное лекарство из-за опасности усиления симптомов.

БЛОХИ

Эта тема далеко не так проста, как кажется на первый взгляд, и требует подробного рассмотрения. Если к инфекации блохами относиться как к заболеванию, то наиболее важным мероприятием, как и при любом другом заболевании, является укрепление здоровья вашего питомца. В общем и целом при создании для животных благоприятных во всех отношениях условий жизни они значительно меньше страдают от кожных паразитов. Под благоприятными условиями жизни домашних животных я подразумеваю полноценную пищу, минимизацию воздействия стрессовых факторов и, конечно, внимательное и любящее отношение. Хороший эффект отмечается от регулярного и правильного ухода за шерстью животных, однако здоровые животные обычно посвящают уходу за собой достаточно много времени.

Успешная борьба с блохами зависит в основном от того, насколько результативно мы можем влиять на стадии их развития, протекающие во внешней среде, т. е. вне животных. Жизненный цикл блох состоит из тех же самых стадий, что и у бабочек, — это стадии яйца, личинки и куколки, из которых впоследствии выходят взрослые особи. 99% блох, паразитирующих на кошках, и 85–95% блох на собаках относятся к виду *Ctenocephalides felis*, или «кошачья блоха». Второе место по частоте занимает инфестьация *Pulex irritans*, или «человечьей блохой», а третье место — *Ctenocephalides canis*, или «собачьей блохой». На северо-востоке США преобладает *Ctenocephalides canis*.

Взрослые особи паразитируют на шерсти кошек и собак и там же откладывают яйца, которые затем сваливаются с шерсти; следующий этап их развития происходит во внешней среде. Для того чтобы из яйца через 2–5 дней вылупилась личинка, необходима влажность не менее 70–80%. При влажности внешней среды примерно 30–40% дальнейшего развития яиц не происходит. Личинки блох белого цвета, подвижные, с пигментированной красновато-коричневой полоской кишечника; личинки блох обычно обнаруживаются там, где ваш питомец проводит большую часть времени. Личинки питаются фекалиями взрослых блох.

Личинки чрезвычайно чувствительны к условиям внешней среды и погибают, если влажность менее 40–50% и температура менее 95 °F (или 35 °C). Именно поэтому личинки стремятся в какое-нибудь укромное теплое и влажное место, подальше от яркого света, забиваясь в ворс ковра, под мебель и т. п.

Через 2–3 недели личинки оплетают себя коконом и превращаются в неподвижных куколок; процесс превращения личинки в куколку занимает примерно 1–3 недели. Взрослые насекомые не выползают из кокона до тех пор, пока поблизости не появится потенциальный теплокровный «хозяин», которого блоха может терпеливо поджидать до 140 дней. В состоянии куколки блохи защищены от любых воздействий, включая даже сильные инсектициды. При появлении вблизи кокона теплокровного животного блохи мгновенно освобождаются от оболочки и запрыгивают на шерсть — это происходит менее чем за секунду. Фактически в этот краткий миг их тоже невозмож-

но истребить, даже с помощью инсектицидов с резидуальным (т. е. остаточным) действием.

Какие же факторы влияют на освобождение взрослой особи из кокона? Чаще всего этот процесс инициируется повышением температуры окружающей среды, однако влияет также вибрация, повышение влажности, уровень углекислого газа в воздухе — одним словом, влияют все факторы, которые указывают на близость теплокровного потенциального «хозяина». Известны случаи, когда вибрация насадки пылесоса для чистки ковров мгновенно стимулировала освобождение из коконов личиц блох.

Взрослые особи могут жить только на кожных покровах теплокровных животных, однако после освобождения из кокона они могут выжить в течение 1–2 недель и вне хозяина. Но если блохе удалось поесть хотя бы один раз, без дальнейшего питания она не выживет и двух-трех дней. Продолжительность жизни блох — более ста дней. Взрослая особь откладывает яйца, которые осыпаются с шерсти «хозяина» на пол или на землю — таким образом, *наибольшая концентрация яиц, личинок и куколок блохи обнаруживается именно там, где домашние животные проводят больше всего времени.*

Особи женского пола нуждаются в постоянном питании, так как откладывание яиц происходит ежедневно — до 46 яиц каждый день на протяжении первой недели своей взрослой жизни, а затем до двух тысяч яиц за оставшиеся примерно сто дней. Вес яиц, отложенных блохой за день, может вдвое превысить ее собственный вес. Такая скорость воспроизводства заставляет блоху ежедневно высасывать такое количество крови «хозяина», которое в 15 раз превышает ее собственный. Неудивительно, что при интенсивной инфестации блохами щенки и котята могут даже погибать от анемии и истощения.

Зимой при низкой температуре блохи погибают, однако в некоторых защищенных местах — например, в глубине кучи листьев или в мусоре — они могут выжить. Кроме того, блохи могут пережить зиму в шерсти енотов и опоссумов (но не сохраняются в шерсти белок).

Каким же образом мы можем повлиять на популяцию этих замечательно приспособившихся к жизни паразитов? В первую очередь следует полагаться на свое усердие и старание и

лишь потом — на химические средства борьбы с блохами. Сильные инсектициды ослабляют домашних животных, делая их более уязвимыми не только для последующей инфестации блохами, но и для других болезней. Кроме того, инсектициды воздействуют и на организм человека, и на другие виды животных — не случайно их обнаруживают в конце концов и в питьевой воде, и в пище, и даже в материнском молоке. Сильнейший токсичный инсектицид ДДТ вездесущ, хотя полный запрет на его применение вышел много лет назад.

Есть два основных пути контроля популяции блох: по-первым, воздействие на взрослых насекомых, находящихся на коже животных, включая воздействие на их репродуктивную способность; во-вторых, воздействие на те стадии развития блох, которые протекают вне кожи животных, т. е. в окружающей среде, включая зоны, где животные проводят большую часть времени.

Для устранения блох на шерсти животных допустимо применять только нетоксичные препараты. Значительное уменьшение числа кожных паразитов и гибель яиц достигается при регулярном мытье животных шампунями. Обычно при такой методике даже не возникает необходимости в применении специальных шампуней от блох — достаточно подержать обычный шампунь на шерсти не смывая 10–15 минут, но затем тщательно промыть проточной водой, чтобы не возникло раздражения кожи.

Хороший эффект достигается при промывании шерсти домашних животных настоями лаванды, эвкалипта и мяты болотной. У собак можно использовать любой из этих настоев, однако для кошек настои эвкалипта и мяты токсичны, поэтому у кошек следует использовать только настой лаванды. Можно применять также настой лимона домашнего приготовления (натереть 1–2 лимона, залить литром кипящей воды и дать остыть; можно использовать для промывания шерсти животных или распределить по шерсти губкой). Хорошего результата можно добиться при применении препарата *Skin-so-Soft (Avon)* для промывания шерсти или в качестве спрея. Лучше использовать этот препарат у животных, которые постоянно живут на улице, или у животных с грубой шерстью, так как на ней остаются масляные следы. Инсектицидными свойства-

ми обладают листья грецкого ореха и кедровые опилки — ими можно посыпать места постоянного обитания животных или подстилки (например, подстилки в собачьих домиках).

Для механического удаления блох и их яиц, а также для нарушения их питания применяются специальные расчески; если у животных длинная шерсть, то сначала лучше поработать расческой с крупными зубцами, а затем воспользоваться специальной противоблошной расческой. Пойманных блох надо опускать в емкость с мыльной водой или спиртом, так как блохам с их прыгучестью ничего не стоит выскочить из емкости с простой водой.

Эффективно применение порошка водорослей *Diatomaceous earth*, которым можно аккуратно припудрить шерсть животных или посыпать в доме или во дворе те места, где в основном отмечается скопление яиц и личинок блох. Порошок водорослей поражает кишечник и дыхательные пути блох, вызывая их гибель. Для людей и животных порошок водорослей совершенно безопасен, однако все же припудривание надо проводить осторожно, не создавая «облака».

Дополнительные средства в виде пивных дрожжей или чеснока вызывают гибель блох примерно у 20–25% животных, однако у некоторых кошек и собак из-за повышенной чувствительности к этим продуктам может возникнуть диарея или высыпания на коже.

Я бы не советовал вам применять для животных ультразвуковые противоблошные ошейники, так как, во-первых, они малоэффективны и, во-вторых, их звук (90 дБ при высоте 40 кГц) слишком громок для кошек и собак. Нередко после применения таких ошейников у животных развиваются расстройства слуха и изменения поведения. Местные и пероральные средства для истребления блох достаточно эффективны, но было бы наивно думать, что они токсичны для блох и безвредны для кошек и собак — все, что токсично для одних видов животных на земле, бесспорно, оказывает токсическое влияние и на все другие виды. Мне приходилось наблюдать и лечить отравления животных после применения средств такого рода, а также неоднократно обсуждать эти вопросы с коллегами-ветеринарами. Я также не рекомендую вам применять *D-lemonene* (производное лимонной кислоты), так как это средство обла-

дает сильными токсическими свойствами, особенно для кошек — я видел случаи отравлений. Противоблошинные ошейники для кошек и собак также отличаются значительной токсичностью не только для животных, но и для всех окружающих; кроме того, они просто малоэффективны.

Самым важным мероприятием для ликвидации личинок и яиц блох вне животного, т. е. во внешней среде, является тщательная и регулярная уборка всех помещений, где бывают животные, и прилегающих к дому участков. Следует обратить особое внимание на уборку тех мест в доме, где животные проводят большую часть времени, а также на уборку пола под коврами и мебелью. Ежедневно следует проводить уборку пылесосом и еженедельно выбивать и чистить ковры. Влажная уборка, а также уборка моющим пылесосом увеличивают влажность и могут вызвать массированное освобождение блох из коконов. При наличии в доме животных влажную уборку следует завершать чисткой всех поверхностей пылесосом.

При необходимости применения инсектицидов я бы посоветовал использовать соединения, содержащие бор. Они, как правило, безвредны для человека и домашних животных, но нарушают жизненный цикл кожных паразитов. Специальные средства производятся рядом компаний (например, компания *Fleabusters*), которые дают гарантию на год. Порошок борсодержащего средства следует рассыпать тонким слоем под мебелью, коврами или на полу, оставить на 12 часов, потом провести влажную уборку. При необходимости через несколько месяцев это мероприятие можно повторить. Я ни разу не видел случаев отравления животных, однако все же лучше их удалить из этого помещения; при работе с порошком непременно следует надевать маску. Можно также порошок борсодержащего средства растворить в воде и вымыть этой взвесью пол. Максимальный эффект при применении борсодержащих средств достигается через две недели.

Порошок водорослей также можно применять в домашних помещениях, рассыпая тонким слоем по полу и под мебелью. Мне приходилось слышать, что хорошего результата можно достичь при смешивании порошка борсодержащего средства с порошком водорослей. Кроме того, свойствами инсектицида обладает пиретрин, который содержится в цветах пиретрума.

Пиретрин весьма токсичен, однако разрушается он достаточно быстро.

Конечно, регулярное проведение всех этих мероприятий – дело трудное и хлопотное, но совершенно необходимое и для вашего здоровья, и для здоровья вашего питомца. Кроме тщательной уборки в доме постарайтесь соблюдать определенные правила при и уборке вашей территории. Прежде всего следует коротко стричь газон и убирать настриженную траву граблями, не допуская образования больших куч травы и листьев. Собачьи домики и все излюбленные места ваших питомцев необходимо периодически посыпать кедровыми опилками или порошком водорослей. Некоторые компании, специализирующиеся на производстве нетоксичных средств для ухода за садом, производят также особые виды нематод – гельминтов, которые паразитируют в кишечнике блох и вызывают их гибель. Применение нематод в качестве биологических средств против паразитов во внешней среде вполне целесообразно, особенно в теплое время года, когда наблюдается пик распространения блох. Нематоды продаются в специальных магазинах для садоводов; кроме того, это средство можно заказать по каталогу «*Garden Alive*».

Кроме назначения домашним животным конституциональных средств для укрепления здоровья гомеопатия немного может предложить для того, чтобы справиться с этой нелегкой, в общем-то, проблемой. Гомеопатическое средство *Pulex irritans*, которое готовится из «человечьих» блох, по мнению некоторых гомеопатов способствует увеличению сопротивляемости инфекации. Чаще всего с инфекацией блох ассоциируется гомеопатическое средство *Sulphur*, однако, по моему мнению, это очень неконкретный подход. Некоторые гомеопаты предлагают даже использовать спрей, в состав которого входит *Sulphur 30C*, для орошения шерсти животных, но я уверен, что постоянное введение этого гомеопатического средства в организм животных и человека нецелесообразно и даже вредно. Некоторые гомеопаты рекомендуют назначать *Ledum palustre* при реакции на укусы блох, так как именно *Ledum palustre* является наилучшим гомеопатическим средством для лечения колотых ран. Некоторым животным с повышенной чувствительностью на блошиные укусы может быть полезным назначение *Caladium*.

ОТРАВЛЕНИЕ ПИЩЕЙ И ПИЩЕВЫМИ ОТБРОСАМИ

При поедании животными испорченной пищи, обсемененной большим количеством бактерий, у них может развиваться картина отравления. Бактерии содержат токсины, которые при попадании в организм животных вызывают рвоту и диарею. Как правило, именно за счет рвоты и диареи организм освобождается от токсинов, после чего и начинается процесс выздоровления. В редких случаях тяжелые отравления у животных могут закончиться смертельным исходом.

«Посещение» помоек и поедание всяческих отбросов более свойственно собакам. Обычно то, что собаки там съедают, не приносит им никакого вреда. К счастью, у собак выработался хороший способ защиты – от испорченной пищи, которая не предвещает ничего хорошего, собаки избавляются путем рвоты, просто вызывая ее волевым усилием. Тем не менее в некоторых случаях собаки тяжело страдают от различных отравлений. У кошек с их изысканным вкусом отравления встречаются гораздо реже. Кроме того, организм кошек значительно более чувствителен к токсинам по сравнению с организмом собак – поэтому кошки, как правило, даже не подходят к подозрительной пище.

При появлении сильной вялости и болей в животе собак необходимо показывать ветеринару, особенно если вы подозреваете, что несколько дней назад ваш питомец посетил-таки одно из мест, где мог съесть что-то неудобоваримое. Обычно при пищевых отравлениях организм собак очень хорошо реагирует на назначение гомеопатических лекарств, причем ответная реакция развивается достаточно быстро. Если же улучшения состояния не отмечается, то это, несомненно, веский повод для обращения в ветеринарную лечебницу. Если же вы не уверены, что причиной ухудшения состояния собаки является поедание испорченной пищи, а подозреваете отравление каким-либо иным ядом, то обращение к ветеринару тем более необходимо. Особенно опасно отравление антифризом – *если есть хоть малейшее подозрение на отравление антифризом, к ветеринару надо обращаться немедленно из-за опасности развития почечной недостаточности* (см. гл. 11 «Мочевыводящая система»,

раздел «Острая почечная недостаточность»).

При развитии симптомов отравления в первые несколько часов у животных отмечается многократная рвота, жидкий водянистый стул, отхождение обильного количества газов и боли в животе. Именно таким образом организм стремится избавиться от бактерий и токсинов, поэтому ни в коем случае не следует давать животным противорвотные или противопоносные лекарства. После урежения рвоты и диареи можно предложить воду, но только в небольшом количестве, или датьлизать кусочек льда для увлажнения слизистой оболочки ротовой полости. Если состояние вашего питомца постепенно улучшается, то можно предложить ему не воду, а *Pedialyte* (солевой раствор, восполняющий электролитный состав крови). Если вы уверены, что ваш питомец страдает именно пищевым отравлением, а не каким-либо другим заболеванием (и это подтверждает ветеринар), то можно назначить ему одно из следующих гомеопатических средств.

Arsenicum album

Arsenicum – первое средство по алфавиту и первое по эффективности при пищевых отравлениях. Почти во всех случаях лечение пищевых отравлений я начинаю именно с назначения этого препарата. Неоднократно мне приходилось назначать *Arsenicum* самому себе, друзьям и моим животным, и результаты всегда были просто удивительные. Для животных с симптомами данного лекарства характерно появление рвоты одновременно с жидким стулом и тяжелое течение заболевания – в некоторых случаях приходится даже опасаться смертельного исхода. Эти же симптомы являются ключевыми и у людей.

Carbo vegetabilis

Назначение *Carbo vegetabilis* при пищевых отравлениях также эффективно. Для данного средства характерно тяжелое течение заболевания, сильная слабость и похолодание тела, а также отхождение значительного количества зловонных газов. Часто наблюдаются мокнущие высыпания на коже, напоминающие крапивницу. Если после назначения *Carbo vegetabilis* не наступает быстрого улучшения состояния, то непременно следует обратиться в ветеринарную лечебницу.

Crotalus horridus

Для животных с симптомами этого лекарства характерна постоянная жестокая рвота, в некоторых случаях с примесью свежей крови, или рвота «кофейной гущей». При отсутствии уверенности в том, что ваш питомец страдает именно пищевым отравлением, необходима помощь ветеринара, особенно при появлении этих симптомов. Если же вы уверены в диагнозе, то попробуйте назначить *Crotalus horridus* – однако при отсутствии улучшения не окладывайте посещение ветеринарной лечебницы.

Nux vomica

Назначение данного средства полезно при интоксикации любой этиологии, в том числе и при пищевых отравлениях. О *Nux vomica* следует подумать в тех случаях, когда типичные симптомы отравления сочетаются с выраженным беспокойством и раздражительностью. Характерным симптомом являются тенезмы при дефекации, причем тенезмы отмечаются даже после полного опорожнения прямой кишки, а также рвотные движения, иногда безрезультатные. Подобное состояние может развиваться после поедания животными излишне жирной пищи.

Veratrum album

Картина симптомов данного средства во многом напоминает картину *Arsenicum*, однако течение заболевания более тяжелое. Характерна постоянная тошнота и многократная рвота на фоне слабости и похолодания тела. Обычно не бывает усиленного образования кишечных газов, как, например, при симптомах *Carbo vegetabilis*. Если после назначения *Arsenicum* быстрого улучшения состояния не отмечается, то целесообразно назначить *Veratrum album*.

ГОРЕ

От потерь животные страдают точно в такой же степени, как и люди. Особенно часто животные испытывают горе в случае смерти кого-либо из членов семьи, где они живут, или при смерти других животных, проживающих вместе с ними в том

же доме. Кроме того, животные могут страдать от горя при отъезде кого-то из членов семьи — например, когда дети уезжают учиться в другой город или обзаводятся собственной семьей и своим домом. Кроме того, животные очень тяжело переживают разводы или другие, не менее серьезные ситуации, меняющие жизнь семьи, где они живут. Наиболее эффективным гомеопатическим средством при горе и его последствиях является *Ignatia*. Это средство не блокирует проявления горя, однако обладает способностью облегчить ту тяжелую ношу, которая ложится на душу животных после перенесенной потери, позволяет принять потерю и смириться с произошедшими изменениями в их жизни. Кроме того, назначение *Ignatia* полезно в тех случаях, когда животные страдали от горя в прошлом и не смогли смириться с потерями. При заболеваниях вследствие перенесенного горя назначаются также и другие гомеопатические препараты (например, *Natrum muriaticum* или *Phosphoricum acidum*), однако лечение заболеваний подобного рода — прерогатива опытного врача-гомеопата. Достаточно часто как у людей, так и у животных отмечается внезапное появление хронических болезней, основная причина которых кроется в перенесенном горе. Мне приходилось несколько раз наблюдать, как в подобной ситуации у животных развивается, например, сахарный диабет.

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Эти заболевания слишком опасные и сложные для самостоятельного лечения, однако мне бы хотелось дать некоторые рекомендации по применению ряда дополнительных лекарств и фитопрепаратов. Для диагностики и лечения заболеваний сердца у животных необходимо обращаться в ветеринарную лечебницу. Гомеопатическое лечение, несомненно, эффективно во многих случаях, однако оно должно проводиться только специалистами.

При кардиомиопатии у собак целесообразно назначение аминокислоты L-карнитина, суточная доза составляет 125 мг на 25 фунтов веса животных. У кошек при подобном заболевании целесообразно назначение L-таурина (125 мг ежедневно). В

первые две недели лечения как у кошек, так и у собак суточную дозу можно удвоить. Особенно полезно назначение этих аминокислот при дилатационной кардиомиопатии с нарушением сократительной функции сердца. В некоторых случаях таурин и карнитин можно назначать и без учета видовой специфичности. Таурин также полезен при нарушениях сердечного ритма.

На сократительную функцию миокарда оказывает положительное влияние назначение коэнзима Q10 (*Coenzyme Q10*), который можно назначать всем животным с заболеваниями сердца, причем назначение этого лекарства в виде капсул (на масляной основе, наподобие витамина E) более эффективно, чем в виде таблеток. Суточная доза коэнзима Q10 на масляной основе составляет 1 мг/фунт веса животных, а в виде таблеток – 2 мг/фунт. Из других достаточно эффективных лекарственных средств применяется витамин E (суточная доза 5–10 мг/фунт веса), лецитин (четверть чайной ложки на 10 фунтов веса в сутки) и германий (*Germanium*) в дозе 1–2 мг/фунт веса животных в сутки. Необходимо назначать животным также и ненасыщенные жирные кислоты либо в виде масла семян льна (четверть чайной ложки на 10 фунтов веса животных в сутки), либо масла бурачника лекарственного (*Borage oil*; 125 мг/10–25 фунтов веса в сутки), либо масла примулы вечерней в той же дозе, что и масло бурачника лекарственного.

Для улучшения деятельности сердца животным можно назначать также настойку боярышника (из которого готовится гомеопатическое средство *Crataegus*) по 5 капель на 10 фунтов веса животных 2–3 раза в день, однако предварительно лучше посоветоваться с фитотерапевтом, особенно если вашему питомцу назначены препараты дигиталиса. Можно также назначать животным настойку одуванчика, которая обладает легким диуретическим действием и помогает справиться с отеками вследствие нарушения деятельности сердца. Настойку одуванчика можно использовать вместо лазикса (*Lasix*) и других синтетических диуретиков. Обычно официальная настойка одуванчика назначается в дозе 5 капель 2–3 раза в день. Помимо официальной настойки можно приготовить настой одуванчика (1 чайная ложка сухого сырья на 1 стакан воды; сухое сырье залить кипятком, остудить и процедить).

ДИРОФИЛЯРИОЗ

Это тяжелое заболевание, которым страдают в основном собаки (и очень редко кошки; однако производители ветеринарных фармацевтических препаратов утверждают обратное). Это заболевание можно лечить с помощью гомеопатических средств, но только по назначениям опытного гомеопата.

Для предупреждения развития дирофиляриоза у собак применяются современные высокоэффективные лекарства. Однако применять эти препараты у кошек нецелесообразно из-за редкости заболевания. У собак профилактику дирофиляриоза следует проводить каждые 6 недель (или 7–8 недель). Профилактические лекарства вызывают гибель тех личинок москитов, которые внедрились в кровеносную систему за предыдущие 6–8 недель, однако не спасают от возможности будущего заражения. Таким образом, правильнее всего назначить собакам профилактические лекарства примерно через 6 недель после появления первых москитов, затем давать их каждые 6–7 недель в течение всего «москитного» сезона и последнюю дозу лекарств дать через 6 недель после исчезновения москитов. Ежедневная профилактика дирофиляриоза в настоящее время почти не применяется, однако в некоторых случаях вполне допустимо применение профилактических препаратов через день.

Современные лекарства для профилактики дирофиляриоза обычно безопасны, однако у собак с повышенной чувствительностью к ним не исключено возникновение аутоиммунных заболеваний, чаще всего заболеваний щитовидной железы (см. раздел «Заболевания щитовидной железы» в данной главе). Для предотвращения побочного действия профилактических лекарств широко применяется нозод, приготовленный из личинок филярий. Эффективность нозода как профилактической меры против заражения филяриями – вопрос спорный. Мне приходилось наблюдать эффективное использование нозода в эндемичных районах, где у животных, которым проводилась нозодотерапия, почти не было случаев заражения. Однако мне доподлинно известны также случаи заражения животных дирофиляриозом на фоне применения нозода. По моему мнению, нозод может лишь в некоторых случаях предохранить животных от заражения. Возможно, мы пока просто не знаем особен-

ности его действия и применения. Обычно я рекомендую применять нозод в разведении 30С 1 раз в две недели, но я далеко не уверен в его протективных свойствах. Если вы приняли решение назначить вашему питомцу нозод для профилактики заражения филяриями, то следует учесть, что в общем мы пока немного знаем о механизме его воздействия.

КРОВОТЕЧЕНИЕ

При возникновении кровотечения любой локализации прежде всего необходимо выяснить его причину. Спонтанное кровотечение обычно свидетельствует о нарушении процесса свертывания крови вследствие отравления (например, ядами для уничтожения грызунов), аутоиммунной тромбоцитопении или дефицита факторов свертывания крови. У человека наиболее известными заболеваниями, связанными с дефицитом факторов свертывания крови, являются гемофилия и болезнь Виллебрандта-Юргенса; эти заболевания имеют наследственный характер. В некоторых случаях повышенная кровоточивость может быть связана с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы (при этом виде заболеваний клетки иммунной системы атакуют ткани и органы собственного организма).

Кровотечение также может возникать как следствие травматических повреждений, при некоторых инфекционных заболеваниях, при абсцессах, после применения некоторых лекарственных препаратов и после вакцинации. В большинстве подобных случаев причина очевидна, и, следовательно, лечить такие заболевания и осложнения проще. Вакцинация во многих случаях усиливает склонность организма к кровотечениям за счет угнетения продукции ряда факторов свертывания крови, однако у большинства вакцинированных животных это проходит незамеченным, если только вакцинация по времени не совпадет с каким-либо травматическим повреждением. Повышенная склонность к кровотечениям после вакцинации наблюдается обычно в течение двух недель, поэтому в этот период не следует планировать у вашего питомца какие-либо хирургические вмешательства или стоматологические манипуляции (до того как принять решение о проведении прививок у вашего

питомца, я рекомендую прочесть гл. 16 «Вакцинация»).

Гомеопатические средства, которые рассматриваются в данном разделе, предназначены в качестве дополнения к основному лечению. Если у вашего питомца неожиданно появились признаки кровотечения (из какого-либо естественного отверстия организма или же в области подкожной клетчатки), то следует немедленно обратиться в ветеринарную лечебницу. Во многих случаях гомеопатическое лечение при кровотечениях бывает успешным, однако прежде необходимо установить причину такого состояния. Если же кровотечение у вашей кошки или собаки явилось следствием хронического заболевания, то я рекомендовал бы вам самостоятельно не лечить вашего питомца и непременно обратиться к профессиональному гомеопату.

Для нормального процесса свертывания крови необходимы ионы кальция и витамин К, которые организм должен получать с пищей в достаточном количестве. Витамин К и кальций содержат свежие овощи и люцерна. Хорошим источником ингредиентов, необходимых для нормального процесса свертывания крови, является свежая печень — именно в печени вырабатывается большинство белковых факторов свертывающей системы. Если у вашего питомца отмечается склонность к кровоточивости, то обратите внимание на то, чтобы в его пище в необходимом количестве содержались соответствующие витамины и кальций.

Чрезвычайно эффективно для остановки острого кровотечения любой этиологии, включая посттравматические кровотечения, китайское средство под названием *Yunnan raiyao*, которое можно приобрести в фитоаптеках и магазинах, специализирующихся на китайских и азиатских продуктах питания. Это средство можно применять как перорально, так и местно. Собакам крупных пород весом более 25 фунтов следует давать по 1–2 капсулы этого лекарства (в зависимости от тяжести кровотечения) 2–3, а при необходимости и 4 раза в день. Собакам мелких пород и кошкам можно назначать по четверти или половине капсулы на один прием также 2–3 раза в день. Кроме того, при сильных кровотечениях целесообразно применять специальные капсулы *safety pill*, которые представляют собой также китайские средства растительного происхождения. Это средство назначается животным только в экстренных случаях и в течение короткого времени. Более длительное применение

данного лекарства возможно только по назначению специалиста-фитотерапевта.

При кровотечениях может быть полезным назначение одного из следующих средств.

Aconitum napellus

Aconitum применяется когда кровотечение у животных сочетается с тревожностью. Животные с симптомами данного средства обычно очень беспокойны и взволнованы.

Arnica montana

Данное средство особенно эффективно при посттравматических кровотечениях. Именно *Arnica* следует назначать животным сразу же после получения травмы, так как это лекарство не только способствует остановке кровотечения, но и предупреждает развитие инфекции и абсцессов.

Crotalus horridus

Данное лекарство эффективно при кровотечениях вследствие нарушения свертывания крови или тяжелых инфекций. В подобных случаях необходима консультация ветеринара, однако применение данного препарата как дополнения к лечению вполне оправданно. Для *Crotalus horridus* характерно истечение жидкой крови темного цвета без признаков тромбообразования или с замедленным минимальным тромбообразованием. У данного средства отмечается тропность к правосторонним поражениям.

Erigeron

Назначение лекарства особенно эффективно при кровотечении из матки и мочевого пузыря, однако его можно назначать также при примеси крови в рвотных и каловых массах. Характерным симптомом данного средства является усиление кровотечения при любом движении.

Ferrum phosphoricum

Это лекарство эффективно у ослабленных животных при кровотечении на фоне лихорадки (см. раздел «Лихорадка и инфекции»).

Hamamelis

Показания к назначению *Hamamelis* напоминают показания *Arnica*; назначается в случаях кровотечения после травмы при отсутствии эффекта от применения *Arnica*.

Lachesis

Данное средство, как и *Crotalus horridus*, готовится из яда змей. Назначение *Lachesis* показано при нарушении свертывания крови; дозу этого лекарства можно дать животным до оказания ветеринарной помощи. Характерно профузное кровотечение с излитием жидкой крови темного цвета, причем кожа вокруг естественного отверстия, через которое изливается кровь, может быть темно-синего или почти черного цвета. Типично либо левостороннее поражение, либо перемещение симптомов слева направо.

Millefolium

Препарат эффективен при кровотечениях вследствие травматического повреждения или огромном физическом напряжении, причем кровь обычно ярко-красного цвета (при симптомах *Arnica* и *Hamamelis* кровь никогда не бывает такой яркой). Мне кажется, что мы недооцениваем *Millefolium* как кровоостанавливающее средство. Применение его эффективно также после хирургических вмешательств.

Phosphorus

Одно из главных средств при кровотечениях. Если нет специальных показаний, то именно его можно назначать в первую очередь при появлении признаков кровотечения. Характерно истечение крови ярко-красного цвета. *Phosphorus* является средством выбора при кровотечениях в послеоперационном периоде.

ПОВЫШЕННАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Отклонения в поведении животных в настоящее время встречаются так же часто, как и отклонения в поведении людей. Создается впечатление, что агрессивность, жестокость,

неадекватная сверхактивность и другие формы девиантного поведения просто заполонили наш мир. Мы с коллегами часто обсуждаем эту проблему; мы склонны думать, что в настоящее время у многих домашних животных выявляются расстройства психоэмоциональной сферы в виде повышенной двигательной активности и нарушения внимания. Нам пока непонятна причина этого типа расстройств, однако если учесть, что подобные отклонения проявляются одновременно у разных видов животных (в том числе и у человека), это уже нельзя расценивать как простое совпадение.

Возможно, все дело в одновременном влиянии массы различных факторов внешней среды на организм, способствующих появлению такого типа расстройств. Один из главных факторов, по моему мнению, — вредоносное влияние разного рода электромагнитных полей на деятельность нервной системы. Я уверен, что не менее разрушительное влияние оказывают частые необдуманные вакцинации животных; это предположение находит свое подтверждение в книге Харриса Култера «*Vaccination, Social Violence and Criminality*»¹. Кроме того, мне приходилось слышать о некоей связи между проявлениями девиантного поведения и широким распространением стоматологических пломбировочных материалов на основе ртутных сплавов; я недостаточно знаком с этой проблемой, однако имеются очевидные свидетельства токсического влияния ртутных сплавов на деятельность ряда органов и систем. Можно с полной уверенностью утверждать только одно: в наше время все живые существа испытывают одновременное воздействие такого огромного числа раздражителей и токсических веществ, что практически невозможно идентифицировать влияние на организм одного отдельно взятого фактора. Это вовсе не означает, что мы не должны заботиться о безопасности всех живых существ — напротив, необходимо приложить все силы для контроля за применением различных химикатов и за токсическими выбросами разного типа, загрязняющими окружающую среду. Влияние совокупности этих факторов на организм намного страшнее, чем мы ранее предполагали. Неисчислимые страдания принесли людям различные виды ионизирующего излучения, в полной безвредности которого были абсолютно уверены исследователи начала прошлого века. Сейчас многие,

недооценивая опасность, не принимают всерьез разговоры о необходимости решительного ограничения загрязнений окружающей среды. Не обернется ли свойственная нам беспечность страданиями наших потомков?

Независимо от причины расстройства психоэмоциональной сферы в виде повышенной двигательной активности у животных — реально существующий факт. Лечение этих нарушений вполне возможно с помощью холистических методов², в том числе с помощью гомеопатических средств. Однако это лечение слишком сложное, чтобы его проводить в домашних условиях. Одним из мероприятий общего характера может стать прекращение необоснованной вакцинации животных, изменение питания и условий жизни животных с патологией такого рода. Более полную информацию см. в гл. 16 «Вакцинация».

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

Все животные с нарушением функции печени должны, безусловно, находиться под постоянным наблюдением ветеринара несмотря на то, что традиционная медицина в общем немного может предложить для лечения этой патологии. Я бы порекомендовал лечить их с помощью методов холистической медицины, в том числе с помощью гомеопатических средств. Однако заболевания печени у животных слишком сложны для самостоятельного гомеопатического лечения — в этих случаях требуется профессиональный гомеопат. В этом разделе рассматриваются некоторые лекарственные препараты, которые можно применять в качестве дополнений к основному лечению, а также гомеопатические средства, назначение которых также может принести определенную пользу; однако эти лекарства не заменяют наблюдения ветеринара.

Патология печени чаще наблюдаются у собак, однако кошки, несомненно, также подвержены этим заболеваниям. У кошек чаще отмечается жировая дистрофия печени; ее возникновение связано с особенностями диеты, которая предлагается кошкам с патологией мочевыводящей системы. К огромному сожалению, у собак чаще наблюдается хроническое воспаление печени. Обычно это заболевание традиционные ветерина-

ры называют хроническим активным гепатитом, считая, что в основе его лежит хроническое воспаление печени, на фоне которого периодически возникают вспышки процесса, напоминающие острое воспаление печени. Это представление вполне соответствует взглядам традиционных врачей-аллопатов, согласно которым острые и хронические симптомы по сути своей – проявления различных стадий одной и той же болезни.

Некоторые случаи воспаления печени, как и многие заболевания других органов и систем, имеют аутоиммунный характер. При аутоиммунных заболеваниях клетки иммунной системы «нападают» на ткани и органы собственного организма, что приводит обычно к тяжелым последствиям. Пусковым моментом в развитии аутоиммунных заболеваний являются многочисленные токсические воздействия факторов внешней среды, в том числе применение сильнодействующих лекарств, влияние вредных химических соединений, находящихся в почве (например, пестицидов), влияние токсических выбросов в атмосферу, вакцинация и т. п. По моему мнению, подобные факторы провоцируют развитие большинства болезней печени как у собак, так и у кошек. Мне неоднократно приходилось наблюдать случаи резкой активизации воспалительного процесса в печени через пару месяцев после вакцинации. Особенно опасна вакцинация при уже имеющихся заболеваниях печени. Утверждения сторонников традиционной ветеринарии о безвредности вакцин (и, следовательно, о возможности их применения у нездоровых животных) лишены всяких оснований. Более того – эти утверждения вредны, так как неизбежно приводят к усилению страданий больных животных.

Сильнейшее токсическое влияние на печень оказывают пестициды, в частности, фосфорорганические и хлорорганические соединения, которые используются для ликвидации кожных паразитов на шерсти животных и обработки помещений. В состав этих соединений входят такие ядовитые компоненты, как диазинон, хлорпирифос, фентион и т. п. Кроме того, токсическим влиянием на печень обладают такие распространенные лекарственные средства, как кортикостероиды, даже при их применении в обычных лечебных дозах.

На активность воспалительного процесса в печени указывает повышение уровня некоторых печеночных ферментов в пе-

риферической крови, в частности аланинаминотрансферазы (ALT), алкалинфосфатазы (ALP), гамма-глутамилтрансферазы (GGT), аспартатаминотрансферазы (AST), а также повышение уровня билирубина. Повышение уровня ALT и AST указывает на преимущественное поражение печеночных клеток; повышение уровня ALP и GGT чаще отмечается при патологии желчевыводящих путей. Уровень билирубина может повышаться при патологии печеночной ткани, при обструкции желчевыводящих путей, а также при разрушении эритроцитов периферической крови.

Все эти показатели обычно определяются в процессе диагностики заболеваний печени у животных. При значительном повышении в крови уровня билирубина возникает так называемая желтуха – изменение физиологической окраски десен и кожи, которые приобретают разные оттенки желтого цвета. Обычно желтуха свидетельствует о глубоком нарушении функции печени; в некоторых случаях желтуха обусловлена массивным разрушением эритроцитов.

Все животные с заболеваниями печени должны находиться под постоянным наблюдением ветеринара. На фоне основного лечения животных можно применять некоторые дополнительные лекарства, а также ряд гомеопатических средств. Обычно я использую небольшие дозы этих лекарств, так как, несмотря на их положительное воздействие на печеночную ткань, для их утилизации все же требуются определенные «усилия» со стороны клеток печени. Не следует также пользоваться большими дозами обычных лекарств, если это специально не оговорено ветеринаром; в подобной ситуации «больше» – не означает «лучше». Это правило особенно важно соблюдать при применении у животных с патологией печени ниацина (один из витаминов группы В), который в больших дозах обладает гепатотоксическим действием.

Одно из наиболее известных растительных средств-гепатопротекторов – это сок чертополоха и его активный компонент силимарин (*Silymarin*). Мне приходилось слышать рассказы о том, что именно с помощью этого растительного средства удавалось спасти людей, отравившихся смертельно ядовитыми грибами. При назначении сока чертополоха животным лучше всего руководствоваться инструкциями по применению его у

людей. Доза зависит от веса животных: у кошек обычно применяется восьмая часть «человеческой» дозы, у собак весом до 25 фунтов – восьмая или четвертая часть дозы, у собак весом 25–75 фунтов – половина дозы, а собакам весом более 75 фунтов – полная «человеческая» доза.

Сильным гепатопротектором является пищевая добавка *Turmeric*, обладающая специфическим антиоксидантным действием. Кошкам в пищу можно добавлять щепотку этого лекарства дважды в день, а собакам – по четверти чайной ложки на каждые 25 фунтов веса, также дважды в день. Антиоксидантным действием обладает *витамин E* (5 мг/фунт, 1 раз в день) и *витамин C* (5 мг/фунт 2–3 раза в день). Мощным антиоксидантным действием обладает также супероксид дисмутаза (*Superoxide dismutase*), который применяется в таблетках по 2000 МЕ. Доза зависит от веса животных (обычно 1 таблетка на 10–15 фунтов веса животных; суточную дозу можно разделить на 2–3 приема). Антиоксидантным и иммунопротективным действием обладает коэнзим Q10 (*Coenzyme Q10*); суточная доза этого лекарства составляет 1 мг/фунт веса животных. Всем животным с заболеваниями печени необходимы витамины группы B (10 мг комплексного препарата на 20–25 фунтов веса ежедневно; кошкам и собакам весом меньше 25 фунтов – по 10 мг ежедневно). Полезно также назначение холина (*Choline*) в дозе примерно 1 мг/фунт веса ежедневно.

Хороший эффект можно получить при назначении комплекса аминокислот, состоящего из L-метионина, L-цистеина, L-глутатиона, L-аргинина и L-карнитина (каждый препарат можно назначать и отдельно). Основные аминокислоты уменьшают нагрузку на печеночные клетки по расщеплению белков и элиминации ряда побочных продуктов; кроме того, аминокислоты ускоряют процесс излечения. В некоторых случаях полезно использование смесей аминокислот, которые применяются спортсменами в бодибилдинге для наращивания мышечной массы (до применения у животных этой смеси следует внимательно прочитать инструкцию; использовать можно только те смеси, в составе которых нет консервантов и синтетических заменителей). Аминокислота L-цистеин назначается: кошкам и собакам малого веса – один раз в день 12,5 мг, собакам среднего веса – один раз в день 25 мг, собакам большо-

го веса — один раз в день 50 мг. Другие аминокислоты назначаются один раз в день по 125 мг — 500 мг в зависимости от веса животных.

При жировой дистрофии печени у животных особенно полезным является назначение L-метионина, L-аргинина и L-карнитина. Кроме того, этим животным необходим лецитин, который принимает активное участие в жировом обмене (суточная доза лецитина составляет четверть или половину чайной ложки на 10 фунтов веса животных). Всем животным следует добавлять в пищу свежие овощи, которые обладают детоксицирующим действием и являются источником натуральных витаминов.

Гомеопатические средства, описанные в этом разделе, могут назначаться в сочетании с другими видами лечения. Эти лекарства не заменяют подобное гомеопатическое конституциональное средство, однако иногда мне приходилось назначать низкие потенции данных препаратов вместе с конституциональным средством. Конечно, это выходит за рамки классической гомеопатии, но в некоторых случаях я видел определенную пользу такого назначения, причем органоспецифические средства не мешали действию конституционального препарата. При назначении органоспецифических средств ментальные симптомы имеют меньшее значение, чем при назначении конституциональных средств. Органоспецифические средства применяются обычно в низких потенциях (3X, 6X, 3C или 6C) 1–2 раза в день в течение примерно 2–8 недель.

Carduus marianus

Данное средство готовится из сока чертополоха (см. выше). Мне приходилось применять это лекарство у тех животных с заболеваниями печени, которые по какой-либо причине не переносят фитопрепараты. В некоторых случаях может быть рвота желчью, при обострении воспалительного процесса могут случиться сильные спазмы и коликообразные боли в животе.

Chelidonium majus

Chelidonium является наиболее известным органоспецифическим средством при заболеваниях печени. Назначение этого препарата эффективно при желтухе. Животные с симптомами *Chelidonium* часто злобные (в китайской медицине гнев и злоба

– эмоции, связанные с печенью) и непослушные. Как правило, они стремятся быть «лидерами». Характер этих животных становится мягче при применении горячих ванн, горячих аппликаций или горячего питья. Если *Chelidonium* применяется в качестве органоспецифического, а не конституционального лекарства, то у животных может и не быть особых ментальных симптомов. Если же ментальные и общие симптомы у животных указывают на *Chelidonium*, то, как правило, при его назначении отмечается очень хороший эффект.

Cholesterinum

Данное средство готовится из холестерина. Его назначение особенно эффективно при обструкции желчевыводящих путей и жировой дистрофии печени, однако может быть полезным и при других заболеваниях печени. У животных с симптомами этого препарата часто перед обострением заболевания наблюдается продукция обильного количества мочи.

НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ВАШЕГО ДОМА

Прежде чем принести домой щенка или котенка, вам необходимо сделать одну очень важную вещь – реально оценить свои возможности. Сможете ли вы сделать так, чтобы ваш дом стал уютным и комфортным для его нового обитателя? Достаточно ли у вас свободного времени для ухода за вашим питомцем, для кормления, общения и прогулок? Если вы хотите взять щенка крупной породы, то сможете ли вы подолгу гулять с ним – ведь крупные собаки нуждаются в особом режиме, с длительными прогулками и значительной физической нагрузкой? Достаточно ли простора в вашем доме или квартире, чтобы ему хватало места для игр? Не получится ли так, что ваш питомец будет проводить в одиночестве целые дни в запертой квартире, без внимания, ласки, общения и развлечений?

Многие заболевания возникают у животных вследствие психоэмоционального стресса, который они неизбежно испытывают, если большую часть своей жизни проводят в замкнутом пространстве квартиры в полном одиночестве. Если у вас нет возможности создать для нового обитателя вашего дома соот-

ветствующую благоприятную в эмоциональном плане обстановку, он непременно будет болеть. Из этого правила практически не бывает исключений. Как-то раз я пришел к своим друзьям, которые жили в многоквартирном большом доме, и услышал жалобное мяуканье котенка за соседней дверью — этот плач не прекращался в течение всего того времени, что я провел в гостях. Видимо, хозяева квартиры давно ушли из дома, оставив его в одиночестве. Это навело меня на грустные мысли — сколько же одиноких, печальных и лишенных внимания и ласки существ томится в недрах каменного города! Это отношение к животным несправедливо — они так же хотят любви, ласки и общения, как хотим все мы. Я уверен, что не следует брать в дом живое существо, если у вас не будет времени для общения с ним. Однако, чем больше вы будете общаться с вашей кошкой или собакой, тем ярче и насыщеннее будет ваша собственная жизнь, озаренная бескорыстной и нежной любовью вашего питомца. В течение многих лет я не устаю восхищаться их преданностью и умению осчастливить нашу жизнь.

Хотя бы по этой причине вам может прийти в голову мысль взять в семью кошку или собаку, однако ваши дети должны быть уже достаточно взрослыми, чтобы понять, как к ним правильно относиться. Маленькие дети часто бывают грубыми и могут случайно травмировать животных. Дети в возрасте 3–5 лет, по моему убеждению, еще слишком малы, чтобы общаться с домашними животными без родительского надзора. Если вы хотите взять в семью щенка или котенка для того, чтобы воспитать у вашего ребенка благородство и чувство ответственности за тех, кто живет рядом с ним, — подождите, пока ему не исполнится 8–10 лет. Как правило, дети в этом возрасте уже хорошо понимают, как надо обращаться с животными, чтобы не причинить им вреда.

Для маленького котенка и щенка смена обстановки и отрыв от матери являются тяжелым потрясением, настоящим психоэмоциональным стрессом. Смягчить этот стресс помогает фитопрепарат *Rescue Remedy*; фитопрепарат грецкого ореха *Walnut* поможет пережить новому обитателю вашего дома первые, самые тяжелые для него дни. Самое главное, чтобы щенок или котенок чувствовали вашу любовь и внимание, чтобы благодаря вашей заботе у них появилось ощущение защищеннос-

ти. Процесс приспособления животных к новой обстановке обычно занимает несколько недель — это время важно и для него, и для вас. Хорошее начало вашего общего пути является залогом длинной и счастливой жизни ваших питомцев.

Основные факторы, от которых в значительной степени зависит здоровье вашего питомца — это полноценное питание и отсутствие стрессов. На мой взгляд, полноценной пищей для животных можно назвать только сбалансированную пищу домашнего приготовления. Если у вас нет возможности готовить еду вашему питомцу дома, то постарайтесь покупать только самые лучшие консервированные корма, которые только можете найти, и дополняйте его рацион «пищей со стола». Некоторые важные пищевые ингредиенты содержатся только в домашней пище и утрачиваются в процессе термической или иной обработки продуктов при приготовлении консервов. Но самое плохое состоит в том, что в процессе обработки разрушается и жизненная сила пищи. В настоящее время кое-где продаются свежемороженые продукты для животных — это хороший выход для тех, у кого просто нет возможности готовить еду животным в домашних условиях (см. гл. 8 «Система пищеварения»).

Отсутствие стрессов у животных подразумевает как отсутствие психоэмоциональных потрясений, так и минимизацию вредных воздействий окружающей среды, включая разнообразные физические, химические и другие виды токсических воздействий. О необходимости психоэмоционального комфорта для нормальной жизни животных мы уже говорили. Кроме того, необходимо избавить вашего питомца от пищи, в составе которой имеются красители и различные консерванты, от избытка аллопатических лекарств и химических средств. Тяжелейший стресс в организме животных может вызвать необдуманная вакцинация. Проведение вакцинации оправданно только в тех случаях, когда организм животных предрасположен к какому-либо заболеванию, что в общем происходит достаточно редко. Во всех остальных случаях риск и последствия вакцинации значительно опаснее, чем риск предполагаемого заболевания. Вакцинация животных раннего возраста совершенно бесполезна, так как дополнительной защиты от болезней она не обеспечивает. Проведение вакцинации от бешенства регламентируется законом, согласно которому антирабичес-

кая вакцина должна вводиться животным один раз в три года; однако такой режим вакцинации обусловлен скорее социальными причинами, чем медицинскими показаниями. Прежде чем вы решите сделать серию прививок вашему питомцу, я советую вам прочесть главу 16 «Вакцинация», где приводится подробная информация по данному вопросу.

Более подробную информацию о кормлении животных домашней пищей и ее приготовлении вы можете найти в книге д-ра Питкерна (*Dr. R. Pitcairn*), в книге Аниты Фрейзер (*A. Frazier*) и в книге Хелен МакКиннон (*H. McKinnon*) – см. главу «Дополнение».

ПЕРЕГРЕВАНИЕ (СОЛНЕЧНЫЙ УДАР)

Перегревание у животных встречается достаточно редко, только в случаях длительного пребывания на солнце в состоянии утомления или полного расслабления, а также при длительном нахождении в жарком замкнутом пространстве, например в закрытом автомобиле. Конечно, никогда не следует оставлять животных в припаркованной на солнечной стороне машине, так как даже при открытых окнах температура внутри салона поднимается очень быстро. В подобных условиях так же быстро поднимается температура тела животных, и необратимое поражение нервной системы (или даже смерть животных от перегревания) может наступить в считанные минуты. Перегревание у собак может также наступить во время длительной прогулки по жаре, особенно в условиях влажного климата и при отсутствии адаптации к подобным климатическим условиям.

У кошек и собак отсутствует потоотделение – важный защитный механизм организма человека и, например, лошади, который препятствует перегреванию. Кошки и собаки при первых признаках перегревания начинают усиленно и часто дышать через рот для активизации теплоотдачи. Кроме того, теплоотдача усиливается за счет притока крови к кожным покровам и слизистым оболочкам – именно поэтому при перегревании у животных отмечается ярко-красный цвет слизистых оболочек и кожи. Если снижения температуры тела не происходит, то у животных начинается головокружение и тошнота,

а также быстро развивается слабость. Дальнейшее повышение температуры тела приводит к нарушению деятельности нервной системы и поражению центра терморегуляции, что представляет собой реальную угрозу жизни животных. При поражении центра терморегуляции кожные покровы становятся холодными и приобретают бледный оттенок, быстро развивается бессознательное состояние.

При развитии признаков перегрева животным необходима экстренная помощь. Необратимое поражение головного мозга может произойти за считанные минуты, поэтому на месте следует принять срочные меры для снижения температуры тела и охлаждения кожных покровов вашего питомца. Самое эффективное из всего, что вы можете сделать, – это облить животное холодной водой или погрузить по шею в холодную воду. Не следует пользоваться водой со льдом или очень холодной водой – из-за этого состояние вашего питомца может ухудшиться. Во-первых, слишком холодная вода может вызвать генерализованный спазм капилляров кожи, и в этом случае вам не удастся быстро снизить температуру тела. Во-вторых, при погружении в слишком холодную воду у пострадавшего животного может начаться мышечная дрожь, которая также препятствует теплоотдаче. Особенно опасна ситуация, когда мышечная дрожь сочетается с генерализованным спазмом капилляров кожи.

Следующие гомеопатические средства помогут вашему питомцу справиться с возможными последствиями перегрева.

Aconitum napellus

У животных с симптомами данного средства отмечаются выраженные беспокойство, тревога и страх. Появляются признаки венозного полнокровия головного мозга в виде головной боли и тошноты. В некоторых случаях у животных *Aconitum* при перегревании начинается носовое кровотечение. Эффективно назначение данного лекарства при первых признаках перегрева.

Belladonna

Состояние *Belladonna* значительно тяжелее, чем состояние *Aconitum*, в связи с чем отмечается больше соматических изме-

нений. Уши и десны у пораженных животных обычно ярко-красного цвета, зрачки могут быть расширены. У собак явно выражено психомоторное возбуждение. Беспокойство у животных данного типа намного сильнее, чем у животных с симптомами *Aconitum*.

Gelsemium

Характерным симптомом данного средства является слабость. У животных *Gelsemium* отмечается выраженная слабость, из-за которой возникает мышечная дрожь, и головокружение; в целом их состояние близко к коллапсу. Типичный симптом, указывающий на истощение организма вследствие перегревания, — чередование приливов крови к коже и вслед за этим ее быстрое похолодание.

Glonoinum

Это классическое гомеопатическое средство при перегревании. При этом характерны толчкообразная головная боль, слабость, раздражительность и судорожное сжатие челюстей. Цвет ушей и десен быстро меняется от ярко-красного до бледного с синюшным оттенком. Отмечается также сильнейшее сердцебиение.

Natrum carbonicum

У животных с симптомами данного препарата отмечается конституциональная неприязнь к пребыванию на солнце, в результате чего у них развивается сильнейшая слабость и переутомление. Назначать данное средство следует животным с повышенной чувствительностью к перегреванию на солнце, а не тем, у кого действительно развивается симптоматика перегревания.

Selenium

Данный микроэлемент необходим для адекватных мышечных сокращений. Таким образом, гомеопатическое средство *Selenium* назначается при выраженной слабости и упадке сил, которое нарастает при воздействии тепла. Подобно *Natrum carbonicum* данное средство применяется при повышенной чувствительности животных к перегреванию. Назначение

Selenium чаще показано старым животным.

Veratrum viride

Данное лекарство, как и *Glonoinum*, назначается при тяжелом состоянии животных, вызванном перегреванием. Именно о назначении *Veratrum viride* и *Glonoinum* следует подумать прежде всего, если у вашего питомца наблюдаются симптомы сильного «солнечного удара», однако назначение *Belladonna* тоже может оказаться полезным (но не спутайте *Veratrum viride* и *Veratrum album*!). У животных с симптомами данного средства отмечаются выраженные мышечные подергивания, часто в сочетании со рвотой, и быстрое нарастание слабости вплоть до коллапса.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Хирургические вмешательства являются небезразличным для организма инвазивным методом лечения, однако при некоторых заболеваниях оперативное лечение необходимо. Гомеопатические средства помогают облегчить состояние животных в отдельные наиболее тяжелые периоды хирургического лечения и ускорить выздоровление.

Время до планового оперативного лечения (за исключением экстренных операций) необходимо использовать для укрепления общего состояния здоровья вашего питомца и усиления функции иммунной системы. С этой целью примерно за неделю до операции следует назначить вашему питомцу усиленные дозы витаминов А, Е, С и В. *Витамин С* назначается в дозе 10 мг/фунт веса животных дважды в день, *витамин Е* — 5–10 мг/фунт веса 1 раз в день, *витамин А* — 75–100 МЕ/фунт веса и *витамины группы В* — 10–15 мг/на 10–25 фунтов веса животных (ежедневная доза). Эти же дозы витаминов необходимо назначать животным в течение одной-двух недель после оперативного вмешательства.

В предоперационном периоде полезно назначение и других антиоксидантов — супероксида дисмутазы (*Superoxide dismutase*) и коэнзима Q10 (*Coenzyme Q10*). Супероксид дисмутаза назначается в дозе 2000 МЕ (или 125 мг — 1 таблетка) на

10–20 фунтов веса животных; это дневная доза, которую можно разделить на два-три приема. Дневная доза коэнзима Q10 составляет 1 мг/фунт веса животных.

Непосредственно перед операцией и сразу же после нее следует дать животным *Arnica 30C* или *Rescue Remedy*. Эти средства можно заранее смешать в одном флаконе, снабженном счетчиком капель. При составлении этой смеси следует к 5–7 каплям *Rescue Remedy* добавить несколько шариков *Arnica 30C* и 10–15 мл кипяченой охлажденной воды. Если ветеринар, который прооперировал вашего питомца, не будет возражать, то можно попросить его влить несколько капель этой смеси в рот пациента сразу после окончания операции, т. е. после наложения последнего шва или повязки. В идеальном варианте ваш питомец должен получать смесь *Rescue Remedy* и *Arnica 30C* в течение нескольких дней после операции, причем в первый день – каждые два часа по несколько капель, а в последующие дни количество приемов можно постепенно уменьшить. Назначение данной смеси помогает облегчить боли после операции и минимизировать операционный стресс. Кроме того, в пред- и послеоперационном периоде полезно назначение *Passiflora incarnata 3X* или *6X*, обладающей успокаивающим действием. Если назначение *Arnica* недостаточно эффективно уменьшает боли, то можно вместо нее назначить *Hamamelis* или *Bellis perennis*, действие которых во многом сходно с действием *Arnica*.

Ускорить выздоровление после оперативного вмешательства помогает *Phosphorus*, особенно если у вашего питомца после общей анестезии развилась сильная слабость. В некоторых случаях можно чередовать *Phosphorus* и *Arnica*. Если выраженная слабость сохраняется долгое время после операции и процесс выздоровления затягивается, то полезно назначение *Aceticum acidum*. Если в послеоперационном периоде возникло кровотечение, то на фоне обычных в таких случаях хирургических манипуляций по остановке кровотечения полезно назначить животным *Phosphorus* или, при отсутствии эффекта, *Millefolium*.

Местно для ускорения заживления послеоперационной раны можно применять *Calendula* в виде геля или мази. Если в области раны отмечается выраженная болезненность, то целесообразно назначение *Staphysagria*.

Применение гомеопатических лекарств при ортопедо-травматологических вмешательствах описано в гл. 12 «Костно-мышечная система», раздел «Первая помощь при переломах костей».

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Лечение заболеваний щитовидной железы, как и заболеваний печени и сердца, несомненно, следует доверить только профессиональному ветеринару-гомеопату, так как во всех этих случаях состояние животных может быть достаточно тяжелым и представлять собой непосредственную угрозу для жизни.

Щитовидная железа состоит из двух долей и располагается в области шеи впереди от трахеи. В щитовидной железе вырабатываются гормоны, которые непосредственно влияют на обменные процессы в организме. Состояние, при котором продукция гормонов щитовидной железы уменьшается, называется гипотиреоз (гипотиреозидизм); основными симптомами гипотиреоза у животных являются избыточный вес, вялость, зябкость и часто плохое состояние шерсти. Гипотиреоз характерен для собак и крайне редко наблюдается у кошек. В настоящее время гипотиреоз у собак встречается несравнимо чаще, чем двадцать лет назад, когда я только начинал работать ветеринаром. Гипертиреоз (гипертиреозидизм) характеризуется повышением продукции гормонов щитовидной железы и гораздо чаще наблюдается у кошек по сравнению с собаками. При гипертиреозе скорость обменных процессов повышается, что проявляется в виде чувства постоянного голода (все животные с гипертиреозом с жадностью набрасываются на пищу) и потери веса, так как пища необычайно быстро продвигается по кишечнику и питательные вещества просто не успевают в достаточном количестве поступить в кровь. Животные с симптомами гипертиреоза склонны к беспокойству и повышенной активности; обычно у них отмечается избыток внутреннего тепла. Двадцать лет назад, когда я закончил ветеринарный институт, случаи гипертиреоза у животных были казуистикой.

При всех заболеваниях щитовидной железы, особенно при гипотиреозе у собак, необычайно важным фактором является

полноценное питание, причем наиболее полезна пища, приготовленная в домашних условиях. Животным с гипотиреозом полезны некоторые пищевые добавки, например морские водоросли. В составе морских водорослей содержится масса необходимых микроэлементов, в том числе йод, без которого невозможен синтез гормонов щитовидной железы. Обычно ежедневно назначается по одной таблетке этого препарата на 10 фунтов веса животных. Синтез гормонов щитовидной железы происходит на основе аминокислоты L-тирозина; считается, что одной из причин гипотиреоза у людей является дефицит именно этой аминокислоты. Животным с гипотиреозом необходимо назначать 125 мг L-тирозина на 25 фунтов веса 1–2 раза в день.

Обычно животным с целью заместительной терапии при гипотиреозе назначаются синтетические аналоги гормонов щитовидной железы, однако в их составе содержится только одна из двух форм гормона (Т-4). В подобных случаях лучше использовать препараты, приготовленные из щитовидной железы убойного скота, так как в составе этих препаратов содержатся все формы гормонов щитовидной железы, что способствует более сбалансированному лечению. По мнению большинства ветеринаров, гормональные препараты из щитовидной железы убойного скота действуют гораздо эффективнее синтетических аналогов. При лечении моих пациентов с гипотиреозом я всегда назначаю именно такие гормональные средства. Кроме того, целесообразно назначать несколько меньшую дозу, чем та, которая получается при расчетах. В этом заключается определенный здравый смысл — дело в том, что при полном замещении гормонов щитовидной железы в организме угнетается синтез тиреотропного гормона гипофиза (тиреотропный гормон гипофиза стимулирует продукцию гормонов щитовидной железы). При отсутствии тиреотропного гормона синтез даже минимальных количеств собственных гормонов щитовидной железы прекращается. Таким образом, функция собственной щитовидной железы у собак с гипотиреозом при полностью адекватной заместительной терапии практически сводится к нулю. При введении же минимальных доз симптомы гипотиреоза у собак уменьшаются, однако полной депрессии функции щитовидной железы не происходит. Гипотиреоз у собак редко имеет тяжелое течение, однако иногда от-

мечается склонность к кровотечениям. В большинстве случаев некоторая неадекватность замещения гормонов щитовидной железы безопасна и даже полезна.

Гипертиреоз у кошек имеет обычно более тяжелое течение и трудно поддается коррекции и лечению. Применение пищевых добавок редко бывает эффективным. Очень важным фактором является полноценное питание, а для улучшения усвоения питательных веществ у многих кошек целесообразно назначение ферментных препаратов. Некоторые ветеринары рекомендуют добавки из морских водорослей, несмотря на высокий уровень гормонов щитовидной железы в крови. Способностью несколько снижать продукцию гормонов щитовидной железы обладают овощи семейства *Brassica*, к которым относятся брокколи, цветная капуста, листовая капуста, брюссельская капуста и т. п. Если вам удастся заставить или уговорить кошку с гипертиреозом употреблять такую пищу, то это, несомненно, принесет определенную пользу. Не все кошки привередливы – например, у меня раньше жил кот, который с неизменным удовольствием ел брокколи.

При лечении гипертиреоза в рамках традиционной медицины предлагаются три основных направления лечения этого заболевания. Первый вариант заключается в воздействии на щитовидную железу особых лекарственных препаратов, которые разрушают ткань железы и тем самым способствуют уменьшению продукции собственных гормонов. По моему мнению, это наиболее грубый и малоэффективный метод; кроме того, эти препараты оказывают выраженное токсическое влияние на печень и почки. Я бы не рекомендовал вам выбирать этот путь «лечения» вашего питомца. Второй вариант – это хирургическое лечение, при котором удаляется одна или обе доли щитовидной железы с последующей заместительной гормональной терапией. При уменьшении массы щитовидной железы синтез гормонов снижается (или полностью прекращается при удалении всей массы щитовидной железы). Обычно поражается только одна доля железы, однако большинство хирургов рекомендуют удалять обе доли из-за высокой вероятности рецидива заболевания. В этих случаях требуется полное замещение количества гормонов. Кроме того, при радикальной операции удаляются также и паращитовидные железы, отсутствие кото-

рых вовсе не безразлично для организма. Основная функция паращитовидных желез заключается в синтезе гормона, который контролирует уровень кальция в организме; последствия удаления паращитовидных желез очень тяжелые. Если для лечения вашего питомца вы предпочитаете хирургический метод, то я бы порекомендовал вам оперативное лечение и удаление одной пораженной доли щитовидной железы. При таком методе оперативного лечения можно избежать послеоперационных осложнений, а с помощью гомеопатического метода лечения и других холистических методов минимизировать вероятность рецидивов. Многие мои коллеги предпочитают именно такую тактику лечения. Третий вариант – лечение радиоактивным йодом, при котором радиоактивные изотопы йода проникают в ткань щитовидной железы и разрушают ее, тем самым синтез гормонов щитовидной железы сокращается. Сторонникам традиционной медицины этот подход кажется очень эффективным. Я бы не рекомендовал вам выбирать такой метод лечения кошек из-за возможности отдаленных (и тяжелых) последствий радиотерапии. Изотопы йода, которые используются при этом методе лечения, обладают высокой степенью радиоактивности. Справедливости ради должен отметить, что некоторые из моих клиентов выбрали для своих питомцев именно такой метод лечения и довольны полученными результатами. Однако мне приходилось наблюдать и тяжелые осложнения после радиотерапии.

Если бы мне пришлось лечить гипертиреоз у кого-либо из своих питомцев, то прежде всего я бы применил холистические методы лечения, в частности гомеопатический метод. Эти методы лечения безопасны и в некоторых случаях эффективны. Однако если бы я не получил хороших результатов, то дальше выбрал бы хирургическое удаление пораженной доли щитовидной железы, но на фоне продолжения лечения гомеопатическими средствами.

Заболевания щитовидной железы, как правило, имеют аутоиммунный характер. При этом типе болезни клетки иммунной системы атакуют ткани и органы собственного организма, что приводит к тяжелым нарушениям. Значительное число заболеваний щитовидной железы у животных является отражением общего роста аутоиммунных заболеваний по сравнению, на-

пример, с периодом двадцатилетней давности. На возникновение патологии щитовидной железы оказывает несомненное влияние вакцинация и необоснованное применение сильнодействующих лекарств. Исследования показывают³, что ежегодная профилактика дирофиляриоза у животных провоцирует возникновение аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Я всегда рекомендую применять вакцинацию и сильнодействующие лекарства только по очень строгим показаниям; вакцинация у животных с заболеваниями щитовидной железы всегда рискованна (см. гл. 16 «Вакцинация»).

ВАКЦИНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

В этом разделе рассматриваются только те реакции организма, которые возникают в течение первого-второго дня после введения вакцины. До того как вы приняли решение провести вакцинацию вашего питомца, я настоятельно рекомендую вам прочесть главу 16 «Вакцинация», где содержится основная информация по данному вопросу.

Наиболее распространенной вакцинальной реакцией у животных является отек морды, особенно вокруг глаз, высыпания по типу крапивницы, дыхательные нарушения, лихорадка, рвота, диарея, приступы дрожи и слабость. Практически всегда отмечаются и нарушения поведения животных в виде приступов страха и эпизодов агрессии. Реже после вакцинации отмечаются осложнения в виде судорожных припадков и паралича конечностей.

Если подобные осложнения появились у вашего питомца, то непременно обратитесь к тому ветеринару, который назначил вакцинацию. При быстром развитии отека и дыхательных расстройств (обычно нарушения дыхания развиваются вслед за отеком) требуется немедленное обращение в ветеринарную лечебницу (см. также раздел «Аллергические реакции»). При развитии иных ответных реакций возможно попытаться лечить вашего питомца самостоятельно. Осмотр ветеринара необходим также в тех случаях, когда длительность судорожных припадков после вакцинации составляет более нескольких минут или они возникают несколько раз в день. Одно из гомеопатических средств, которое может быть полезно при таких реакциях, — это *Calcarea carbonica* (см. главу 16 «Вакцинация»).

тических средств, описанных в данном разделе, поможет вам справиться с вакцинальной реакцией. Однако если вы не видите благоприятной ответной реакции на прием гомеопатического лекарства, то следует обратиться в ветеринарную лечебницу. Обычно вакцинальные реакции требуют длительного лечения, поэтому при возможности я бы порекомендовал вам обратиться к ветеринару-гомеопату.

Aconitum napellus

Назначение *Aconitum* обычно эффективно на ранних стадиях воспалительной реакции. Чаще всего показанием для данного средства является лихорадка в сочетании с тревожностью, страхом и выраженным беспокойством животных. Назначение *Aconitum* может быть эффективным при вакцинальных реакциях в виде судорожных припадков.

Apis mellifica

Если после вакцинации у животных развивается отек морды, то именно о назначении *Apis* следует подумать в первую очередь. Кроме того, это средство эффективно при диарее, связанной с вакцинацией, особенно если животные при диарее не испытывают жажды (как правило, понос у животных сочетается с жаждой).

Antimonium tartaricum

Данное средство также эффективно при диарее, возникшей в связи с вакцинацией. Кроме того, возможно назначение *Antimonium tartaricum* при поствакцинальных дыхательных нарушениях, однако чаще всего при расстройствах дыхания такого типа назначается *Thuja occidentalis*.

Arsenicum album

Назначение *Arsenicum album* также может быть эффективным при развитии поствакцинальных дыхательных нарушений, диареи и рвоты. Характерный симптом данного препарата — чувство страха, которое появляется после вакцинации. Обычно подобный симптом указывает именно на *Arsenicum album*. Кроме того, назначение этого средства полезно при болях в области спины, которые появились после вакцинации.

Belladonna

Назначение данного лекарства особенно эффективно при судорожных припадках, которые появились после вакцинации. Животные с симптомами *Belladonna* обычно чрезвычайно беспокойны и возбуждены, может отмечаться расширение зрачков. Возможно появление эпизодов агрессивного поведения. Благоприятная ответная реакция на назначение *Belladonna* отмечается у тех животных, которые часто подвергаются вакцинации. Кроме того, назначение данного средства помогает при выраженной лихорадочной реакции.

Pyrogenium

Назначение *Pyrogenium* эффективно при постоянной лихорадке, которая появилась после вакцинации, особенно если она сочетается с болями в спине. Иногда *Pyrogenium* назначается после вакцинации «по привычке» и чаще всего необоснованно — см. описание *Thuja occidentalis*.

Silicea (Silica)

Назначение данного средства помогает при поствакцинальной диарее, особенно если животные слабые, хрупкого телосложения, с повышенной чувствительностью к шуму и расчесыванию шерсти. В некоторых случаях *Silicea* помогает справиться с судорожными припадками.

Thuja occidentalis

Thuja является наилучшим средством (наряду с *Silicea*) при развитии неблагоприятных реакций после вакцинации. Назначение данного лекарства полезно при развитии таких осложнений, как расстройства дыхания с астматическим компонентом, воспаление оболочек глаза, диарея, нарушение мочеиспускания, парез или паралич задних конечностей. Кроме того, *Thuja* назначается в тех случаях, когда вакцинация считается причиной возникновения хронических болезней. Многие ветеринары формально подходят к применению данного препарата после вакцинации, наивно полагая, что надо провести вакцинацию, а уж *Thuja* (или другое гомеопатическое средство) ликвидирует все ее негативные стороны. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, стараться избегать всевозможных при-

вивок у животных и проводить только те, которые требуются законом.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ У ЖИВОТНЫХ

Принято считать, что животные и гельминты — понятия неразделимые, практически синонимичные; на бытовом уровне эта тема обросла огромным количеством мифов и страхов. У кошек и собак встречаются четыре основных класса гельминтов: круглые гельминты, анкилостомы, ленточные и плоские. Влажный жаркий климат юго-востока США делает эту местность наиболее благоприятной для распространения кишечных паразитов.

По данным исследований Центра по контролю за заболеваниями США, проведенными несколько лет назад, круглые гельминты обнаруживаются у 90–95% щенков независимо от того, была ли выявлена гельминтная инфекация у матери в период беременности. Можно сказать, что собаки сосуществуют с гельминтами (надо полагать, что и кошки, однако в меньшей степени). Личинки гельминтов могут находиться долгое время на коже молочных желез матери, а затем с молоком попадать в кишечник щенка. Период созревания круглых гельминтов составляет примерно три недели; таким образом, уже в возрасте трех-четырех недель у щенков возможна выраженная инвазия. По данным того же Центра по контролю за заболеваниями, организм большинства щенков самостоятельно справляется с гельминтной инвазией к подростковому возрасту. В некоторых случаях, однако, интенсивность инвазии настолько высока, что вызывает заболевания и даже смерть щенков. Это, однако, более характерно для инвазии анкилостомами.

Заражение щенков анкилостомами происходит таким же образом, как и круглыми гельминтами. Цикл развития анкилостом также составляет три недели. В некоторых случаях встречается одновременное паразитирование круглых гельминтов и анкилостом. Для организма щенков и котят инвазия анкилостомами особенно опасна, так как эти кишечные паразиты внедряются в кишечную стенку, питаются кровью «хозяина». При интенсивной инвазии у маленьких щенков и котят возникает

выраженная анемия, быстро приводящая к смерти. В отличие от анкилостом круглые гельминты в основном конкурируют с организмом «хозяина» за питательные вещества, поэтому истощение развивается намного медленнее. Обычно у щенков с инвазией круглыми гельминтами большой живот; они выглядят запущенными и неопрятными. Длина взрослых экземпляров круглых гельминтов около 2–3 дюймов, ширина 1/16 дюйма и чуть больше; тело несколько заостренное с обоих концов. Анкилостомы же настолько мелкие, что их практически невозможно рассмотреть невооруженным глазом.

Многие ветеринары для предупреждения заболеваний у щенков считают необходимым проведение дегельминтизации в возрасте трех–четырех недель. Обычно я сдержанно отношусь к любому шаблонному применению лекарственных препаратов, однако в данном случае этот метод имеет свои положительные стороны. Дело в том, что диагностика гельминтоза основана на обнаружении в фекалиях яиц взрослых экземпляров при помощи флотационного теста; однако до своего полного созревания гельминты могут нанести здоровью щенков и котят большой (иногда непоправимый) вред. Такое вряд ли возможно при хорошем состоянии здоровья и правильном питании матери и щенка; однако у слабых щенков интенсивная инвазия может вызвать быстрое ухудшение состояния и смерть. Гельминты, как и большинство «захватчиков», предпочитают слабого хозяина, чтобы ничто не препятствовало их размножению.

Если общее состояние здоровья вашего щенка или котенка не совсем хорошее (или если вы живете на юго-востоке страны), то целесообразно в возрасте трех–четырех недель провести дегельминтизацию пирантелом (*Pyrantel pamoate*; другое название – *Nemex* или *Evict*). У животных более старшего возраста не следует рутинно подходить к дегельминтизации; проведение этого мероприятия должно зависеть от результата флотационного теста фекалий, т. е. от определенных показаний. Если же вы решили не проводить рутинную дегельминтизацию щенка или котенка, то советую вам особенно внимательно наблюдать за их здоровьем в возрасте трех–восьми недель, так как именно в этот период жизни наиболее вероятна интенсивная инвазия гельминтами с развитием анемии и исто-

щения. Настоятельно советую вам периодически проводить анализы кала ваших питомцев на яйца гельминтов и при необходимости непременно провести дегельминтизацию.

Инвазия плоскими гельминтами чаще встречается на юго-востоке США. В отличие от круглых гельминтов и анкилостом, цикл развития этих паразитов составляет в среднем три месяца. В основном инвазия плоскими гельминтами отмечается у собак молодого возраста и нередко приводит к выраженным нарушениям функции кишечника и развитию заболеваний. Диагностика проводится флотационным методом; при обнаружении яиц плоских гельминтов дегельминтизация обязательна.

Инвазия ленточными гельминтами у собак — явление достаточно распространенное, однако тяжелые нарушения состояния здоровья наблюдаются нечасто, несмотря на неприглядный внешний вид животных. Отдельные сегменты ленточных гельминтов можно увидеть на шерсти животных в области анального отверстия, на подстилке или даже на диване или кресле, где только что спал ваш питомец. Эти сегменты обычно длиной до полудюйма и шириной до одной восьмой дюйма, плоские и обладают способностью самопроизвольных движений в виде сокращений. В высохшем состоянии они напоминают зерна риса.

На территории США у кошек и собак встречаются два основных типа ленточных гельминтов или лентецов. Первый тип — *Dipylidium caninum* — часто называется «блошиный лентец», так как блохи, съедая яйца этих гельминтов, становятся промежуточным хозяином. Собаки заражаются при проглатывании инфицированных блох. Таким образом, для профилактики этого типа гельминтоза необходимы мероприятия по ликвидации популяции блох у животных. Другие типы ленточных гельминтов — *Taenia* и *Echinococcus*, которыми собаки заражаются при поедании мяса инфицированных промежуточных хозяев (домашних и диких животных). У собак охотничьих пород возможны случаи реинфектации. Дегельминтизация необходима при обнаружении сегментов ленточных гельминтов; с профилактической целью дегельминтизация не проводится. Современные антигельминтные средства против лентецов достаточно эффективны и безопасны, однако мне приходилось не-

сколько раз слышать об осложнениях дегельминтизации.

Постоянная или повторная гельминтная инвазия (кроме ленточных гельминтов) у собак и кошек старше двух лет является признаком хронического заболевания; в подобных случаях целесообразно обращение к ветеринару-гомеопату для назначения конституционального лечения. Конституциональное гомеопатическое лечение взрослых домашних животных во многих случаях эффективно; однако на основании моего опыта могу сказать, что у щенков и котят гомеопатия обычно не приносит желаемых результатов. Возможно, что гельминтная инвазия в этом возрасте в какой-то степени оправдана природой, так как способствует стимуляции иммунной системы. Именно поэтому я советую минимальное антигельминтное лечение у щенков или котят, но за исключением тех случаев, когда гельминтоз вызывает выраженные нарушения здоровья. Как показывают исследования Центра по контролю за заболеваниями США, большинство животных своими силами справляется с гельминтозами, и лекарственная помощь необходима лишь тем, у кого высока интенсивность инфекации. В этих случаях у животных вполне целесообразно использование не только специальных антигельминтных препаратов, но и всех возможных методов укрепления здоровья, включая гомеопатию и полноценное питание.

При инфекации ленточными гельминтами конституциональное лечение не является необходимым, возможно, из-за редкости случаев каких-либо осложнений. Примерно у 50% животных с гельминтозами отмечается благоприятная реакция на назначение гомеопатического средства *Granatum*, который я обычно назначаю в низких потенциях (3X, 6X, 3C, 6C) два раза в день в течение пяти дней. При реинфекации желательно провести повторную дегельминтизацию. Хороший дегельминтизирующий эффект отмечается при добавлении в пищу чеснока. Фитопрепарат *Gentle Dragon* также обладает способностью уменьшать гельминтную инвазию за счет своего очищающего воздействия на кишечник (производители этого средства не сообщают о таком действии, однако в действительности *Gentle Dragon* помогает уменьшить интенсивность гельминтной инвазии всех типов кишечных паразитов).

Острицы – весьма распространенный тип инвазии у детей –

не поражают ни кошек, ни собак; однако родители иногда ошибочно считают домашних животных виновниками этого типа инвазии у своих детей.

ВАКЦИНАЦИЯ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

Вакцинация

Вакцины – простой вопрос, на который сложно ответить
Зачем проводить ежегодную вакцинацию, если в этом нет необходимости?

Вакцинация должна предупредить заболевание, не так ли?

Может ли вакцинация стать причиной заболевания?

Вакцинация: замена острого заболевания хроническим

Каким же образом вакцинация может стать причиной заболевания?

Вакцинация и ее влияние на головной мозг

Как применить полученную информацию на практике

Какие вакцины следует применять, если бы все же решились проводить вакцинацию домашних животных?

ВАКЦИНЫ – ПРОСТОЙ ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ СЛОЖНО ОТВЕТИТЬ

В настоящее время показания к вакцинации подвергаются серьезному сомнению. По общему мнению и ветеринаров-холистиков, и традиционных ветеринаров, и ветеринаров-иммунологов, значение вакцинации чрезмерно преувеличено. Предметом острых обсуждений является также быстрый рост рынка вакцин; не исключено, что в данном вопросе не последнюю роль играют доходы ветеринаров и фирм-производителей вакцин. Таким образом, вопрос о вакцинации не только спорный, он связан с целым рядом проблем этического характера. Однако лично мне этот вопрос не кажется спорным; по крайней мере внутри гомеопатического сообщества по поводу вакцинации существует единая точка зрения. Понимая, насколько эта тема щекотлива для ветеринаров, я все же решил поделиться некоторыми своими соображениями и наблюдениями.

В процессе обучения ветеринарии нам подробно излагали теорию вакцинации. Для того чтобы предупредить возникновение инфекционного заболевания, необходимо ввести в организм микробы, лишенные своих болезнетворных свойств, и вызвать тем самым иммунную ответную реакцию. Теоретически, конечно, это не лишено здравого смысла, так как с помощью вакцинации можно было бы предупредить развитие острых болезней. Нас учили, что именно за счет вакцинации удалось предотвратить распространение некоторых опасных инфекций. У домашних животных, например, с начала 50-х годов с помощью вакцинации удалось значительно уменьшить число случаев бешенства и распространение вируса кошачьей и собачьей чумы (чума у кошек у собак вызывается разными вирусами); удалось также приостановить развитие эпидемии вирусного ринотрахеита у кошек в конце 60-х годов. Именно за счет вакцинации уменьшилась смертность животных в раннем возрасте, когда они наиболее подвержены воздействию инфекционных агентов. Наши профессора, чьим словам мы, конечно же, полностью доверяли, говорили нам об увеличении продолжительности жизни домашних животных и об укреплении их здоровья благодаря тому, что «владельцы домашних животных вовремя сделали им все необходимые прививки». Кроме

того, мы действительно верили, что вакцинация приносит огромную пользу как домашним животным, так и человеку, так как вследствие вакцинации резко уменьшается распространение трансмиссивных болезней – бешенства и лошадиного энцефалита. Пионеры вакцинации – Дженнер и Пастер – подарили людям и животным возможность жить, не опасаясь некоторых страшных инфекционных заболеваний.

Однако нам почему-то не объяснили причину, по которой Пастер в конце жизни отрекся от большинства своих теорий и пришел к странному на первый взгляд выводу: «Микроб – ничто; все определяет среда его обитания». Нам также не объяснили, почему успехи Пастера в профилактике бешенства были далеко не так значительны, как это первоначально утверждалось.

Почти сразу же после окончания института мне пришлось стать свидетелем эпидемии парвовирусной инфекции у собак, которая вспыхнула в конце 70-х годов. Я убедился, что введение вакцины действительно уменьшает заболеваемость парвовирусной инфекцией. (Парвовирусная инфекция поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает состояние иммуносупрессии. Основными симптомами этой патологии являются рвота и диарея. Смертность от этого заболевания действительно очень высокая.) Как же мне было не стать сторонником вакцинации, которая помогала сохранить жизнь тысячам собак? Я своими глазами видел, что невакцинированные животные заражались парвовирусной инфекцией и в некоторых случаях чумой. Я также видел, что вакцинированные животные были здоровее, чем их невакцинированные собратья. Однако по прошествии некоторого времени я стал отмечать, что все больше вакцинированных собак заражались «парво», причем у многих из них болезнь развивалась почти сразу же после вакцинации. Создавалось впечатление, что причиной парвовирусной инфекции была в некоторых случаях именно вакцинация – по крайней мере вакцинация явно повышала восприимчивость организма к данному вирусу.

Я помню, что у одного из моих клиентов, который занимался разведением хаски, заболели все собаки несмотря на точное соблюдение всех сроков и правил прививок. Он связался с двумя компаниями, производящими вакцины. Представители компаний предположили, что заболевания собак после вакци-

нации были связаны с более ранним ее началом (в возрасте четырех недель, а не восьми недель) и с более частой вакцинацией (каждую неделю вместо положенного четырехнедельного интервала). Однако заболевания собак продолжались до тех пор, пока мой клиент не стал использовать «убитую» вакцину вместо живой модифицированной. Когда я сообщил производителям вакцин о своем подозрении, что виновником заболевания была живая вакцина, мне вежливо ответили, что этого просто не может быть.

Появление вакцины против вируса кошачьей лейкемии (примерно в то же самое время) ветеринарное сообщество восприняло с огромным воодушевлением. Мы надеялись, что с помощью вакцины у кошек удастся предотвратить это страшное заболевание (вирус кошачьей лейкемии подобен вирусу иммунодефицита у человека). Однако с самого начала использования этой вакцины появилась масса проблем. Вакцина, о которой говорили как о самой надежной и безопасной, не только не предотвращала развитие заболевания, но и вызывала массу тяжелых побочных реакций. Мне приходилось наблюдать (и иногда я наблюдаю это даже сейчас), как у совершенно здоровых кошек, у которых отсутствие вируса подтверждалось лабораторными данными, через короткое время после вакцинации начиналось заболевание — как будто именно вакцинация инициировала возникновение вирусной лейкемии. Однако производители вакцины настаивали, что и этого просто не может быть, «потому что это невозможно».

При независимом исследовании, однако, оказалось, что на самом деле эффективность этой вакцины составляет всего 17% вместо 50–70%, о которой сообщали ее производители¹⁻³. Частота побочных реакций и их тяжесть также оказались намного выше, чем предполагалось на основании официальных сообщений. Например, в одном из исследований сообщалось, что 32% вакцинированных кошек умерли в течение 24 месяцев после вакцинации именно от вирусной кошачьей лейкемии. В контрольной группе кошек смертность составила 43%, однако этим кошкам в качестве плацебо вводили убитую антирабическую вакцину. Через какое-то время после введения вакцин кошек обеих групп поместили вместе с кошками, больными вирусной кошачьей лейкемией, чтобы определить эффективность

вакцинации. Однако выяснилось, что разницу показателей смертности в обеих группах нельзя считать статистически достоверной⁴⁻⁵. Выявился также интересный факт – в контрольной группе (т. е. в группе, вакцинированной антирабической вакциной) две трети умерших кошек были инфицированы вирусом кошачьей лейкемии, тогда как в основной группе (т. е. в группе, вакцинированной специфической вакциной) только одна треть умерших кошек была инфицирована этим вирусом. У всех на языке вертелся вполне закономерный вопрос: «А почему, собственно говоря, отмечалась такая большая смертность у неинфицированных кошек обеих групп? Не связано ли это с введением вакцин?»

Коронавирусная инфекция у собак появилась примерно в то же время, что и парвовирусная инфекция. Я хорошо помню, что из-за вспышек этих заболеваний создавалась буквально угрожающая ситуация. Парвовирусная инфекция у собак протекала очень агрессивно, причем отмечалась огромная смертность. Коронавирусная инфекция у собак протекала значительно мягче, часто ограничиваясь всего несколькими днями диареи. Я, помню, сильно удивился, когда появилась вакцина именно против коронавируса. По сообщениям ее производителей, а чуть позже и по сообщениям некоторых ветеринаров, в других регионах и других странах коронавирус вызвал настоящую эпидемию среди собак, причем заболевание якобы «протекало хуже, чем парвовирусная инфекция» и сопровождалась «большей смертностью, чем от парвовируса». Те же ветеринары предлагали различные методы дифференциальной диагностики этих заболеваний. Меня эта ситуация сильно озадачила – я не наблюдал настолько агрессивных проявлений коронавирусной инфекции. Может быть, я ошибался с диагнозом? Может быть, за короткий промежуток времени коронавирусная инфекция настолько видоизменилась?

В течение нескольких месяцев я многократно отсылал образцы сыворотки больных животных в вирусологическую лабораторию на исследование. По сообщениям моих коллег-ветеринаров, случаи смертельной коронавирусной инфекции множились день ото дня – однако я ни разу не получил серологического подтверждения этого заболевания. Ни единого случая коронавирусной инфекции! После анализа всей массы литературы

по поводу коронавирусной инфекции выявилась одна интересная деталь – все публикации о «смертельно опасном коронавирусе» исходили из одного источника, а именно из фирмы, которая производила данный вид вакцины. Чуть позже несколько компаний объявили, что в продажу скоро поступит тест-система для диагностики как парвовирусной, так и коронавирусной инфекции. Я немедленно отослал заявку на получение этой тест-системы, однако после получения соответствующего набора оказалось, что в нем отсутствует тест для диагностики коронавируса. Представитель компании по производству тест-систем объяснил мне, что после нескольких месяцев исследований им так и не удалось выделить коронавирус, а без образца вируса получить тест, естественно, просто невозможно. Вся эта ситуация продолжала оставаться более чем странной.

Интересные данные мне сообщил директор лаборатории, куда я на протяжении нескольких месяцев отсылал образцы сывороток больных животных. Как оказалось, положительные результаты исследований на наличие коронавируса вообще бывали в его практике чрезвычайно редко – в основном у маленьких щенков, у которых вместе с коронавирусом выявлялся и парвовирус. Он также сказал, что при электронной микроскопии фекалий определить коронавирус практически невозможно, так как по внешнему виду он почти не отличается от парвовируса. Сам собой напрашивался вопрос: почему же в лаборатории университета для идентификации коронавируса пользовались неточной электронной микроскопией, вместо того чтобы проводить точные серологические исследования? Оказалось, что ни в одной из лабораторий просто не было ни единого образца коронавируса, чтобы создать серологический тест. Таким образом, отчаянная борьба, которую наши доктора ветеринарных наук вели с коронавирусом, в целом напоминала эпизод из бессмертного творения Сервантеса, где Дон Кихот сражается с ветряными мельницами. Позднее многие мои коллеги стали относиться к вакцине против коронавируса как к «вакцине, которая ищет свою болезнь».

Кстати, через несколько лет та же компания выпустила вакцину против болезни Лайма – редкого заболевания у собак, которая ограничивается несколькими регионами страны, где обитает особый вид клещей–переносчиков этих бактерий. Эта

вакцина оказалась малоэффективной и вызывала массу побочных реакций, причем симптомы вакцинальной реакции в большинстве случаев практически не отличались от симптомов собственно болезни Лайма. К сожалению, ветеринары иногда рекомендуют применять эту вакцину даже в тех регионах, где специфический вид клещей-переносчиков не обитает, — т. е. там, где даже и речи быть не может о заражении собак.

В результате всех этих удивительных историй моя вера в производителей вакцин сильно пошатнулась. Обиднее всего, что пошатнулась также и моя вера в правильность действий моих коллег-ветеринаров.

Меня одолевали сомнения относительно правильности рекомендаций производителей вакцин и даже Американской ассоциации ветеринаров (*American Veterinary Medical Association*). Наиболее сильные возражения у меня вызывала ежегодная ревакцинация (бустерная ревакцинация). На самом деле ежегодная ревакцинация во многом лишена здравого смысла. За исключением вирусной кошачьей лейкемии, остальные заболевания, при которых требовалась ежегодная ревакцинация, просто не возникали у животных старше одного года — эти заболевания наблюдались только у щенков и котят, т. е. в течение первого года жизни. Вакцина же против вирусной кошачьей лейкемии вообще казалась малоэффективной. Кстати, мой врач почему-то не приглашал меня на ежегодную ревакцинацию. А разве животные так уж отличаются от нас?

Чем больше я обдумывал этот достаточно спорный вопрос, тем больше я убеждался, что ежегодная ревакцинация не приносит домашним животным никакой пользы. Мои коллеги чрезвычайно разгневались, когда узнали, что я перестал назначать своим клиентам проведение очередной серии прививок их домашним животным. Своих единомышленников я нашел в Американской ассоциации холистической ветеринарии (*American Holistic Veterinary Medical Association*) среди ветеринаров-гомеопатов. Кроме того, оказалось, что некоторые традиционные ветеринары также сомневаются в необходимости ежегодной ревакцинации домашних животных. В журнале *Current Veterinary Therapy XI* за 1992 г. я нашел статью, написанную Томом Филлипсом (*Tom Phillips, DVM; Scripps Institute*) и Роном Шульцем (*Ron Schultz, Ph.D.; University of*

Wisconsin-Madison School of Veterinary Medicine) и посвященную вопросам вакцинации кошек и собак. Привожу цитату из этой статьи:

«Ежегодная ревакцинация животных представляет собой метод, который применяется уже в течение многих лет, *однако не имеет какой-либо научной ценности или научного подтверждения*. Почти во всех случаях ежегодная ревакцинация не имеет иммунологического обоснования. Иммунитет против вирусов сохраняется у животных в течение многих лет, иногда в течение всей жизни. Успешная иммунизация против большинства бактериальных агентов также сохраняется в иммунологической памяти организма в течение длительного времени, таким образом, при воздействии бактериального агента развивается вторичная иммунная реакция, которая обеспечивает адекватную защиту организма... Ревакцинация большинством противовирусных вакцин не приводит к дальнейшей стимуляции иммунного ответа за счет вмешательства уже имеющихся антител. По нашему мнению, практика ежегодной ревакцинации должна быть пересмотрена, за исключением тех случаев, когда это требуется для оценки некоторых аспектов состояния животных или когда ревакцинация положена по закону (например, в соответствии с законами некоторых штатов ежегодно требуется проводить ревакцинацию против бешенства)»⁶ (*курсив автора*).

Таким образом, ежегодная ревакцинация признается бесполезной, т.к. не способствует укреплению иммунитета животных. Ежегодная ревакцинация необходима либо в соответствии с законом (как, например, ревакцинация против бешенства), либо при проведении некоторых исследований состояния животных. Или же бустерная ревакцинация назначается из корыстных соображений.

Я уверен, что корыстные соображения играют не самую последнюю роль в назначении животным ежегодной вакцинации.

Мнение большинства иммунологов полностью совпадает с мнением авторов статьи, однако ветеринары до сих пор продолжают придерживаться ненаучного подхода к решению данной проблемы. Я поделился с коллегами-ветеринарами своими соображениями по поводу статьи, однако мое сообщение было встречено с возмущением и даже гневом. Причина этих эмоций вполне очевидна — отмена ежегодной ревакцинации лишит ветеринаров значительной части доходов. Всех крайне возмутила сама идея публикации подобной «еретической» информации, несмотря на то, что ветеринары всегда декларировали свое горячее желание оказывать животным квалифицированную, научно обоснованную медицинскую помощь. *Status quo* оказался важнее новых прогрессивных идей, так как эти идеи могли поставить под угрозу доходы от ежегодной вакцинации.

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ЕЖЕГОДНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ, ЕСЛИ В ЭТОМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ?

Если для ежегодной ревакцинации нет научного обоснования, то почему эта практика до сих пор повсеместно распространена? Несколько лет назад ветеринары наблюдали многочисленные случаи неврологического заболевания, которое получило название «энцефалит старых собак». Большинство ветеринаров придерживались той точки зрения, что это заболевание является особой формой чумы, которой заразились старые собаки, вакцинированные против чумы еще в щенячьем возрасте — якобы иммунитет против нее у них уже угас, что и привело к заражению чумой в столь почтенном возрасте. Таким образом, большинство ветеринаров сделали вывод о необходимости ежегодной ревакцинации против чумы всех собак независимо от возраста. Доказательства развития чумы у старых собак еще не были получены, но кампания за ежегодное проведение ревакцинации уже развернулась вовсю. Вероятнее всего, заболевание, которое считалось чумой старых собак, на самом деле представляло собой вакциноз, т. е. заболевание, возникающее вследствие вакцинации. Удивительно, но у детей, вакцинированных против кори, вероятность возникнове-

ния неврологических заболеваний при инфицировании выше, чем у невакцинированных. Кроме того, предпринимались попытки связать заболевания корью у людей и чумой у собак с развитием рассеянного склероза у людей. Вирусы кори и вирусы чумы у собак принадлежат к одному и тому же классу парамиксовирусов, поэтому нельзя исключить их сходный механизм воздействия на нервную ткань.

Какой бы ни была на самом деле причина возникновения энцефалита у старых собак, вакцинации после этого стали уделять намного больше внимания. В течение примерно десяти лет кошкам также проводили ежегодную вакцинацию против вирусной панлейкопении (кошачья чума), несмотря на то, что вакцина против этого заболевания, возможно, вообще одна из самых эффективных вакцин в ветеринарии. Мифы превратились в реальность, и ежегодная бустерная ревакцинация была представлена обществу как основа профилактической ветеринарии. Как следствие этого утверждения у всех владельцев домашних животных появилась уверенность в том, что забота об их здоровье заключается только в соблюдении сроков очередной серии ежегодных прививок. Влияние традиционной ветеринарной науки значительно увеличилось, а у владельцев домашних животных возникло ложное ощущение, что их любимцы теперь-то уж находятся под хорошей защитой.

Однако с научной точки зрения в ежегодной ревакцинации домашних животных нет совершенно никакой необходимости; прекращение ежегодных прививок существенно уменьшает как воздействие на организм животных стрессовых факторов в виде вакцин, так и расходы на содержание домашних питомцев. Я также могу предвидеть, что отмена ежегодной ревакцинации приведет к значительному снижению уровня хронических заболеваний у животных (см. далее). Исключение представляет антирабическая вакцинация, которая в соответствии с законом должна проводиться ежегодно (или раз в три года по законам некоторых штатов). Одно-двукратное введение антирабической вакцины у 95% животных дает стойкий пожизненный иммунитет; у остальных 5% даже многократные иммунизации не вызывают ответной реакции⁷. Таким образом, проводить ежегодную вакцинацию против бешенства нас заставляет страх, а не научно обоснованная необходимость.

Срок годности антирабической вакцины ограничен одним-тремя годами; однако обычно это одна и та же вакцина, но в разной упаковке. Как же поддерживаются эти требования? В действительности мы механически раз в один-три года вводим животным антирабическую вакцину без учета напряженности иммунитета и без какого-либо специального тестирования. Логичнее было бы каждый раз проводить специальное исследование степени иммунизированности животных против бешенства и в соответствии с полученными данными проводить ревакцинацию. По моему мнению, следует работать над усовершенствованием методов тестирования напряженности иммунитета; необходимо также усовершенствование законодательства, в соответствии с которым в настоящее время домашним животным проводится неоправданно интенсивная вакцинация.

ВАКЦИНАЦИЯ ДОЛЖНА ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ, НЕ ТАК ЛИ?

В ветеринарии один из самых сложных и спорных вопросов — инициальная (первоначальная) вакцинация. Обычно предполагается, что вакцинация играет основную роль в предупреждении острых заболеваний. Однако мой практический опыт показывает, что у вакцинированных животных острые заболевания возникают неамного реже. Чем же можно объяснить это явление? Одно из объяснений заключается в том, что иммунизация никогда не бывает стопроцентной, так как у определенной части животных просто не возникает ответной реакции на введение вакцины. Однако часто не учитывается, какое именно заболевание возникает вследствие вакцинации — острое или хроническое. Вакцинация потенциально может предупредить лишь развитие острого заболевания, так как только острое заболевание возникает вследствие внедрения в организм инфекционного агента. Симптомы острого заболевания мало чем отличаются у всех заболевших особей, этой болезнью поражается большая часть популяции, и после выздоровления возникает стойкий иммунитет, который предохраняет переболевших от повторного заражения в течение всей жизни. Примерами острых заболеваний у людей являются инфекции детс-

кого возраста — корь, эпидемический паротит, ветряная оспа. У кошек примерами острого заболевания являются вирусная панлейкопения (кошачья чума) и, возможно, ряд респираторных вирусных инфекций (калицивирусные и герпетические инфекции), а у собак — чума, вирусный гепатит и, возможно, парвовирусная инфекция. Бешенство представляет собой перекрестно-видовое острое заболевание. Мы понимаем острое заболевание как воздействие на организм инфекционного агента и заражение организма этим агентом, однако *воздействию инфекционного агента всегда предшествует повышенная восприимчивость организма*. Тем не менее именно инфекционный агент является основной причиной острого заболевания, поэтому теоретически возможно предупредить острое заболевание путем вакцинации.

При возникновении хронических болезней основным фактором является нарушение функции иммунной системы либо в виде ее повышенной активности, либо в виде снижения активности. При хронических заболеваниях, связанных с гиперфункцией, клетки иммунной системы утрачивают способность распознавания «своего» и «чужеродного», вследствие чего начинают атаковать ткани собственного организма. Именно по такому сценарию у животных развиваются аутоиммунные заболевания, например волчанка, аутоиммунная гемолитическая анемия, пемфигус (пузырчатка), кошачья эозинофилия («разъедающие» язвы, эозинофилическая гранулема). Число аутоиммунных заболеваний у животных в настоящее время стремительно увеличивается во всех странах. Однако в ветеринарии эти болезни не считаются острыми, т. е. возникающими вследствие воздействия инфекционного агента, и, следовательно, их никто не пытается предупредить с помощью вакцинации.

Тем не менее, заболевания, связанные с недостаточностью функции иммунной системы, часто расцениваются неправильно и считаются острыми заболеваниями, так как в их развитии принимают участие микроорганизмы. На самом же деле инфекционные агенты не являются причиной возникновения этих болезней — инфекционные агенты лишь сопутствуют этому типу заболеваний, являясь одним из симптомов клинической картины и в некоторых случаях ухудшая течение заболевания. Основной причиной этой группы заболеваний является


именно недостаточность функции иммунной системы, на фоне которой возникает инвазия организма некоторыми малоконтагиозными микроорганизмами. У особей с иммунодефицитным состоянием эти микроорганизмы вызывают значительные повреждения тканей, однако здоровые особи данной популяции, т. е. особи без нарушения функции иммунной системы, остаются практически интактными. В данной ситуации *болезнь предшествует инфекции*. Следовательно, в данном случае все попытки защитить организм путем вакцинации будут обречены на провал, так как вакцинация не будет направлена против основной причины заболевания.

Примерами заболеваний у кошек, основой которых является состояние иммунодефицита, можно считать вирусную лейкемию, вирус иммунодефицита, инфекционный перитонит и, возможно, некоторые виды респираторных вирусных инфекций. К данной группе заболеваний у собак относятся болезнь Лайма, специфический трахеобронхит и, возможно, некоторые типы парвовирусной инфекции. Примерами подобных заболеваний у людей является СПИД и, возможно, гепатит В. Естественно, имеется множество других хронических заболеваний, но так как исследователи пока еще не выявили те микроорганизмы, которым можно было бы инкриминировать их развитие, мы в данном разделе эти заболевания обсуждать не будем.

Причина развития острых заболеваний кроется во внедрении в организм инфекционного агента. Для развития острой болезни требуется определенная восприимчивость, или повышенная чувствительность к данному микроорганизму, однако симптомы восприимчивости до заражения никак не выявляются. Таким образом, теоретически возможна профилактика возникновения острого заболевания путем вакцинации. Однако пока неясно, действительно ли вакцинация предупреждает острое заболевание. При исследовании небольшой популяции за короткий период времени действительно появляется мысль о том, что именно вакцинация помогла предотвратить распространение острого заболевания. Однако, если увеличить период наблюдения и число объектов наблюдения, то получается несколько иная картина, где, как кажется, вакцинации не отводится основная роль. В качестве примера можно рассмотреть графики, отражающие уровень смертности людей от некото-

рых острых заболеваний, в частности от кори, коклюша и полиомиелита (данные о смертности людей от острых заболеваний намного полнее, чем данные о смертности животных от острых заболеваний).

Уровень смертности от кори
США и Великобритания.




До начала массовой вакцинации против кори уровень смертности уже снизился более чем на 95% .

Уровень смертности от коклюша
США и Великобритания.



До начала массовой вакцинации против коклюша уровень смертности уже снизился более чем на 75% .

Уровень смертности от полиомиелита
США и Великобритания.



До начала массовой вакцинации против полиомиелита уровень смертности уже снизился более чем на 50% .

Таблицы печатаются с разрешения «*Vaccines: Are They Really Safe and Effective*» (New Atlantean Press), Neil Z. Miller.

На основании данных этих таблиц можно сделать вывод, что значительное снижение смертности от кори, коклюша и полиомиелита отмечалось уже до того, как началась массовая вакцинация против этих заболеваний. Уровень смертности от полиомиелита за год, например, снизился более чем на 50% до начала проведения массовой вакцинации; подобным же образом более чем на 75% снизился уровень смертности от коклюша и более чем на 95% – от кори. На уровень смертности в последующие годы вакцины не оказали практически никакого влияния – смертность уменьшилась уже до начала массовой вакцинации, а не вследствие начала вакцинации.

Фактически же в некоторых случаях вакцинация, как кажется, даже способствовала увеличению уровня смертности – эта тенденция прослеживается в отношении полиомиелита и

натуральной оспы. В обоих случаях были пересмотрены критерии диагностики этих заболеваний, так что эти данные не нашли своего отражения в официальных отчетах⁸. Создается впечатление, что вакцинация не оказала практически никакого влияния на течение этих болезней; скорее заболеваемость уменьшилась благодаря возрастанию естественной резистентности к этим заболеваниям внутри популяции, а также благодаря улучшению общегигиенической обстановки.

В ветеринарии динамика заболеваний крупного рогатого скота имеет примерно такую же картину. Например, при развитии герпетической инфекции крупного рогатого скота, вызываемой бычьим герпесвирусом I, возникает поражение дыхательных путей и урогенитальной системы. В США за последние 10–15 лет проводилась весьма агрессивная вакцинация поголовья скота против этого заболевания, имеющая своей целью уменьшение заболеваемости. Однако в Австралии на официальном уровне было принято решение вообще не проводить вакцинацию против этого заболевания, чтобы добиться естественного укрепления иммунитета внутри популяции. Удивительно, но на фоне примерно одинакового уровня заболеваемости крупного рогатого скота в обеих странах данные об уровне заражения животных и о состоянии иммунитета отличаются незначительно⁹. Таким образом, создается впечатление, что вакцинация не оказывает на заболеваемость решающего влияния; если бы не данные, полученные в Австралии, мы были бы более склонны доверять вакцинации.

Британский ветеринар Кристофер Дэй (*Christopher Day*) сравнил эффективность вакцинации и гомеопатической иммунизации против специфического трахеобронхита у группы собак, которые содержались в одном из питомников. До исследования в питомнике периодически отмечались вспышки специфического трахеобронхита. Основной целью исследования была оценка эффективности применения нозода против трахеобронхита. Параллельно с этим обнаружилось очень любопытное явление: как оказалось, вакцина против возбудителя трахеобронхита у собак фактически усиливает восприимчивость к этому заболеванию. Эти данные коррелируют с данными об усилении восприимчивости к натуральной оспе и полиомиелиту после соответствующей вакцинации. Кристоферу

Дэй удалось обнаружить нозод, который достаточно эффективно предупреждает заболевание собак специфическим трахеобронхитом¹⁰. Нозоды представляют собой гомеопатически приготовленные продукты болезни. Например, *Lyssinum* является гомеопатическим средством из слюны собак, больных бешенством; *Tuberculinum* – гомеопатическое средство из легочной ткани животных, больных туберкулезом. Нозод против специфического трахеобронхита у собак д-р Доу приготовил из мокроты, выделяемой больными особями.

МОЖЕТ ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

На короткий период времени вакцинация действительно предохраняет организм от заражения специфическим заболеванием, однако ценность этого метода на самом деле весьма сомнительна. Может быть, острые болезни приносят виду пользу, о которой мы пока не догадываемся? Может быть, мы, предупреждая острые болезни, жертвуем чем-то большим?

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения определенного вида животных, то острые болезни, несомненно, приносят данному виду известную пользу – благодаря им отмечается усиление здоровья вида в целом. Известно, что при увеличении численности популяции сверх какого-то предела возникают вспышки острых заболеваний, за счет которых численность популяции уменьшается, но в живых остаются наиболее сильные и приспособленные особи – это проявление закона Дарвина о выживании сильнейших. Такие острые заболевания, как чума и бешенство, всегда обладали неким «санирующим» воздействием на популяцию волков (однако у волчьего племени есть и другие способы контроля их численности. Популяция волков гораздо лучше многих других видов регулирует собственную численность, и уж точно делает это лучше, чем современные люди).

Основная дилемма заключается в том, что в результате вакцинации происходит ослабление генофонда и, следовательно, ослабление общего здоровья данного вида. Чтобы этого не произошло, индивидуум должен выжить и не поддаться болез-

ни. Определенную пользу, которую приносят острые болезни, признавал врач-гомеопат *Higinio Perez*, который работал в начале прошлого века в Мексике. По мнению *Higinio Perez*, «недостаточно охранять отдельных представителей вида – все они смертны. Важнее охранять виды в целом»¹¹.

Эта концепция для западной культуры может показаться слишком грубой, однако она была вполне естественной для примитивного первобытного общества, в котором смерть слабых индивидуумов считалась не только приемлемой, но даже правильной и справедливой. Культура первобытного общества признавала пользу смерти слабого, и таким образом в течение длительного времени они находились в гармонии с окружающей природой. Современное же западное общество ценит право каждого индивидуума на жизнь и соответственно старается спасти каждого индивидуума. Не исключено, что наши действия, прямо противоположные высказыванию *Higinio Perez*, и являются главным фактором ухудшения здоровья как человека, так и домашних животных. Я бы даже предположил, что это ведет к деградации отдельных видов.

Китайский иероглиф, обозначающий кризис, состоит из сочетания иероглифа «опасность» с иероглифом «благоприятная возможность». С точки зрения китайской традиционной философии болезнь фактически является частью процесса развития, как физического, так и духовного. Кризис, т. е. точка перелома болезни, есть поворотный этап болезни, дающий возможность дальнейшего развития и обновления. Эта концепция нашла свое неожиданное подтверждение в реальной жизни. Ребенок одного из моих приятелей после болезней, которые сопровождались сильной лихорадкой (ребенок не получал каких-либо вакцинаций), делал огромные шаги вперед в своем развитии. После одного эпизода повышения температуры он начал ходить, после другого – говорить. Если бы ребенку проводились все положенные прививки, то на фоне уменьшения заболеваний прогресс его развития не был бы столь явным. Возможно, причиной многочисленных расстройств внимания и поведения у детей, которые приняли в наше время массовый «эпидемический» характер, является именно вакцинация. За последние несколько десятилетий число подобных нарушений в детском возрасте выросло многократно,

и этот процесс идет параллельно с увеличением количества прививок у детей. Можно ли считать это простым совпадением? Очевидно, что вакцинация наносит вред не только виду в целом, но и отдельным его представителям.

Вначале я весьма скептически относился к утверждениям, что вакцинация может вызывать развитие хронических заболеваний и различных расстройств. Конечно, я знал, что после вакцинации могут возникать аллергические и анафилактические реакции, но думал, что именно об этих осложнениях и идет речь. Я хорошо помню один случай из моей практики, который буквально открыл мне глаза на происходящее.

У Флаффи – чудесной сиамской кошки, которая жила в доме не менее чудесной женщины, – постоянно возникали рецидивы цистита, который не поддавался ни традиционному, ни гомеопатическому лечению. Несмотря на то, что мне очень нравилась хозяйка Флаффи (и Флаффи, конечно, тоже!), я очень не любил их визиты ко мне, так как я перепробовал все что мог, но безрезультатно – цистит у кошки рецидивировал регулярно. И вот однажды, когда я в который раз просматривал историю болезни Флаффи, на меня буквально снизошло откровение – я вдруг обратил внимание, что цистит у кошки с точностью часового механизма рецидивирует спустя месяц после серии очередных прививок. По моему предложению Флаффи полностью прекратили проводить все прививки, и больше никаких рецидивов цистита у кошки ни разу не возникало. Единственный вывод, который напрашивался сам собой, заключался в том, что именно вакцинация была причиной рецидивирующего цистита и, возможно, предполагаемой инфекции.

В настоящее время очевидно, что вакцинация является причиной фибросаркомы – смертельной злокачественной опухоли, вызывающей огромные страдания у кошек. Фибросаркома представляет собой один из видов злокачественной опухоли, развивающейся в области инъекции либо антирабической вакцины, либо вакцины против вируса кошачьей лейкемии. При исследованиях отдельные субстанции вакцины были обнаружены в массе опухолевой ткани – это подтверждает прямую связь вакцинации и развития опухолевого процесса. Многие ветеринары считают данную опухоль «вакцинозной саркомой».

Обычно срок жизни кошек после возникновения этой опухоли не превышает трех лет; эффективного лечения пока не найдено. После хирургического удаления опухоли обычно быстро развиваются метастазы. Некоторые ветеринары доходят до абсурда, предлагая проводить вакцинацию в область одной из конечностей или даже хвоста, чтобы в случае развития опухоли просто ампутировать эти органы! Разве в этом заключается разумное решение?

Доказательства вредного влияния вакцинации на организм человека многочисленны и вполне очевидны. Все вакцины в той или иной степени могут вызывать побочные реакции, однако наибольшее количество осложнений обнаруживается при введении вакцины против коклюша. Одной из наиболее частых реакций на введение этой вакцины является развитие респираторных расстройств, причем развитие реакции происходит в полном соответствии со стадиями ответной реакции на стресс. За инициальной стадией (стадия «тревоги») развивается стадия резистентности, которая отражает попытки организма минимизировать стресс, а затем стадия истощения, отражающая резкое снижение ресурсов организма.

После введения АКДС (ассоциированной дифтерийно-коклюшно-столбнячной вакцины) может развиваться синдром внезапной смерти младенцев, причем наибольшее число случаев смерти приходится на трехнедельный период после вакцинации. У детей младшего возраста смерть чаще наступает сразу же после вакцинации (стадия «тревоги»), а у детей постарше — в стадии истощения¹². По данным некоторых исследований, при развитии этого синдрома смерть младенцев в первые три дня после вакцинации наступает в восемь раз чаще, чем в более поздние сроки. Кроме того, у 85% детей, умерших вследствие этого синдрома, проводилась иммунизация вакциной АКДС¹³.

В 1976 г. в Японии минимальный возраст для вакцинации против коклюша был увеличен до двух лет, в то время как случаев синдрома внезапной смерти младенцев фактически не отмечалось¹⁴⁻¹⁵. В 1950 г. США по статистике занимали третье место в мире, в 1980 г. — 17-е место, а в 1994 г. — 21-е место по смертности от этого синдрома. Не может ли это быть связано с нашими претензиями на самое большое число вакцинаций, проведенных детям? В отличие от США Япония в 1975 г. зани-

мала 17-е место в мире по смерти младенцев, однако к 1990 г. перешла на первое¹⁶.

ВАКЦИНАЦИЯ: ЗАМЕНА ОСТРОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ХРОНИЧЕСКИМ

Вакциноз представляет собой болезненное состояние, которое развивается вследствие вакцинации. Действительно ли могут развиваться заболевания вследствие вакцинации? Британский врач Комптон Бюрнетт (*Compton Burnett*), который практиковал в конце XIX – начале XX века, вначале был убежденным сторонником вакцинации против натуральной оспы. Однако, будучи опытным клиницистом, он отметил, что многие хронические заболевания у детей были связаны с вакцинацией, даже если она проводилась и задолго до заболевания. Бюрнетт выявил также особые свойства *Thuja* оказывать влияние на обратное развитие симптомов вакциноза. Кстати, термин «вакциноз» также принадлежит Бюрнетту. По мнению Бюрнетта, введение вакцин не только вызывает развитие хронических заболеваний – *хронические заболевания возникают вследствие того, что вакцины предупреждают развитие острых заболеваний:*

«Допустим, что совершенно здоровому человеку, которому никогда не проводили никаких вакцинаций, предлагают сделать прививку против оспы, мотивируя это тем, что он может легко заразиться – ведь это заболевание чрезвычайно распространенное. Задумайтесь – человек, которого предупредили о возможности заражения, был совершенно здоров. После введения соответствующей вакцины этому совершенно здоровому человеку сообщают, что теперь он надежно защищен от заболевания натуральной оспой. Возникает естественный вопрос: а действительно ли сейчас он защищен лучше, чем раньше? Правильнее всего было бы ответить, что *самая надежная защита от любых заболеваний – это собственное здоровье; любая модификация или изменение*

полного здоровья могут означать только одно — его *уменьшение*; а уменьшение здоровья может трактоваться или как болезнь, или как ухудшение состояния в какой-то степени или какого-то типа. Таким образом, защитное действие вакцин реализуется или через ухудшение здоровья, или через болезнь»¹⁷ (*курсив автора*).

С. Ганеман в своем «Органоне врачебного искусства» описал взаимоотношения внутри организма при одновременном воздействии двух или трех различных болезней. По утверждению Ганемана, «если обе болезни одинаково сильные или если первая по счету болезнь более сильная, чем вторая, то последнюю болезнь организм “отталкивает”. Таким образом, те, кто страдает серьезными хроническими болезнями, не болеют осенней дизентерией или другими легкими инфекционными болезнями»¹⁸. Хронические болезни предохраняют организм от болезни острой; так, пациенты с тяжелой шизофренией не болеют обычной простудой или гриппом. Ганеман сделал свой вывод при наблюдении за естественными болезнями. Логически применяя это утверждение к вакцинации, можно прийти к такому же выводу, который сделал Бюрнетт. В подобных случаях вакцинация — т. е. хроническая болезнь — «отталкивает» острую болезнь. Однако ценой за отсутствие острой болезни является пожизненное страдание от болезни хронической.

В ветеринарии отмечено, что если микроорганизм имеет тропность к поражению какого-либо определенного органа, то эта тропность непременно проявится при вакцинальной реакции. Например, если данный микроорганизм имеет тропность к заболеваниям легких, то при вакцинации против данного микроорганизма выявится воздействие этой вакцины именно на легкие. Иллюстрацией этого положения служит возникновение расстройств дыхания у людей при вакцинации их против коклюша. Эту концепцию сформулировал д-р Ричард Питкертн (*Richard Pitcairn, DVM*). Целесообразно подробнее рассмотреть ее на примере панлейкопении у кошек (кошачья чума) и на примере бешенства.

Основные симптомы панлейкопении у кошек — воспалитель-

но-дегенеративные изменения кишечника, следствием которых является рвота и диарея, значительное уменьшение числа лейкоцитов крови, приводящее к иммуносупрессии, потеря аппетита, слизисто-гнойные выделения из носа, дегидратация и быстрая потеря веса. При хронической болезни, столь распространенной в настоящее время у кошек, наблюдаются примерно такие же симптомы. Аутоиммунное заболевание под названием «болезнь воспаленного кишечника» сейчас у кошек встречается так часто, что уже начинает напоминать некую эпидемию. Двадцать лет назад, однако, такой болезни у кошек практически не встречалось, тогда как в настоящее время этот диагноз является одним из самых распространенных.

Кошки чрезвычайно чувствительны к нарушению функции иммунной системы и иммуносупрессии. Состояние иммуносупрессии у кошек обычно связывается с наличием двух ретровирусов (вирус кошачьей лейкемии и вирус иммунодефицита кошек), но не исключено, что иммуносупрессия возникает под воздействием еще некоторых вирусов. По моему убеждению, это не две различные болезни, а скорее всего одна и та же болезнь; однако нишу, возникающую вследствие иммунодефицита, могут заполнять различные вирусы (вспомним, что при хроническом заболевании инфекционное поражение появляется на фоне уже имеющейся болезни). Возможно, что подобным образом развивается заболевание под названием «вирусный иммунодефицит человека». Парвовирусная инфекция, к которой относится и вирус панлейкопении у кошек, обладает мощным иммуносупрессорным действием. Кроме того, как я подозреваю, вследствие иммуносупрессорного действия парвовируса у кошек развивается хроническое поражение верхних дыхательных путей, а также слизисто-гнойные выделения из носа и конъюнктивы глаз.

Подобный сценарий развития хронических заболеваний наблюдается в настоящее время и у собак. В целом состояние иммуносупрессии для собак нехарактерно, однако о таких случаях у этого вида животных в настоящее время сообщают все чаще и чаще. По моему убеждению, к развитию иммуносупрессивного состояния у собак привела массивная вакцинация против парвовирусной инфекции, которая началась примерно 30 лет назад — т. е. в то же время, когда началась активная

кампания по вакцинации кошек против парвовирусной инфекции. Таким образом, можно предположить, что у собак надвигается волна тех же заболеваний, которые в настоящее время все чаще встречаются у кошек. Кроме того, за последние 5–10 лет у собак также наблюдаются случаи болезни воспаленного кишечника, которой раньше практически не отмечалось. Я убежден, что причиной этого заболевания у собак является вакцинация против парво- и коронавирусной инфекции. Мне неоднократно приходилось наблюдать случаи возникновения болезни воспаленного кишечника у собак через один-два месяца после вакцинации против данных типов вирусов.

С воздействием парвовируса на организм ассоциируется возникновение еще одного синдрома, который вначале появился у кошек, а позднее стал отмечаться и у собак, — это синдром кардиомиопатии. Кардиомиопатия представляет собой заболевание миокарда, при котором сердечная мышца или слабеет и растягивается (дилатационная кардиомиопатия), или значительно утолщается (гипертрофическая кардиомиопатия). Как в том, так и в другом случае происходит резкое нарушение сократительной функции миокарда, что часто бывает фатальным.

Диагноз «кардиомиопатия» мы начали ставить животным примерно лет двадцать назад, т. е. примерно в то же самое время, что и диагноз «болезнь воспаленного кишечника». Многие (но не все) случаи дилатационной кардиомиопатии связаны с дефицитом аминокислоты L-таурина. Причина гипертрофической кардиомиопатии, а также дилатационной кардиомиопатии, не связанной с дефицитом L-таурина, пока остается неизвестной.

В начале вспышки парвовирусной инфекции в конце 70-х годов отмечалась значительная смертность маленьких щенков в течение первых суток и даже первых часов заболевания. Как оказалось, у щенков парвовирусная инфекция поражает миокард, чем и объясняются случаи их ранней смерти в самом начале заболевания.

До вспышки парвовирусной инфекции кардиомиопатия у собак практически не встречалась (точнее, встречалась как казуистический случай), но после вспышки случаи кардиомиопатии стали отмечаться все чаще и чаще. Частота этого заболевания особенно явно возросла за последние 5–10 лет, совпадая по вре-

мени с увеличением числа случаев болезни воспаленного кишечника. По данным журнала *The Merck Veterinary Manual*, «причина дилатационной кардиомиопатии у собак пока неизвестна, однако можно подозревать воздействие вирусной инфекции на организм, которое приводит к аутоиммунному поражению миокарда... Начиная с пандемии 1978 г. наибольшее число случаев парвовирусной инфекции и кардиомиопатии отмечается у кобелей породы доберман-пинчер»¹⁹. Эта статья была написана в 1986 г., и с тех пор кардиомиопатия отмечается не только у доберман-пинчеров, но и у собак других пород.

По моему мнению, автор этой публикации совершенно правильно подметил связь между парвовирусной инфекцией и возникновением кардиомиопатии, однако я предполагаю, что в большинстве случаев причиной кардиомиопатии у собак является не сам парвовирус, а вакцинация против парвовирусной инфекции. По моему мнению, именно влиянием вакцинации против парвовируса можно объяснить и случаи кардиомиопатии у кошек. Возможно, что при естественном заболевании парвовирусной инфекцией у кошек (т. е. вирусной панлейкопенией) воздействие данного вируса на миокард не обнаруживалось столь очевидно, однако при вакцинации проявилось вполне отчетливо. Кардиомиопатия представляет собой аутоиммунное заболевание, а вакцины, безусловно, являются основным виновником аутоиммунной агрессии. По моему мнению, подобная тесная связь никак не может быть простым совпадением.

Рассмотрим еще один пример – вакцинацию против бешенства. Бешенство представляет собой неврологическое заболевание вирусной природы, основными симптомами которого являются приступы судорог, спутанность сознания, параличи конечностей, удушье, приступы ярости и агрессивного поведения. Кроме того, отмечается светобоязнь, гиперсексуальное поведение, гиперестезия (повышение чувствительности к прикосновению, шуму и другим раздражителям), страх, желание несъедобных объектов, стремление к пребыванию в одиночестве и бесцельные блуждания. У некоторых животных наблюдается необычный симптом – при поражении бешенством они становятся более дружелюбными и привязчивыми, чем прежде.

При хронических заболеваниях у кошек и собак также отмечаются многие подобные симптомы. Нередким симптомом в

настоящее время являются судорожные приступы, гиперсексуальное поведение даже у кастрированных особей, не говоря уж об обычных животных, и поедание всяческих неудобоваримых «субстанций». Дегенеративная миелопатия с нарушением функции спинного мозга и развитием безболезненного паралича задних конечностей, которая раньше отмечалась только у собак, в настоящее время наблюдается и у кошек. Это заболевание впервые было описано у собак в конце 60-х годов. В конце 70-х, когда я заканчивал учебу, это заболевание было присуще в основном немецким овчаркам и считалось (и сейчас считается!) наследственным. Обычно дегенеративная миелопатия начиналась у собак в возрасте примерно 10 лет.

В настоящее время дегенеративная миелопатия поражает собак различных, чаще всего крупных пород; в редких случаях это заболевание встречается и у кошек. Я наблюдал дегенеративную миелопатию у шестимесячного золотого ретривера, причем симптомы заболевания появились вскоре после завершения начальной серии прививок. Сейчас дегенеративная миелопатия значительно «помолодела» и захватывает в основном собак четырех-пятилетнего возраста. Каким же образом это якобы наследственное заболевание может передаваться другим породам собак? Особенно любопытной мне кажется передача этого чисто «собачьего» заболевания кошкам — может, я когда-то пропустил эту лекцию? Антирабическая вакцинация кошек началась примерно 10 лет назад — у меня есть серьезные опасения, что с резким подъемом заболеваемости кошек дегенеративной миелопатией мы вплотную столкнемся лет через двадцать.

В настоящее время мы все чаще наблюдаем крайние проявления поведенческих симптомов в виде чрезвычайной привязчивости животных, с одной стороны, и выраженной агрессивности — с другой. В некоторых случаях агрессивность собак резко возрастает после антирабической вакцинации, даже если прививка проводилась «убитой» вакциной²⁰⁻²¹. Значительно возрастает количество животных с признаками агрессивного поведения. Один из моих коллег-ветеринаров, практикующий с 50-х годов, утверждает, что «раньше животные были намного милее». В середине XX в. такие симптомы поведения животных, как страх и агрессия, встречались несравненно реже, чем сейчас²². У меня есть веские основания подозревать, что посто-

янные ревакцинации против бешенства, особенно у таких пород, как чау-чау, питбуль и т. п., привели к резкому усилению их агрессивности как в отношении своих соплеменников, так и в отношении людей. «Энергия» бешенства или хронические симптомы, соответствующие симптомам бешенства, при укусах могут передаваться другим особям.

С точки зрения конвенциональной медицины эта концепция лишена смысла. По мнению традиционных ветеринаров, заболевание макроорганизма возможно только при внедрении в его внутреннюю среду живого микроорганизма, а не убитой или модифицированной вакцины. Однако с точки зрения гомеопатической науки заболевание организма возникает в тех случаях, когда жизненная сила вируса вступает во взаимодействие с жизненной силой восприимчивого организма, причем это взаимодействие начинается на префизическом энергетическом уровне. Отдельные формы жизненной силы остаются даже у фрагментов вируса — именно поэтому при введении «убитых» вакцин возможно развитие заболевания у вакцинированного индивидуума. Энергетический уровень заболевания предшествует физическому уровню независимо от того, возникает эта болезнь естественным путем или в результате введения вакцины. Изменения, которые возникают в организме вследствие взаимодействия жизненной силы вакцины и жизненной силы вакцинированного животного, приводят к развитию физических болезней того или иного типа. Вначале эта болезнь может проявляться в виде препятствия развитию острой болезни (т. е. как защитное действие вакцины — см. цитату Бюрнетта), но затем ее симптомы становятся более явными.

Некоторые другие состояния, о которых достаточно часто упоминается в настоящее время, также прямо или косвенно связаны с воздействием вакцин на организм. Создается впечатление, что некоторые поствакцинальные осложнения не являются специфическими для микроорганизмов, против которых направлено действие вакцины, а могут быть неспецифическими реакциями на вакцинацию. Во время учебы нам рассказывали о некоторых необычных болезнях, в основном аутоиммунного характера, например о волчанке, пемфигусе (пузырчатке) и т. п., но при этом отмечалось, что это весьма редкие заболевания, с которыми ветеринар может и не встретиться за все время своей

практической работы. Нам была известна и соответствующая случаю поговорка: «Если вы слышите удары копыт на заднем дворе, не думайте, что это зебра». Так вот такие «зебры» сейчас встречаются так же часто, как обычные «лошади» — если не чаще. Старые ветеринары утверждают, что некоторые болезни просто не существовали у животных до последних десятилетий. Когда я учился, случаев гипертиреоза (повышение продукции гормонов щитовидной железы) у животных практически не отмечалось, хотя в настоящее время это заболевание встречается не только у кошек, но и у собак (но у кошек чаще). Симптомы этого заболевания настолько характерны и своеобразны, что в этом случае нельзя говорить о неправильной диагностике — гипертиреоз можно распознать даже тогда, когда причина его возникновения совершенно непонятна. Просто в то время данной болезни у животных не существовало. Не связано ли появление этой болезни с вакцинацией?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим еще один случай из моей практики. Сиамскую кошку Шебу впервые привели ко мне на прием, когда ей было девять лет. Через неделю после очередной ревакцинации у Шебы полностью пропал аппетит и развилась сильнейшая тахикардия. Ветеринар заподозрил гипертиреоз, хотя лабораторные показатели оставались в пределах нормы. После осмотра я назначил ей дозу *Thuja*, после чего восстановилась и нормальный сердечный ритм, и аппетит. После приема гомеопатического лекарства кошка стала выглядеть даже лучше, чем до вакцинации. В данном случае прямая связь вакцинации и заболевания очевидна. Если бы вовремя не была назначена *Thuja*, то почти наверняка можно утверждать, что у кошки развился бы классический гипертиреоз.

До 60-х годов кошек приносили на прием к ветеринару достаточно редко. Однако с этого времени статус кошек как домашних животных резко повысился, что привело к увеличению числа особей, которым оказывались различные виды ветеринарной помощи, включая и вакцинацию. До середины 80-х годов кошкам практически не проводилась антирабическая вакцинация. По моему мнению, именно массированная вакцинация является причиной возникновения у этих животных гипертиреоза и многих других патологических состояний, столь частых в настоящее время.

Среди новых для животных болезней, число которых год от года увеличивается, особого упоминания заслуживают гипотиреоз у собак, иммунодефицитные заболевания у кошек вирусной этиологии (вирусная лейкемия кошек, вирусный иммунодефицит), инфекционный перитонит у кошек, хронический гепатит (в основном у собак), почечная недостаточность, заболевания мочевыводящих путей у кошек, болезнь воспаленного кишечника и аутоиммунные заболевания крови. Среди домашних животных буквально свирепствует аллергия; связь между вакцинацией и возникновением аллергии прослеживается и у людей²³. Стремительно растет число нарушений иммунной системы у домашних животных. Год от года возрастают продажи стероидных препаратов, которые используются для подавления симптомов аллергии. Мы на самом деле променяли острые болезни на коварные и истощающие организм хронические заболевания.

Скорее всего мы не ликвидировали острые болезни как таковые – мы просто изменили форму их проявления и модифицировали их в болезни хронические. До внедрения в практику метода вакцинации некоторые острые заболевания, несомненно, создавали реальную угрозу для жизни животных, однако после достижения половой зрелости животные, которые переболели острыми болезнями, жили долгой и относительно свободной от болезней жизнью. Сегодня вакцинация помогает животным преодолеть все опасности раннего возраста, однако в дальнейшем жизнь большинства из них заполняется многочисленными и разнообразными страданиями. Вакцинация не предупреждает острые болезни, а лишь трансформирует их в другую – более опасную и коварную форму. Разве это выход? Что же остается на долю наших питомцев – жить полной жизнью и процветать или просто существовать?

Безусловно, ряд других факторов помимо вакцинации способствует резкому увеличению случаев хронических заболеваний у домашних животных. Исследования тюленей показали, что потребление рыбы, зараженной пестицидами, вызывает у них развитие иммунодефицитного состояния. Следствием этого явилась вспышка в 1992 г. собачьей чумы у тюленей, которая привела к гибели множества особей в Северной Атлантике²⁴. Подобные состояния отмечаются даже у растений, напри-

мер, инфестация жучками-короедами популяции сосны и поражение ржой популяции американского каштана. Многолетнее загрязнение атмосферы и кислотные дожди губительным образом сказались на росте и развитии этих растений, что в итоге привело к повышению их восприимчивости к целому ряду заболеваний. Пестициды в настоящее время обнаруживаются повсюду, даже в пище людей. Кстати, тюленей, как выяснилось, кормили рыбой, предназначенной для продажи людям.

Качество питания огромного количества домашних животных в настоящее время может вызвать лишь чувство глубокого сожаления. Тысячи собак и кошек мешками поедают сухой корм, состоящий из ингредиентов сомнительного происхождения, включая испорченное мясо, прогорклые жиры и токсичные консерванты. Такая пища не может не оказать на иммунную систему животных токсического воздействия. Многие виды так называемой готовой пищи для животных содержат консервант этоксиквин (*ethoxyquin*), применение которого у людей запрещено из-за его канцерогенного действия. Каким же образом то, что признано токсичным для людей, оказывается полезным для наших домашних животных? В состав готовых кормов для животных входят в качестве консервантов также соединения бензола, которые обладают токсическими и канцерогенными свойствами. Все эти соединения особенно токсичны для кошек. Подобное неполноценное питание играет особую роль в ухудшении здоровья наших питомцев.

Очевидно, что наибольшее значение в развитии хронических заболеваний все же имеет вакцинация. Косвенным образом влияние вакцинации можно доказать результатами назначений *Thuja*, *Silicea* и других противовакцинозных средств. Наблюдаются также случаи заболеваний, при которых их связь с вакцинацией прослеживается особенно четко (например, как у кошки Шебы). Подобные случаи, прямо или косвенно связанные с вакцинацией, я вижу в своей практической работе каждый день. Я обнаружил любопытное явление — если в целом не отвергать возможности развития заболеваний после вакцинации, то очевидные симптомы этих заболеваний можно найти на каждом шагу. Я не понимаю, почему другие ветеринары не хотят замечать эти факты, и это меня очень огорчает.

КАКИМ ОБРАЗОМ ВАКЦИНАЦИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Почему же при вакцинации вероятность развития хронических заболеваний выше, чем при естественно возникающей болезни? Во-первых, следует обратить внимание на тот факт, что естественно возникающие болезни, за исключением бешенства, передаются воздушно-капельным путем. В ответ на проникновение инфекции в организме на начальной стадии заболевания возникает местная ответная реакция, в формировании которой принимают участие как специфические, так и неспецифические факторы местного иммунитета. Проходит несколько часов и даже дней, прежде чем чужеродный агент сможет проникнуть во внутреннюю среду организма. Специфическая местная ответная реакция заключается в выработке антител в области воздействия болезнетворного агента, а неспецифическая местная реакция — в скоплении лейкоцитов и других неспецифических факторов защиты вокруг зоны внедрения чужеродного агента. При инъекционном способе введения вакцин активизации местных факторов иммунитета не происходит, и защитная реакция реализуется только за счет общей иммунной реакции организма.

Во-вторых, при ревакцинации повторно возникает подобная ответная реакция, что в итоге приводит к чрезмерной стимуляции иммунной системы организма. В целом для организма такая сверхактивность иммунной системы не является естественной, так как при повторном воздушно-капельном соприкосновении с болезнетворным агентом местные факторы иммунитета в большинстве случаев полностью предохраняют организм от повторного развития заболевания.

В-третьих, в процессе изготовления вакцин в большинстве случаев происходит разрушение вирусов; таким образом, в организм вводятся не вирусы как таковые, а фрагменты их ДНК и РНК. В ответ на проникновение фрагментов нуклеопротеидов в иммунной системе начинается бурная продукция антител. Нуклеопротеиды относительно тождественны для всех форм жизни — именно поэтому при чрезмерной продукции антител организм в некоторых случаях может утратить способность дифференцировать чужеродные вирусные нуклеопротеиды и свои собственные. Таким образом развиваются аутоим-

мунные заболевания — т. е. заболевания, при которых разрушаются ткани собственного организма. В настоящее время аутоиммунные заболевания у животных возникают гораздо чаще, чем когда бы то ни было. Нельзя исключить, что одной из причин такого положения дел является именно массированная вакцинация. При естественно возникающих заболеваниях в иммунной системе организма вырабатываются антитела, направленные против поверхностных структур вируса, которые менее подобны тканям собственного организма; соответственно вероятность возникновения перекрестных реакций значительно уменьшается. Кроме того, при естественных болезнях значительная часть иммунного ответа реализуется за счет местных антител в зоне внедрения чужеродного агента.

Бактерии по сравнению с вирусами имеют намного более сложное строение; при внедрении в организм бактериальных агентов в иммунной системе продуцируются антитела, направленные в основном против антигенов клеточной стенки бактерий, а не против фрагментов нуклеопротеидов. Именно поэтому введение бактериальных вакцин (так называемых бактеринов) гораздо реже приводит к развитию аутоиммунных заболеваний. Чаще всего при повторном введении бактеринов развиваются аллергические или анафилактические реакции. Например, аллергические реакции у собак при введении комбинированной вакцины чаще всего вызываются вакциной против лептоспироза.

Помимо всего прочего в состав вакцин входят некоторые дополнительные субстанции, например, антибиотики, консерванты и адъюванты (вещества, дополнительно стимулирующие иммунный ответ; обычно адъюванты добавляются к убитым вакцинам). Консерванты и адъюванты содержат ряд токсических и канцерогенных веществ, например алюминий (*alum*), ртуть (*thimerosal*) и формальдегид. В составе вакцин иногда находят также чужеродные белковые субстанции; чаще всего это протеины куриных или утиных эмбрионов, которые использовались в качестве питательной среды для роста микроорганизмов. Однако хуже всего, что иногда в составе вакцин обнаруживаются некоторые ферменты и микробные загрязнения. Например, в 1995 г. в газете *Washington Post* была напечатана статья о том, что в составе вакцины *MMR* (корь-эпидемический паротит-ко-

ревая краснуха) фирмы *Merck & Co.* был обнаружен фермент реверсивная транскриптаза. Этот фермент продуцируется ретровирусами *FeLV*, *FIV* и *HIV* и обладает способностью нарушать генетический код клеток, вызывая такие тяжелые заболевания, как лейкемия и другие виды злокачественных новообразований. Подобная статья была также напечатана в газете *Seattle Times* от 19 февраля 1999 г.; в этой статье приводились данные о связи некоторых типов злокачественных опухолей с вакцинацией против полиомиелита. Причиной возникновения опухолей авторы считали загрязнение вакцины против полиомиелита вирусом *SV-40*, который был обнаружен в составе вакцин, произведенных до 1963 г. Последствия подобного рода вакцинаций могут проявиться спустя много лет, что делает выявление истинной причины заболевания крайне трудной, даже невозможной задачей.

Практика ежегодной ревакцинации способствует значительному увеличению числа хронических заболеваний у домашних животных, при этом случаи вакциноза у домашних питомцев наблюдаются значительно чаще, чем у человека. Последствия вакцинаций оказывают очевидное губительное воздействие на состояние здоровья наших домашних животных. *Данные, полученные при изучении вакциноза у животных, можно было бы в дальнейшем использовать при изучении вакциноза у людей; однако я не советовал бы это делать — уж очень мрачную картину мы могли бы получить.*

ВАКЦИНАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОЛОВНОЙ МОЗГ

В книге Харриса Култера «*Vaccination, Social Violence and Criminality*» (см. «Дополнение») рассматривается теория о том, что вакцинация может быть причиной изменения психологии и поведения человека. По моему мнению, следует обратить внимание на описание постэнцефалитного синдрома, данное доктором Култером; проявлениями этого синдрома можно объяснить многие изменения поведения животных, которые так часто наблюдаются в настоящее время, — агрессивность, приступы ярости, чрезвычайное беспокойство, неспособность

общаться с другими животными, страхи, частое желание одиночества и гиперсексуальность (признаками гиперсексуального поведения животных являются нимфомания, сатириазис и мастурбация. В настоящее время эти признаки иногда отмечаются даже у кастрированных особей).

У животных также наблюдаются многочисленные физические изменения, причиной развития которых, по мнению Х. Култера, является вакцинация — например, астматический синдром, судорожные приступы, развитие параличей и парезов, аллергические реакции, изменения аппетита и многочисленные нарушения развития.

В качестве иллюстрации теории доктора Култера мне хотелось бы привести один пример из моей практики. Коккер-спаниелю Долли было девять лет, когда меня попросили ее проконсультировать. У нее отмечались достаточно выраженные психоневрологические нарушения в виде судорожных приступов, ослабления интеллекта и трудностей общения с членами семьи, где она жила много лет. Кроме того, у Долли возникли нарушения ориентации в пространстве — например, если она случайно оказывалась в углу или между столом и стеной, то ей стоило огромного труда выбраться оттуда на свободное место. У Долли также отмечались явления одностороннего пареза лицевого нерва, из-за которого она с трудом могла есть и пить из своей миски. Этот факт представляет собой особый интерес, так как, по мнению Х. Култера, поражение черепно-мозговых нервов является одним из признаков постэнцефалитного синдрома.

Ключевым симптомом, который навел меня на мысль о тесной связи заболевания Долли с вакцинацией, была выраженная гиперактивность собаки после проведения прививки. Нарушения поведения у Долли после вакцинации были настолько выраженные, что как-то раз во время эпизода повышенной двигательной активности она даже спрыгнула с высоты 2,5 м. Другим симптомом, который указывал на связь поражения нервной системы и вакцинации, были характерные для собачьей чумы трещины и участки уплотнения ткани в области носа и на подушечках лап.

К счастью, назначение гомеопатических средств привело к значительному и явному улучшению состояния Долли. Вначале я назначил ей *Helleborus*, однако улучшение состояния

было минимальным. Затем, после единственной дозы *Nux moschata* в высокой потенции ее состояние настолько явно и быстро улучшилось, что создалось впечатление, будто Долли вновь пришла в себя после многолетней комы.

КАК ПРИМЕНИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ПРАКТИКЕ

Я понимаю, что все изложенное выше изобилует деталями, в которых весьма сложно разобраться; однако мне хотелось представить достаточно большой объем информации по такому сложнейшему вопросу, как вакцинация. Специальные рекомендации по проведению этой процедуры (последний раздел главы) предназначены только для тех, у кого еще не сформировалось определенное мнение относительно воздействия вакцинации на организм животных. В целом вакцинация более рискованна, чем ее отсутствие, — это верно для большинства животных и в большинстве ситуаций. В этом разделе вкратце приводятся основные положения вакцинации, которые помогут вам сформировать более четко свое отношение к этому методу.

Во-первых, практически все прививки после года жизни животных можно отменить — в проведении ежегодной ревакцинации просто нет необходимости. Исключение составляет ежегодная ревакцинация против бешенства, которая требуется по закону, однако с медицинской точки зрения это совершенно необоснованное мероприятие (см. далее). Нам необходимо работать над тем, чтобы наши законы опирались на научные факты, а не на эмоции и фантастические идеи, столь распространенные в настоящее время в обществе. Ревакцинация после первого года жизни животных значительно увеличивает вероятность возникновения хронических заболеваний; при отмене же ежегодной бустерной ревакцинации вероятность побочных эффектов иммунизации снижается без всякого *дополнительного риска для здоровья пациента*. К году жизни у животных иммунитет против острых заболеваний уже сформирован, хотя, конечно, остается риск развития некоторых хронических заболеваний вследствие первичной иммунизации. Далее в этом разделе мы рассмотрим длительность иммунитета при

различных острых заболеваниях.

Во-вторых, все вакцины следует применять в виде изолированных, а не комбинированных антигенов (антигеном называется субстанция, которая при введении в организм вызывает ответную реакцию иммунной системы. В данном случае антигенами являются бактерии и вирусы, из которых готовятся вакцины). Это означает, что необходимо избегать введения поливалентных (комбинированных) вакцин, которые так распространены в настоящее время. В естественных условиях организм одномоментно поражается, как правило, только одним острым заболеванием, поэтому реакция иммунной системы в виде продукции одного типа антител в ответ на введение одного антигена является более естественной. При продукции одновременно нескольких типов антител против комплекса антигенов вероятность развития побочных реакций значительно увеличивается. Следовательно, более рациональным следует признать чередование введения моновалентных вакцин с минимумом ревакцинаций, а не одномоментное введение поливалентной вакцины, в составе которой присутствует целая группа антигенов, с ревакцинацией через три-четыре недели (см. далее).

В-третьих, необходимо проводить иммунизацию только в тех случаях, когда острое заболевание у домашних животных соответствует *всем* следующим критериям:

1. Тяжелое течение острого заболевания, в некоторых случаях с непосредственной угрозой для жизни животных.
2. Животные или находились в контакте, или неизбежно будут контактировать с больными животными.
3. Имеются неопровержимые доказательства эффективности применения вакцины против данного заболевания.
4. Вакцина против данного заболевания безопасна.

Рассмотрим критерии вакцинации при некоторых распространенных заболеваниях домашних животных, например критерии вакцинации кошек при вирусной кошачьей лейкемии (*FeLV*). Заболевание передается при непосредственном контакте кошек; таким образом, у всех кошек, которые живут дома и практически не выходят на улицу, вероятность заражения минимальна (критерий № 2). По моему мнению, в этих

случаях иммунизация неоправданна, однако многие ветеринары предлагают проводить вакцинацию и этих особей. На основании моего опыта могу утверждать, что вакцина против этого заболевания малоэффективна и далеко не безопасна; таким образом, вакцинация при данном заболевании также не соответствует и критериям № 3 и 4. Следовательно, в большинстве случаев вакцинация против вирусной кошачьей лейкемии является необоснованной.

Вакцинация против инфекционного перитонита у кошек (*FIP*) является также необоснованной, так как не соответствует критериям № 3 и 4 и редко соответствует критерию № 2. Вакцина против этого заболевания неэффективна и часто дает побочные реакции. Мне приходилось неоднократно наблюдать и лечить заболевания, которые развивались у кошек вследствие вакцинации и против вирусной кошачьей лейкемии, и против инфекционного перитонита. Клинические проявления заболеваний вследствие вакцинации полностью соответствовали клинике тех заболеваний, против которых и предпринималась вакцинация.

Вирусная панлейкопения кошек представляет собой чрезвычайно тяжелую болезнь, однако в основном болеют маленькие котята и практически не болеют взрослые особи. Вакцинация принесет пользу только тем кошкам, которые находились в контакте с больными животными.

Заболевания верхних дыхательных путей у кошек (калицивирусные инфекции, вирусный ринотрахеит и хламидиозные инфекции) протекают, как правило, не настолько тяжело, чтобы проводить вакцинацию, за исключением случаев острых заболеваний у маленьких котят. Однако, как правило, котята контактируют с больными животными и заражаются вирусными заболеваниями в том возрасте, когда вакцинация еще не проводится. Таким образом, в большинстве случаев вакцинация против инфекций верхних дыхательных путей у кошек не принесет им особой пользы.

Недавно появилась вакцина против дерматомикоза. У меня нет опыта работы с ней, однако я не уверен в ее эффективности и безопасности. Дерматомикоз обычно является следствием глубокого нарушения функции иммунной системы и представляет собой хронический, а не острый процесс; таким образом, вакци-

нация в данном случае не направлена против основной причины болезни. Мне хотелось бы настоятельно рекомендовать вам не применять у домашних животных данную вакцину.

Вирус гепатита у собак (аденовирус-2) встречается крайне редко (критерий № 2). Лептоспироз также представляет собой крайне редкое заболевание (критерий № 2); кроме того, серотип бактерий, которые стали причиной нескольких случаев заболевания, не совпадает с серотипом лептоспир, которые используются при производстве вакцин²⁵. При данном заболевании перекрестного иммунитета между отдельными серотипами бактерий не возникает. Другими словами, лептоспирозный компонент комбинированной вакцины крайне редко предупреждает это заболевание у собак (критерий № 3). Кроме того, у бактериальной вакцины против лептоспироза отмечается масса побочных эффектов (критерий № 4).

Заболевания, причиной которых является коронавирус, не представляют собой угрозы для жизни собак (критерий № 1 и 2) — скорее угрозу для банковских счетов семей, где эти собаки живут. Так же обстоит дело с вакцинацией против болезни Лайма, за исключением, может быть, всего нескольких эндемичных районов (критерий № 2). На основании собственного практического опыта я могу утверждать, что вакцина против этой болезни часто вызывает появление симптомов, поразительно напоминающих истинную болезнь Лайма (критерий № 3). Специфический трахеобронхит у собак чаще всего протекает нетяжело (критерий № 1); в одном из исследований было доказано, что иммунизация против этой болезни не только малоэффективна, но и нецелесообразна²⁶. Вакцинацию против трахеобронхита у собак следует проводить только в тех случаях, когда действительно существует реальная угроза заражения.

Непосредственную угрозу для жизни собак представляют собой только чума и парвовирусная инфекция, однако большинство животных редко контактируют с больными особями. Собаки старше одного года редко заражаются парвовирусной инфекцией, и даже собаки в возрасте 8–12 месяцев достаточно легко переносят это заболевание.

У кошек, живущих дома, и у большинства собак с ограничением свободного передвижения очень мала вероятность «встретиться» свиром бешенства; таким образом, антирабическая

вакцинация обусловлена скорее законодательством, а не медицинскими показаниями. Однако риск заражения все же есть, в основном у собак и кошек без ограничения свободы передвижения, у животных в сельской местности и у бродячих животных. При однократной вакцинации в подавляющем большинстве случаев развивается стойкий пожизненный иммунитет. При ежегодной ревакцинации против бешенства велика вероятность развития хронического заболевания (см. раздел «Агрессивность и рабический миазм» в гл. 13 «Нервная система»).

В-четвертых, вакцинацию *никогда* не следует проводить у животных с признаками каких-либо заболеваний. По непонятной причине эта практика чрезвычайно распространена в ветеринарии, хотя производители вакцин и фактически все ветеринары-иммунологи в категоричной форме высказываются против этого. По моему мнению, введение любых вакцин животным с хроническими или любыми другими заболеваниями просто преступная небрежность.

Наиболее смелым решением является полный отказ от вакцинации (кроме положенной по закону вакцинации против бешенства) с осознанием риска заражения некоторыми острыми болезнями, которое возможно у невакцинированных животных, и принятием этого риска. Такое решение может возникнуть из-за опасения, что ущерб здоровью ваших питомцев нанесет даже единственная доза вакцины. Риск заражения у невакцинированных животных можно значительно снизить путем всемерного укрепления иммунной системы за счет полноценной пищи домашнего приготовления и кормления сырым мясом, а также за счет некоторого ограничения общения с другими животными щенков и котят до шестимесячного возраста. В дальнейшем в своей взрослой жизни невакцинированные животные будут значительно меньше страдать от аллергии и других хронических заболеваний, столь распространенных в настоящее время.

В большинстве случаев я не считаю вакцинацию необходимой и оправданной. Моя позиция в данном вопросе подтверждается многолетним опытом практической работы, изучением литературы и многочисленными наблюдениями. Я убежден, что ветеринарное сообщество в целом злоупотребляет введением вакцин. Однако решение относительно вакцинации своего питомца, естественно, каждый принимает индивидуально. Не-

смотря на то, что я убежденный противник вакцинации, я не призываю вас слепо следовать моим рекомендациям, а обдумать все «за» и «против» и принять собственное взвешенное решение на основе фактического материала, а не фантастических и необъяснимых страхов.

В вопросе о вакцинации должна быть свобода выбора. Домашние животные, как и дети, не имеют права голоса, поэтому за них этот выбор должны сделать мы. Однако основой этого выбора должна быть забота о здоровье наших питомцев. *Мы не можем отказаться от проведения антирабической вакцинации наших питомцев – это положено по закону. Но мы можем выступить за изменение закона, чтобы частота проведения антирабической вакцинации соответствовала научным данным.*

По закону требуется только один вид обязательной вакцинации. Однако особые условия работы некоторых ветеринарных лечебниц и питомников требуют иногда предварительной вакцинации животных против ряда заболеваний, причем в отдельных случаях по экстренным показаниям. Мне неоднократно приходилось слышать об унижениях тех людей, которые подвергают сомнению вопрос о необходимости вакцинации своих домашних животных. Их часто упрекают как в отсутствии необходимой квалификации для решения такого сложного вопроса, так и в отсутствии желания должным образом заботиться о них. Однако решение о необходимости вакцинации своего питомца каждый должен принимать самостоятельно, без чьего-либо настойчивого вмешательства. Именно мы и морально, и этически отвечаем за здоровье наших домашних животных; следовательно, именно нам следует решать все вопросы, связанные с поддержанием их здоровья, только на научной основе, а не на основе непроверенных данных.

Я не случайно избрал ветеринарию своей специальностью – я всем сердцем чувствовал, насколько животные нуждаются в нашем внимании и постоянной заботе. На основании своего многолетнего опыта работы я убедился, что именно неразумная вакцинация является причиной множества тяжелых болезней и у домашних животных, а, возможно, и у людей*.

* См. каталог издательства в конце книги – Коток А. «Беспощадная иммунизация» (Издательство «Гомеопатическая Медицина», Москва, 2004 г.)

Ежедневно я вижу доказательства своей правоты – у 75% животных (если не больше), которых приводят ко мне на прием, причина хронической болезни прямо или косвенно связана с вакцинацией. Для меня совершенно невыносима мысль об оскорблениях животных – так вот вакцинация, с моей точки зрения, это тоже оскорбление. Если мы не сможем защитить наше право (и право наших питомцев) самостоятельного выбора метода лечения, то мы рискуем потерять и это право, и самих питомцев.

В чем же заключается наилучший метод защиты от болезней? Первое и самое основное, о чем всегда надо помнить, – любую болезнь действительно легче предупредить, чем лечить. Залогом благополучной и долгой жизни домашних животных служит наша постоянная забота об укреплении их физического и психического здоровья, а не забота о количестве проведенных ревакцинаций. Основные факторы укрепления здоровья – это полноценное питание и соответствующий образ жизни. Значение полноценного питания для кошек и собак совершенно такое же, как и для человека. Поедание нашими питомцами мешков с сухим кормом – плохая замена настоящему мясу и другим натуральным продуктам. Основой полноценного питания хищников является сырое мясо с небольшим количеством вареных злаков (каши из различных круп) и овощей. Если возможно, то следует использовать экологически чистые продукты. Основой психического здоровья домашних животных являются длительные прогулки и игры на свежем воздухе, а также обязательные физические нагрузки. Кроме того, следует максимально оградить маленьких щенков и котят от воздействия стрессовых факторов, в том числе и за счет ограничения их общения с незнакомыми животными как потенциальными источниками острых инфекционных болезней.

Возможно, что рациональнее всего применять вакцины во время эпидемий, а не в качестве «общего» фактора укрепления здоровья, который, в сущности, не имеет никаких преимуществ, если животные не находились в контакте с больными особями. Удивительно, что во время эпидемии и во всех иных ситуациях, когда животные подвергаются реальному риску заражения инфекционными болезнями, не менее эффективным является также применение нозодов и *genus epidemicus* (см.

далее). Правильное применение нозодов обеспечивает адекватную защиту организма животных практически во всех ситуациях, однако ущерб здоровью, свойственный вакцинам, исключается почти полностью.

Нозод представляет собой гомеопатическое средство, которое готовится из продуктов болезни — т. е. выделений больного организма или некоторых других субстанций. В нозодах заключается энергия болезнетворного начала. *Genus epidemicus* представляет собой гомеопатическое лекарство, симптомы которого соответствуют симптомам у большинства заболевших во время данной эпидемии особей; таким образом, это гомеопатическое средство можно использовать для предупреждения заболевания. Такие гомеопатические препараты достаточно успешно применялись во время эпидемии холеры и желтой лихорадки.

Мне приходилось наблюдать ярко выраженное протективное действие нозодов у животных при их контакте с больными особями, а также при воздействии стрессовых факторов. Эти исследования проводилось не по классической методике сравнения результатов с контрольной группой, но никаких сомнений в эффективности назначения нозодов не было. На основании экспериментальных данных, а также исторических свидетельств применения нозодов можно предположить, что наиболее эффективным методом является их назначение во время контакта животных с инфицированными особями или же сразу после этого. Доказательств длительного протективного действия нозодов, как мне кажется, пока собрано недостаточно. Однако болезни, при которых целесообразно применение нозодов, представляют собой реальную угрозу только для животных препубертатного периода. Единственным условием для проведения нозодотерапии является отсутствие у животных вакцинации (как при кори у людей — см. выше). Для предупреждения острых заболеваний целесообразным является прерывистое применение нозодов вплоть до пубертатного периода животных. Однако на основании моего практического опыта я могу сказать, что чрезмерное увлечение нозодами также может спровоцировать развитие заболеваний — как и во всех делах, здесь необходим разумный и взвешенный подход.

Во всех случаях, когда возникает вопрос о нозодотерапии, хотелось бы порекомендовать вам посоветоваться с ветерина-

ром-гомеопатом. Нозоды можно приобрести только по рецепту профессионального гомеопата. Обычно я рекомендую применять соответствующие нозоды в потенции 30С 1–2 раза в неделю до шести-восьмимесячного возраста животных. В возрасте 6–8 месяцев нозодотерапию уже можно отменить. Некоторые гомеопаты рекомендуют применять их в течение всей жизни животных с интервалом 4–6 месяцев, однако, по моему мнению, это излишне. Мне приходилось наблюдать, что при такой методике нозодотерапия может вызвать серьезные осложнения, особенно при использовании высоких потенций (200С и выше). У большинства животных к началу пубертатного периода уже формируется соответствующая иммунная защита, поэтому необходимости в дальнейшем применении нозодов не возникает.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ РЕШИТЕСЬ ПРОВОДИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ?

Если вы все же считаете вакцинацию своего питомца необходимой, то прежде чем вы примете окончательное решение, я бы все-таки порекомендовал вам прочесть полностью данную главу.

Информация, приведенная в этом разделе, предназначена только для тех, кто не изменил своего решения проводить вакцинацию у щенков или котят. В целом я не являюсь сторонником вакцинации; возможно, что информация данного раздела поможет вам в какой-то степени ограничить количество прививок у ваших питомцев. Основными заболеваниями, для предупреждения которых вакцинация хоть в какой-то степени обоснованна, являются чума и парвовирусная инфекция у собак, вирусная панлейкопения у кошек (кошачья чума) и, естественно, бешенство у обоих видов.

В целом применение «убитых» вакцин, не содержащих в своем составе инфекционных агентов, является более безопасным и реже вызывает отдаленные последствия. Однако, по мнению доктора Рона Шульца (*Ron Schutz; University of Wisconsin-Madison School of Veterinary Medicine*), целесообразнее применять модифицированные живые вакцины, так как введение одной дозы такой вакцины вызывает настолько эффективную

иммунную реакцию, что в дальнейшем ревакцинация просто не требуется. В основном это касается вакцинации против чумы и парвовирусной инфекции у собак. Однако эффективность «убитых» вакцин против бешенства и панлейкопении у кошек точно такая же, как и эффективность модифицированных живых вакцин. По мнению д-ра Шульца, при применении модифицированной живой вакцины у 95% вакцинированных животных данного возраста создается стойкий иммунитет. Д-р Шульц предлагает следующий график вакцинаций:

1. Модифицированная живая вакцина против чумы у собак — в возрасте 10–12 недель.
2. Модифицированная живая вакцина против парвовирусной инфекции у собак — в возрасте 12–14 недель.
3. «Убитая» или модифицированная живая вакцина против вирусной панлейкопении кошек — в возрасте 10–12 недель.

Таким образом, если щенку в возрасте 10–12 недель вы введете одну дозу модифицированной живой вакцины против чумы, а через 2 недели — одну дозу модифицированной живой вакцины против парвовирусной инфекции, то с вероятностью до 95% у него разовьется стойкий пожизненный иммунитет против этих заболеваний. Подобным же образом одна доза вакцины против вирусной кошачьей панлейкопении предупредит это заболевание в течение всей жизни у 95% вакцинированных кошек. 1–2 дозы антирабической вакцины также дает стойкий пожизненный иммунитет у 95% вакцинированных животных, однако закон настаивает на ежегодной ревакцинации. У кошек вакцинацию против панлейкопении я рекомендую проводить только в тех случаях, когда полностью исключается возможность инфекционных заболеваний, которые вызываются калицивирусом или вирусом кошачьего ринотрахеита. Обычно у кошек я рекомендую интраназальное введение вакцины, которое имитирует естественное воздействие вируса; в некоторых случаях, однако, интраназальное введение вакцины может вызвать легкую форму заболевания. Интраназальную ринокалицивирусную вакцину следует вводить отдельно от вакцины против панлейкопении. Я бы не рекомендовал вам вводить кошкам вакцину против вирусной лейкемии, инфекционного перитонита, хламидиозной инфекции и дерматомикоза. Если когда-либо будет

изготовлена вакцина против вируса иммунодефицита у кошек, я также буду возражать против ее применения.

У собак я бы порекомендовал проводить вакцинацию только против чумы и парвовирусной инфекции, но ни в коем случае не одновременно. Если у вашей собаки есть реальный риск заболевания специфическим трахеобронхитом, то я бы порекомендовал вам ввести *bordetella-parainfluenza vaccine*, однако часто эта вакцина вызывает легкую форму заболевания. Я рекомендую проводить вакцинацию против специфического трахеобронхита не у всех собак, а только у тех, у кого есть реальная возможность заражения. Ни при каких обстоятельствах я не рекомендую вам проводить вакцинацию собак против коронавирусной инфекции, болезни Лайма и лептоспироза. Если у собаки есть реальная угроза заражения гепатитом, то в некоторых случаях проведение специфической вакцинации против гепатита является целесообразным. Совсем недавно я прочел о вакцине против *Giardia* и у меня создалось впечатление, что для большинства животных введение этой вакцины будет бесполезным. Кроме того, я подозреваю, что эта вакцина может вызвать серьезные нарушения в организме, поэтому я не рекомендую ее применение.

Антирабическая вакцинация, несмотря на значительную вероятность тяжелых последствий, должна проводиться в соответствии с законом как у кошек, так и у собак.

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Materia Medica



Описание гомеопатических средств

В этой главе представлены описания всех гомеопатических лекарств, назначение которых мы обсуждали в предыдущих главах. Воздействие гомеопатического средства на отдельные органы и системы подробно изложено в соответствующих разделах, поэтому в данном разделе повторяться не будут.

Если вы прочитали первые пять глав этой книги, посвященных основным принципам гомеопатии, то уже знаете, что каждое гомеопатическое лекарство вызывает комплекс определенных физических и психических симптомов в организме и излечивает эти симптомы. Этот комплекс симптомов принято называть «картина лекарственного средства», которая определяется не только свойствами лекарства и его воздействием на отдельные органы и системы (по данным испытаний на здоровых людях), но и влиянием на организм в целом. К этой категории относятся ментальные симптомы (изменения со стороны психической сферы и изменения поведения), общие симптомы (вовлечение в болезненный процесс двух и более частей тела) и модальности (чувствительность к различным факторам, которые могут улучшить или ухудшить состояние животного).

Выбор подобного (правильного) гомеопатического средства у животных часто определяется ментальными, общими симптомами и модальностями. Именно эти симптомы являются уникальными для каждого пациента, в то время как локальные проявления в большинстве случаев идентичны у разных особей. Например, у собаки во время грозы каждый раз возникает диарея. В данном случае симптом в виде усиленной перистальтики кишечника не представляет собой что-то особенное — этот симптом при диарее отмечается почти у всех собак. Однако симптом диареи при раскатах грома действительно необычный — именно он может привести нас к выбору правильного средства. Или, например, кошка страдает циститом с частым мочеиспусканием, при этом по характеру она чрезвычайно робкая, пугливая и прячется от незнакомых людей. Частое мочеиспускание характерно для всех кошек с явлениями цистита — в этом симптоме нет ничего удивительного. А вот робость, пугливость и боязнь незнакомцев (ментальные симптомы) действительно ценны и необычны — именно они помогут нам найти наиболее подобное средство.

В данной главе наибольшее внимание уделяется описанию

модальностей, общих и ментальных симптомов гомеопатических средств, при этом указывается тот раздел книги, где рассматриваются их локальные проявления. При необходимости описание некоторых препаратов дополняется более подробным описанием локальной симптоматики.

Правильность выбора гомеопатического средства следует подтвердить путем сопоставления его картины, представленной в *Materia Medica*, и картины симптомов у животного. Это позволит выбрать наиболее подобное средство из нескольких возможных.

Не следует забывать о чрезвычайно важном значении психических и поведенческих симптомов. Однако выбор подобного гомеопатического препарата при остром заболевании животного должен базироваться не на ментальных симптомах как таковых, а на их динамике, т. е. на изменении симптомов в течение заболевания. Это достаточно сложный момент. Если поведение животного не изменилось с начала острого заболевания, то при выборе подобного лекарства эти ментальные особенности не следует принимать во внимание. Однако, если в начале острого заболевания в поведении животного появились какие-либо особенности или странности (например, «неуправляемое» поведение), которые усиливаются по мере развития болезни, то скорее всего эти особенности представляют собой важный и ценный симптом, на основе которого можно найти правильное лекарство. Необходимо рассмотреть еще один вариант развития событий, который достаточно часто является трудным для понимания. В некоторых случаях подобным средством для лечения острых заболеваний является конституциональное лекарство (то, которое, наиболее полно соответствующее общему состоянию и поведению животного вне острого заболевания). Конституциональное средство будет действовать весь или почти весь период острого заболевания. Часто (но не всегда) симптомы острой болезни бывают подобны симптомам конституционального лекарства. Например, конституциональным препаратом вашей собаки является *Pulsatilla*. Если симптомы острого заболевания у нее проявляются неотчетливо и вам трудно подобрать подобное средство, то назначьте ей дозу *Pulsatilla*.

Если вы сомневаетесь в правильности вашего выбора, то необходимо проконсультироваться с опытным специалистом или

обратиться к более полным руководствам по гомеопатической *Materia Medica*. В конце книги приводится список литературы по гомеопатическому лекарствоведению, в котором есть десяти- и двенадцатитомные руководства, посвященные исключительно подробному описанию симптомов различных гомеопатических средств.

ОПИСАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В конце описания каждого средства, в абзаце под названием «Клиническое применение», перечислены все главы и разделы, в которых упоминалось данное средство, при этом разделы даны в кавычках, а названия глав выделены курсивом.

Aceticum acidum (уксусная кислота)

Показанием для большинства гомеопатических средств на основе кислот являются различные виды слабости, и *Aceticum acidum* — не исключение. Особенностью животных данного типа является выраженная слабость. Это состояние часто развивается после травмы, общей анестезии или кровотечения из различных естественных отверстий организма. Животные испытывают сильнейшую жажду и жадно пьют, если слабость не мешает им доползти до миски с водой.

Клиническое применение: см. «Укушенные раны у кошек и собак» и «Хирургические вмешательства» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Aconitum napellus (*Aconitum*) (борец реповидный)

Основным симптомом *Aconitum* является страх. Поведение этих животных почти всегда отличается чрезвычайной пугливостью, робостью и чувством панического страха, почти ужаса. Это лекарство особенно полезно при нервных потрясениях, например вследствие землетрясения, пожара или несчастного случая. Животные с симптомами *Aconitum* обычно беспокойные и торопливые. Чувство страха у них возникает или самопроизвольно, или вследствие травмы, полученной в результате несчастного случая.

Для этого лекарственного типа характерна внезапность появления симптомов заболевания. *Aconitum* применяется при лечении начальных проявлений болезни в виде внезапного повышения температуры и озноба. Часто эти симптомы развиваются сразу же после травмы, однако в некоторых случаях могут появляться после длительного пребывания на холодном сухом ветру. Животные типа *Aconitum* обычно зябкие.

Физические симптомы *Aconitum* отличаются внезапностью появления и интенсивностью. Для этого средства характерна сильная боль, выраженное покраснение, высокая температура. Чаще всего симптомов немного, но имеющиеся отличаются выраженной интенсивностью.

Страх и интенсивность симптомов способствуют чрезвычайной чувствительности организма к внешним воздействиям — шуму, яркому свету, прикосновению.

Клиническое применение: см. «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Конъюнктивит» в гл. «Орган зрения»; «Цистит» в гл. «Мочевыводящая система»; «Судорожные припадки» в гл. «Нервная система» и «Страх», «Лихорадка и инфекции», «Вакцинальные реакции» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Aletris falinosa (алетрис мучнистый)

Основной симптом *Aletris* — выраженная слабость. Животные этого типа кажутся дезориентированными, вялыми и неповоротливыми. Отмечается вялость движений задних конечностей, правая задняя лапа слабее левой. Склонность к запорам, обильное отхождение газов, после которого состояние улучшается. Это средство отличается воздействием на матку.

Клиническое применение: см. «Выделения из влагалища» в гл. «Репродуктивная система».

Allium сера (лук репчатый)

Если вы вспомните свои ощущения, когда вы чистили или резали луковицу, то сразу становится понятной основная идея и показания к назначению этого средства. Состояние животных *Allium* ухудшается в теплом помещении и ближе к вечеру, им лучше на открытом холодном воздухе. Их симптомы усиливаются при холодной влажной погоде. Отмечается левосторон-

ность симптоматики или перемещение симптомов слева направо. В основном это лекарство используется для лечения ранних стадий простуды.

Симптомы воспаления верхних дыхательных путей могут сопровождаться волчьим аппетитом, отрыжкой, коликообразными болями и вздутием живота. Такие животные могут быть беспокойными и печальными, особенно в утренние часы.

Клиническое применение: см. «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы» и «Конъюнктивит» в гл. «Орган зрения».

Aloe (сокоотринское алоэ)

Это средство готовится из растений семейства лилейных (отнюдь не из столетника *Aloe vera*). Наиболее частым показанием для назначения данного лекарства является нарушение функции печени и кишечника. Животные этого типа склонны к диарее с раздражающими выделениями.

Особенностью многих животных типа *Aloe* является раздражительность и неприязнь к окружающим. Они предпочитают оставаться в одиночестве, хотя и становятся дружелюбнее ближе к вечеру. Они особенно не любят, когда их пытаются заставить делать что-то против их воли, поэтому попытки приучить их к дисциплине могут вызвать в ответ агрессию. Часто животные этого типа малоподвижны.

Физические симптомы имеют склонность к ухудшению при жаркой влажной погоде и ранним утром. Улучшение состояния отмечается от пребывания на холодном воздухе. Ухудшение симптомов приводит к упадку сил, который иногда чередуется с периодами повышенной активности.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения».

Alumina (окись алюминия)

Наиболее ярким признаком этого средства является сухость и слабость. Шерсть животных этого типа кажется сухой и покрытой чешуйками, у них вырабатывается недостаточное количество слюны и слёзной жидкости, стул обычно сухой. Проявлением слабости кишечника является запор с редкими позывами к дефекации. У животных *Alumina* обычно отмечают

слабость и неповоротливость задних конечностей, в результате чего они пошатываются при ходьбе. Характерными симптомами являются худоба и недокормленность, часто животным этого типа хочется съесть что-нибудь неудобоваримое наподобие мела, золы или пыли. Несмотря на внутреннюю сухость, они предпочитают сухую пищу.

Их интеллект также ослаблен, они производят впечатление отупевших и дезориентированных. Реализация насущных ежедневных потребностей занимает у них обычно много времени. Как правило, им лучше на открытом воздухе и хуже в теплом помещении. Симптомы у животных *Alumina* склонны к циклическим изменениям, иногда с чередованием в течение дня.

Клиническое применение: см. «Запор» в гл. «Система пищеварения», «Дегенеративная миелопатия» в гл. «Нервная система» и «Выделения из влагалища» в гл. «Репродуктивная система».

Antimonium tartaricum (рвотный камень)

Основная область воздействия этого лекарства — слизистые оболочки, особенно слизистая дыхательных путей. Для животных данного типа характерна избыточная продукция слизи, что приводит к появлению влажных хрипов в легких. Обычно усилено образование слизи и в полости рта. В составе каловых масс также имеется слизь. Симптомы со стороны дыхательных путей сочетаются с диареей, рвотой и часто с болями в спине.

Обычно животные *Antimonium* выглядят подавленными и апатичными, предпочитая оставаться в одиночестве. Им хуже в теплом помещении и при теплой погоде.

Клиническое применение: см. «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы» и «Вакцинальные реакции» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Apis mellifica (пчела медоносная)

Вспомните о реакции организма на укус пчелы и вам сразу станет понятной основная идея и показания к назначению *Apis mellifica*. Основные симптомы *Apis* — покраснение и отек, причем отек может локализоваться в области кожи, молочных

желез, половых органов или глотки. Кожа в зоне отека блестящая и лоснящаяся. Отек отмечается и при заболеваниях внутренних органов, например легких или почек.

Животные *Apis* обычно беспокойные и суетливые, не любят одиночества. Некоторые производят впечатление угнетенных и апатичных. Большинство животных *Apis* не испытывают особой жажды, даже при повышении температуры тела. Они не переносят жару и жаркие помещения, всегда предпочитая холодный воздух. Они чрезвычайно чувствительны к любому прикосновению, даже к легкому поглаживанию.

Клиническое применение: см. «Зуд», «Участки раздражения кожи» и «Укусы и ужаливания» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Конъюнктивит» и «Язвы роговицы» в гл. «*Орган зрения*»; «Цистит» и «Почечная недостаточность» в гл. «*Мочевыводящая система*»; «Фимоз и парафимоз» и «Мастит» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Аллергические реакции» и «Вакцинальные реакции» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

Argentum nitricum (нитрат серебра)

Данное средство всегда применяли для профилактики заболеваний глаз, в частности бленнореи, у новорожденных. *Argentum nitricum* обладает выраженным воздействием на орган зрения. Множество других симптомов этого лекарства подобны симптомам сифилиса — эрозии и язвы на половых органах, язвы и воспалительные процессы в ротовой полости и глотке, выраженные нарушения нервной системы в виде дискоординации и паралича.

Животные *Argentum nitricum* обычно пугливые и стараются не уходить далеко от своего дома. Симптомы ухудшаются при всяком усилении беспокойства животных. Например, у них часто развивается диарея после перенесенного испуга.

Они предпочитают холодный воздух и не выносят жару. Многие животные данного типа очень любят сладкое, хотя при этом симптомы ухудшаются. Отмечается преимущественно левостороннее поражение.

Клиническое применение: см. «Вздутие живота» в гл. «*Система пищеварения*»; «Конъюнктивит» и «Язвы роговицы» в гл. «*Орган зрения*»; «Дегенеративная миелопатия» в гл. «*Не-*

рвная система».

Arnica montana (арника горная)

Arnica, наверное, одно из наиболее известных гомеопатических средств, которое назначается пациентам при мышечных болях, растяжениях связок и других видах травм. Это лекарство полезно при травматических повреждениях любого типа, особенно при ушибленных ранах с кровоподтеками. *Arnica* также применяется при лечении колотых ран для предупреждения абсцедирования.

Показанием для назначения данного препарата является выраженный болевой синдром после перенесенной травмы, вследствие чего животные становятся чрезвычайно чувствительны к прикосновению. Обычно подобное состояние развивается сразу же после травматического повреждения. Однако в некоторых случаях сильные боли беспокоят животных длительное время, когда, казалось бы, уже должно наступить облегчение — именно в такой ситуации и показана *Arnica*. Это средство также применяется при психической травме и ее последствиях в виде страха при приближении незнакомцев.

Поведение пациентов *Arnica* обычно беспокойное, из-за сильной боли они постоянно перемещаются в поисках наиболее удобного места. Это средство также применяется при лечении различных последствий как физической, так и психической и психологической травмы.

Клиническое применение: см. «Укусы и ужаливания» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Носовое кровотечение» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Травмы глазного яблока» в гл. «*Орган зрения*»; «Артрит», «Первая помощь при переломах», «Растяжение мышц и связок» в гл. «*Костно-мышечная система*»; «Травмы головного и спинного мозга» в гл. «*Нервная система*»; «Фимоз и парафимоз», «Орхит», «Травмы яичек», «Роды», «Боли в послеродовом периоде», «Инфекции в послеродовом периоде», «Ослабленные котята и щенки», «Мастит» и «Травмы молочной железы» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Абсцессы», «Укушенные раны у кошек и собак», «Резаные и рваные раны», «Кровотечение» и «Хирургические вмешательства» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

Arsenicum album (мышьяк белый)

Это одно из наилучших гомеопатических средств, особенно полезное при целом ряде острых состояний, с которыми вы можете встретиться. Основные симптомы *Arsenicum* относительно специфичны и постоянны — это зябкость, беспокойство, слабость и ухудшение симптомов после полуночи. Животные этого типа постоянно испытывают жажду, однако при тяжелых хронических болезнях жажда обычно отсутствует. Отмечается непереносимость холода, тогда как тепло облегчает большинство симптомов. Преобладает правостороннее поражение; выделения обычно жгучие и едкие.

Показанием к назначению *Arsenicum* является интоксикация организма, вызванная применением лекарств, вакцин, пищевым отравлением или выработкой эндогенных токсинов при заболеваниях печени и почек. Животные этого типа, казалось бы, проявляют интерес к пище, но фактически едят очень плохо и пьют мало жидкости — они или уходят, прихватив пищу, или раскачивают головой над миской с водой.

Как правило, животные *Arsenicum* беспокойны и пугливы (пугливость усиливает беспокойство) и нуждаются в строгом распорядке дня для противодействия своему чувству беспокойства. Они постоянно моются и ухаживают за своей шерстью (это особенно касается кошек). Из-за беспокойства эти животные не переносят одиночества — в одиночестве у них ухудшается большинство симптомов. В то же время они боятся незнакомых людей — как только в дом приходят гости, они сразу же прячутся и появляются только после их ухода.

Клиническое применение: см. «Кожный зуд» и «Ожоги пламенем и кипятком» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Воспалительные процессы полости рта» в гл. «*Ротовая полость, десны и зубы*»; «Рвота» и «Диарея» в гл. «*Система пищеварения*»; «Чиханье и выделения из носа» и «Кашель» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Конъюнктивит» и «Язвы роговицы» в гл. «*Орган зрения*»; «Цистит» и «Почечная недостаточность» в гл. «*Мочевыводящая система*»; «Аллергические реакции», «Укусы змей», «Реакции при введении некоторых лекарственных препаратов», «Эвтаназия», «Страх», «Отравление пищей и пищевыми отбросами», «Вакцинальные реакции» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

Arum tryphillum (аризема трехлисточковая)

В этом растении содержатся раздражающие компоненты, которые и определяют картину гомеопатического средства. Чаще всего показанием к назначению *Arum tryphillum* является воспаление слизистых оболочек. При помощи данного средства мне удавалось успешно излечивать воспалительные заболевания полости рта у кошек. Мне приходилось применять *Arum tryphillum* только при этих заболеваниях, однако, по моему мнению, хорошего эффекта также можно добиться при лечении воспалительных процессов полости носа, половых органов и ануса.

Животные этого типа обычно своенравны и раздражительны. Они расчесывают и лижут какой-либо участок тела до тех пор, пока не образуется кровоточащая рана, причем делают это не из-за зуда, а вследствие эмоционального напряжения. Обычно такие животные зябкие. Диарея может сопровождаться и другими симптомами. Все виды выделений раздражают кожу.

Клиническое применение: см. «Воспаление десен и воспалительные процессы в рта и десен» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*».

Asafoetida (ферула вонючая)

Это средство оказывает влияние на обмен кальция, поэтому одно из основных показаний для его назначения – заболевания костей и нарушение продукции молока. Обычно животные данного типа раздражительны, истеричны, беспокойны и чувствительны к внешним воздействиям. Для них характерна внезапная громкая отрыжка, регургитация, коликообразные боли, жидкий стул с шумным отхождением газов. Ухудшение симптомов обычно в покое и ночью, улучшение при движении на открытом воздухе.

Клиническое применение: см. «Гипертрофическая остеодистрофия» и «Рахит» в гл. «*Костно-мышечная система*» и «Недостаточная продукция молока» в гл. «*Репродуктивная система*».

Aurum (золото)

Это средство относится к глубоко действующим полихрестам. По моему мнению, единственным показанием для приме-

нения этого лекарства при самостоятельном лечении в домашних условиях является крипторхизм у молодых особей. Типичными симптомами *Aurum* у взрослых животных являются состояние депрессии, подавленности и непереносимость противоречий. Животные *Aurum* часто стонут во сне. Для них характерны болезни костной системы (признаки несовершенного остеогенеза) и сердца. Яркий свет вызывает у них чувство боли; часто встречаются воспалительные заболевания глаз. Для животных этого типа характерна «тяжелая» походка (золото представляет собой тяжелый металл).

Клиническое применение: см. «Крипторхизм» в гл. «Репродуктивная система».

***Baptisia* (бантизия красильная)**

Это средство показано при тяжелой лихорадке и выраженном воспалительном процессе. Ухудшение состояния часто развивается очень быстро. Типичными симптомами являются мышечные боли при воспалении и выделения гнилостного характера. Назначение *Baptisia* может быть полезным при тяжелой, истощающей диарее с примесью крови в каловых массах. Десны у животных часто приобретают коричневый цвет и кажутся испачканными землей, что является признаком нарушения микроциркуляции и развития септического состояния. Тяжесть состояния обусловлена выраженной интоксикацией. Обычно в таких случаях требуется помощь опытного ветеринара, однако назначение *Baptisia* ускоряет выздоровление.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения» и «Орхит» в гл. «Репродуктивная система».

***Baryta carbonica* (барий углекислый)**

Это средство обычно показано вялым, медлительным и робким животным. Их психическое развитие запаздывает и в некоторых случаях граничит с неполноценностью. Такие животные обычно прячутся, если к дому подходит незнакомый человек. *Baryta carbonica* обладает большой силой воздействия и обычно применяется в качестве конституционального средства. В домашних условиях это лекарство рекомендуется применять только при задержке психического и физического развития щенков и котят.

Клиническое применение: см. «Ослабленные котята и щенки» и «Отставание в росте» в гл. «Репродуктивная система».

***Belladonna* (белладонна)**

Данное средство полезно при многих острых состояниях. Для *Belladonna* характерна лихорадка, интенсивность симптоматики и быстрое развитие заболевания. У таких животных отмечается выраженное беспокойство, бред и признаки агрессивности. Особенности поведения этих животных часто обусловлены тем, что они страдают от сильных болей пульсирующего характера. При выраженной лихорадке и воспалении зрачки у них обычно расширены, десны горячие, ярко-красного цвета.

У животных *Belladonna* отмечается тенденция к правостороннему поражению. Часто ухудшение симптомов отмечается в три часа дня и после полуночи. Они не переносят ни жаркое солнце, ни холодный сквозняк. Во многих случаях выражена жажда.

Клиническое применение: см. «Участки раздражения кожи» и «Ушные гематомы» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Конъюнктивит» в гл. «Орган зрения»; «Артрит» в гл. «Костно-мышечная система»; «Судорожные припадки» и «Агрессивность» в гл. «Нервная система»; «Орхит», «Эклампсия» и «Мастит» в гл. «Репродуктивная система»; «Укусы змей», «Лихорадка и инфекции», «Перегревание» и «Вакцинальные реакции» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Bellis perennis* (маргаритка)**

Это гомеопатическое средство готовится из растения того же семейства, что и *Arnica*, и показания к его назначению также очень похожи на *Arnica*. В основном *Bellis* применяется при лечении посттравматических состояний, в частности при ушибах внутренних органов и связанной с этим болью. Например, если у животного ушибы внутренних органов в результате автотравмы, то целесообразно вначале назначить *Arnica*, а позже — *Bellis*. Назначение данного средства очень полезно после хирургических вмешательств и родов. Из-за боли животные *Bellis* не выносят прикосновений (этот симптом напоминает

симптом *Arnica*); боль облегчается при движении.

Клиническое применение: см. «Растяжения мышц и связок» в гл. «*Костно-мышечная система*»; «Фимоз и парафимоз», «Травмы яичек», «Боли в послеродовом периоде», «Мастит» и «Травмы молочной железы» в гл. «*Репродуктивная система*» и «Хирургические вмешательства» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Bismuthum* (висмут)**

Основным показанием к назначению *Bismuthum* являются заболевания системы пищеварения. Симптомы этого средства напоминают симптомы *Arsenicum* и *Phosphorus* (эти элементы обладают сходными химическими свойствами), однако рвота *Bismuthum* более интенсивная. Наблюдается болезненность при пальпации желудка, животные часто стонут, особенно при позывах к рвоте. Животные данного типа привязчивы, льнут к людям, так как боятся оставаться в одиночестве. Психические симптомы также напоминают симптомы *Arsenicum* и *Phosphorus*, но у данного средства они выражены сильнее. У животных *Bismuthum* отмечается ухудшение симптомов во время еды и в одиночестве.

Клиническое применение: см. «Рвота» в гл. «*Система пищеварения*».

***Borax* (бура)**

Для этого лекарства характерна тропность к слизистым оболочкам, что приводит к их воспалению и изъязвлению. Часто отмечаются воспалительные заболевания глаз, ротовой полости, половых органов и уретры, причем область воспаления чрезвычайно болезненна. Наиболее характерным психическим симптомом является выраженный страх при движении вниз. Например, у животных *Borax* возникает панический страх, когда вы опускаете их на пол после того, как держали на руках. Иногда они отказываются идти вниз по лестнице. Животных этого типа пугает внезапный шум и звуки выстрелов, даже отдаленных. Иногда легкий шум пугает их сильнее, чем громкий.

Клиническое применение: см. «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Энтропион» в гл. «*Орган зрения*»; «Неполноцен-

ное молоко» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Боязнь громких звуков» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Bryonia alba* (переступень белый)**

Данное средство успешно применяется при лечении заболеваний костно-мышечной системы с ухудшением симптомов при движении. Часто даже легкое движение вызывает у пациентов сильнейшую боль. Ухудшение при движении распространяется также и на другие проявления этого средства: например, из-за болей в прямой кишке при дефекации и натуживании у животных с симптомами *Bryonia* рефлексорно возникает запор. Эти питомцы часто испытывают сильнейшую жажду. Они не переносят жаркие помещения и жаркую погоду, чувствуя себя намного лучше на открытом холодном воздухе. Особенным симптомом этого средства является уменьшение боли при надавливании на пораженный участок, например на болезненный участок конечности – именно поэтому животные часто лежат на стороне поражения.

Клиническое применение: см. «Запор» в гл. «*Система пищеварения*»; «Кашель» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Недержание мочи» в гл. «*Мочевыводящая система*»; «Артрит» в гл. «*Костно-мышечная система*» и «Мастит» в гл. «*Репродуктивная система*».

***Caladium seguinum* (диффенбахия кровавая)**

Малое гомеопатическое средство, применяется при укусах насекомых с ощущением жжения и жалящей болью. Как и *Plantago*, это лекарство обладает способностью вызывать тошноту при вдыхании табачного дыма, поэтому используется как препарат, который помогает избавиться курения.

Клиническое применение: см. «Укусы насекомых» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Блохи» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Calcareo carbonica* (устричная известь)**

Гомеопатическое средство *Calcareo carbonica* готовится из устричных раковин и представляет собой лекарство-полихрест. Животные *Calcareo carbonica* обычно коренастые, мед-

длинные, неуклюжие, с тусклой шерстью и избыточным весом. Средство особенно полезно для очень молодых и очень старых животных.

Характерной чертой животных *Calcareo carbonica* является нарушение питания либо из-за отсутствия полноценной пищи в раннем возрасте, либо вследствие неспособности организма экстрагировать из пищи питательные вещества. Особенно часто у животных данного типа отмечается нарушение обмена кальция, что является причиной длительного заживления ран и замедленной консолидации переломов. У таких животных часто наблюдается отвращение к молоку (несмотря на предполагаемую ценность молока как источника кальция), при употреблении которого у них возникают расстройства пищеварения. От животных *Calcareo carbonica* часто исходит кислый запах, возможно вследствие нарушенного обмена веществ. Они с жадностью поедают грязь и подобные «субстанции» — возможно, таким образом организм пытается как-то устранить нарушение метаболизма.

Животные данного типа плохо переносят физические нагрузки, предпочитая спокойно лежать на одном месте и созерцать окружающий мир. Они часто испытывают чувство страха, возможно, еще и поэтому стремятся к спокойной обстановке. Страх обычно не имеет конкретной причины, однако они боятся всего нового и любых перемен в жизни. Изменение места жительства может убийственным образом сказаться на их жизни. Для таких животных даже прогулки часто затруднительны, поэтому они предпочитают держаться поближе к дому. В холодную погоду им лучше в доме, причем не только из-за боязливости, но и из-за зябкости. В общем это дружелюбные и преданные животные, хотя иногда с ними трудно общаться из-за их боязливости.

Многие симптомы этого средства связаны с нарушением процесса заживления. Животные этого типа обычно плохо развиваются, поэтому у них часто отмечаются аномалии развития костной ткани и других органов. К семейству *Calcareo* относятся несколько лекарств, три из которых описываются в этой главе. Для всех этих средств характерны признаки недостаточного питания, неправильное развитие и плохое заживление.

Клиническое применение: см. «Ретенционная подъязычная

киста», «Абсцессы и разрушение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Запор» в гл. «*Система пищеварения*»; «Энтропион» в гл. «*Орган зрения*»; «Артриты», «Рахит» в гл. «*Костно-мышечная система*»; «Крипторхизм», «Выделения из половых путей», «Экламписия», «Ослабленные котята и щенки», «Недостаточная продукция молока», «Неполноценное молоко» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Страх» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Calcarea fluorica* (фтористый кальций)**

Симптомы данного средства, связанные с нарушенным питанием и аномалиями развития костной ткани, выражены значительно сильнее, чем у *Calcarea carbonica*. Часто у животных этого типа асимметричная форма тела. Кости и зубы обычно слабые и ломкие, быстро разрушаются. Эти животные чрезвычайно болезненные, худые и недокормленные, с тусклой шерстью, очень светлой кожей и плохими зубами. Симптомы этого препарата встречаются гораздо реже, чем симптомы *Calcarea carbonica*.

Клиническое применение: см. «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Рахит» в гл. «*Костно-мышечная система*».

***Calcarea phosphorica* (фосфорнокислый кальций)**

Симптомы *Calcarea phosphorica* подобны симптомам *Calcarea carbonica*, однако нарушение питания у животных этого типа проявляется в виде недостаточной массы тела. Они обычно костлявые, однако не до такой степени, как животные типа *Calcarea fluorica*. Тело у них симметричной формы, однако они худые и слабые.

У животных *Calcarea phosphorica* отмечается нарушение пищеварения и боли в желудке после каждого приема пищи. Они чрезвычайно зябкие, причем конечности у них особенно чувствительны к холоду и часто холодные на ощупь. Они с жадностью поедают копчености и соленую пищу. У данного средства выражено стимулирующее влияние на процесс консолидации переломов и образования костной мозоли, поэтому при переломах и нарушениях роста костной ткани его назначение вполне

оправданно.

Клиническое применение: см. «Артриты», «Первая помощь при переломах», «Рахит» в гл. «*Костно-мышечная система*»; «Крипторхизм», «Беременность», «Эклампсия», «Ослабленные котята и щенки» и «Недостаточная продукция молока» в гл. «*Репродуктивная система*».

Calcareo sulphurica (сернокислый кальций)

У большинства животных *Calcareo sulphurica* отмечаются густые слизистые или гнойные выделения желтоватого цвета из естественных отверстий организма. Для таких особей характерно нарушение процессов заживления — именно поэтому у них постоянно обнаруживаются очаги инфекции, от которых они никак не могут избавиться. Данное средство особенно полезно при простуде, выделениях из носа, воспалении глаз и при рецидивирующих абсцессах. Для животных этого типа характерна раздражительность или беспокойство по вечерам.

Клиническое применение: см. «Чиханье и выделения из носа» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Конъюнктивит» и «Травмы глазного яблока» в гл. «*Орган зрения*»; «Абсцессы» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

Calendula officinalis (ноготки лекарственные)

Calendula является хорошо известным эффективным средством для лечения ран, ссадин, воспалительных процессов и нагноений, которое выпускается в виде настойки, раствора на безалкогольной основе, геля, мази и крема. Эффективность данного препарата не зависит от вида лекарственной формы. *Calendula* обладает выраженными антисептическими и репаративными свойствами. Местно для промывания ран применяется раствор, состоящий из 10 – 30 капель настойки *Calendula* и четверти чайной ложки поваренной соли, разведенных в одном стакане кипяченой (или дистиллированной) воды. Особенно быстро под воздействием этого лекарства заживают поверхностные кожные раны. Назначение *Calendula* для лечения глубоких кожно-мышечных ран нецелесообразно, так как после быстрого стягивания краев кожи в глубине раны может остаться замкнутая полость с гнойным отделяемым, для санации кото-

рой потребуется произвести разрез, удалить гной и дренировать рану. Поэтому при наличии глубоких ран рекомендуется вместо *Calendula* назначать *Hypericum*.

Потенцированная форма *Calendula* используется при лечении многих заболеваний. Это средство значительно облегчает боли при поверхностных и глубоких рваных ранах. При приеме внутрь, так же как и при местном применении, *Calendula* стимулирует процессы заживления. Данное лекарство стимулирует заживление при разрывах и растяжениях мышц.

Клиническое применение: см. «Травмы глазного яблока» в гл. «Орган зрения»; «Разрывы мышц» в гл. «Костно-мышечная система»; «Абсцессы» и «Резаные и рваные раны» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Cantharis (шпанская мушка)

Шпанская мушка содержит химический компонент, раздражающий кожу и слизистые оболочки, в том числе слизистые мочевыводящих путей, вызывая воспаление, напоминающее цистит с частыми позывами к мочеиспусканию. Шпанская мушка обладает свойствами афродизиака, раздражая гениталии и провоцируя половое возбуждение.

Гомеопатическое средство *Cantharis* способно излечивать подобные состояния. Большинство показаний к назначению данного лекарства связаны с его воздействием на участки раздраженной воспаленной кожи и слизистых оболочек с внезапно возникающим чувством сильного жжения. Эти симптомы часто сопровождаются образованием пузырьков на слизистой оболочке ротовой полости или влагалища. Таким образом, характерными симптомами *Cantharis* у животных являются жжение, раздражение слизистой оболочки ротовой полости, частые позывы к мочеиспусканию и гиперсексуальное поведение.

Животные *Cantharis* иногда бывают чрезвычайно раздражительными. Раздражающее влияние на организм, очевидно, отражается на состоянии психоэмоциональной сферы, вызывая реакцию по типу стресса. При испытаниях данного препарата многие люди рассказывали об ощущении жжения в головном мозге. Вероятно, именно поэтому особи данного типа чрезвычайно беспокойны и гиперсексуальны.

Клиническое применение: см. «Укусы и ужаливания»,

«Ожоги пламенем и кипятком» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Цистит» в гл. «*Мочевыводящая система*».

Carbo vegetabilis (уголь древесный)

Данное средство готовится из золы, полученной при сжигании растительных субстанций. Состояние, соответствующее *Carbo vegetabilis*, можно описать как недостаток жизненной энергии, которая «вся выжжена огнем». Эти животные обычно вялые и медлительные, со сниженной температурой тела, либо имеют избыточный вес, либо истощены. Голова у животных данного типа часто горячая на ощупь, им обычно нравится находиться на свежем воздухе или даже на сквозняке (как будто они хотят раздуть в себе пламя и впитать его энергию). У таких животных часто бывают коллапсы; из-за нарушенного кровообращения и внутреннего холода десны у них приобретают синюшный оттенок. Язык и полость рта обычно холодные на ощупь. Часто отмечается отхождение газов вследствие нарушенного пищеварения — им не хватает энергии для переваривания пищи. Данное лекарство показано животным при наличии у них слабости, сниженной температуры тела и синюшности слизистых оболочек вследствие заболеваний и травматических повреждений.

Клиническое применение: см. «Вздутие живота» в гл. «*Система пищеварения*»; «Ослабленные котята и щенки» в гл. «*Репродуктивная система*».

Carbolicum acidum (карболовая кислота)

Химическое вещество «карболовая кислота» имеет свойства анестетика и антисептика. Данное гомеопатическое средство полезно при тяжелых посттравматических воспалительных процессах. Некоторые симптомы *Carbolicum acidum* подобны симптомам *Carbo vegetabilis*, в частности чрезвычайно выраженная слабость и вялость. Вспомните, что слабость — это симптом, общий для всех средств, приготовленных из кислот. Для животных этого типа характерны выраженные воспалительные процессы в ротовой полости, которые сопровождаются зловонным дыханием. Показанием для назначения *Carbolicum acidum* в острых случаях являются посттравматические состояния.

Клиническое применение: см. «Укусы и ужаливания» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Резаные и рваные раны» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Carduus marianus (расторопша пятнистая)

Аллопатический препарат, изготовленный из данного растительного сырья, обладает способностью стимулировать функцию печени. Гомеопатическое средство *Carduus marianus* мне приходилось применять достаточно редко – в низких потенциях оно назначается при непереносимости животными растительной пищи. Кроме того, показаниями к назначению данного лекарства являются состояние подавленности и уныния, рвота с примесью желчи и запор с твердым узловатым стулом.

Клиническое применение: см. «Нарушение функции печени» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Caulophyllum

(стеблелист василисниковидный)

Препарат, изготовленный из данного растительного сырья, издавна применялся в акушерстве для стимуляции тонуса матки в родах. Гомеопатическое средство *Caulophyllum* также обладает способностью вызывать роды или ускорять их в тех случаях, когда имеются нарушения нормальной родовой деятельности. Животные с симптомами *Caulophyllum* обычно нервные и изнуренные. Мне приходилось назначать данное лекарство исключительно при осложнениях со стороны матки при беременности или в послеродовом периоде.

Клиническое применение: см. «Выделения из половых путей», «Беременность», «Роды» и «Заболевания в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система».

Causticum (каустическая сода)

Causticum получается при химической реакции гашеной извести с сульфатом калия.

Causticum показан слабым и старым животным с выраженными нарушениями здоровья вследствие хронических заболеваний. Основные симптомы данного средства – слабость, зябкость и параличи. Это глубоко действующее лекарство, поэто-

му его следует применять только по назначению специалиста-гомеопата, за исключением тех случаев, о которых ранее говорилось в этой книге. Не следует назначать *Causticum* до или после применения *Phosphorus*, так как в редких случаях возможно развитие нежелательной реакции.

Клиническое применение: см. «Ожоги пламенем и кипятком» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Недержание мочи» в гл. «Мочевыводящая система».

Cedron (симаруба цедрон)

При местном применении это средство является антидотом при укусах змей и насекомых. У пораженных животных отмечаются боли в височных областях и за глазными яблоками. Чаще всего *Cedron* назначается пациентам в странах с тропическим климатом.

Клиническое применение: см. «Укусы змей» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Chamomilla (ромашка аптечная)

В низких потенциях данное средство обладает успокаивающим действием; такой же эффект оказывает и отвар из листьев *Chamomilla*. Чаще всего *Chamomilla* назначается при прорезывании зубов у котят и щенков в возрасте трех-шести месяцев. У животных *Chamomilla* обычно отмечают особенности поведения в виде беспокойства и раздражительности. Создается впечатление, что животное стремится к тому, чтобы его приласкали и утешили, но в то же время противится этому. Животные успокаиваются, только когда их берут на руки; беспокойство и поскуливание возобновляются, когда их опускают на пол.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения» и «Неполноценное молоко» в гл. «Репродуктивная система».

Chelidonium majus (чистотел большой)

Chelidonium является органоспецифическим средством с тропностью к печени и желчевыводящим путям. В некоторых случаях лекарство очень полезно при гепатите, однако для лечения этой болезни лучше предпочесть конституциональное средство (если его удастся установить). *Chelidonium* назнача-

ется при тяжелом течении заболевания и прогрессирующем ухудшении состояния. Кроме того, данное лекарство показано вялым и медлительным животным с депрессией ментальной сферы. Такие животные могут быть вздорными и задиристыми по характеру. Обычно они предпочитают горячую пищу и питье. При обструкции желчевыводящих путей у них может быть стул цвета глины. В тяжелых случаях обструкции развивается желтуха с соответствующим цветом десен, белков глаз и даже кожи, причем у животных проще всего желтушность кожных покровов определить по цвету кожи ушей. Животным с подобной клинической картиной требуется помощь врача-ветеринара, однако данное лекарство может быть полезным в дополнение к обычному лечению.

Клиническое применение: см. «Нарушения функции печени» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Chimaphila umbellata (зимолюбка зонтичная)

Данное средство обладает тропностью к органам мочевыводящей системы. Характерной особенностью животных с симптомами *Chimaphila* является сильное натуживание при мочеиспускании, особенно перед началом отхождения мочи. Симптомы *Chimaphila* у животных обычно провоцируются холодной сырой погодой или длительным сидением на холодных камнях. Обычно такие животные истощенные, с потертой шерстью. Основным показанием к назначению этого средства являются заболевания простаты.

Клиническое применение: см. «Заболевания простаты» в гл. «Репродуктивная система».

China officinalis (хинное дерево)

Гомеопатам часто приходится обращаться к помощи *China officinalis*.

China готовится из коры хинного дерева, лечебные свойства которой были хорошо известны индейцам Перу. Из коры хинного дерева получают хинин — основное лекарственное средство при малярии. *China officinalis* была первым лекарственным препаратом, испытанным С. Ганеманом. Именно при испытании данного средства С. Ганеман выяснил, что симптомы, которые

развиваются у человека после приема *China*, подобны симптомам малярии. Гомеопатия как наука многим обязана этому лекарству — именно благодаря свойствам *China officinalis* С. Ганеману удалось совершить величайшее открытие.

Одним из основных общих симптомов этого препарата является выраженная слабость во время болезни, связанная с потерей физиологических жидкостей. Подобная потеря жидкости наблюдается при диарее, частой рвоте, воспалительном процессе с нагноением, кровотечении или усиленной экскреции мочи. Состояние *China* характеризуется периодичностью симптомов или чередованием периодов улучшения и ухудшения. Для животных с симптомами этого средства также характерно чередование дней хорошего и плохого самочувствия, однако по мере развития заболевания эта разница нивелируется.

Для *China* характерно ухудшение состояния ночью, при пребывании на холодном воздухе и сквозняке, а также при физическом напряжении. Состояние улучшается в теплом помещении и в покое. Характерным симптомом является ухудшение при легком прикосновении, однако при надавливании большинство симптомов улучшаются.

Как правило, такие животные часто болеют и становятся апатичными и малообщительными. Психические симптомы, так же как и физические, склонны к цикличности, при этом периоды подавленности могут сменяться периодами хорошего настроения. Обычно у животных *China* отмечаются поражения многих органов и систем, в частности печени, почек, кишечника, легких и т. п.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения»; «Почечная недостаточность» в гл. «Мочевыводящая система» и «Реакции при приеме лекарственных препаратов» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Chininum arsenicosum, Chininum muriaticum, Chininum sulphuricum* (хинина арсенат, хинина хлорид, хинина сульфат)**

По моему мнению, эти средства имеют много общего в своих показаниях и применении. Мне приходилось назначать данные препараты при почечной недостаточности у кошек, так

как для *China*, входящей в состав всех средств данной группы, характерна слабость, связанная с потерей физиологических жидкостей. Одно из этих лекарств обязательно окажет лечебное воздействие в тех случаях, когда у животных с почечной недостаточностью в фазе полиурии развивается слабость. Приблизительная картина симптомов этих гомеопатических средств получается при комбинации *China* с *Arsenicum album*, *Natrum muriaticum* и *Sulphur*.

Клиническое применение: см. «Почечная недостаточность» в гл. «Мочевыводящая система».

Cicuta virosa (вех ядовитый)

При состояниях, соответствующих *Cicuta*, отмечаются либо заболевания головного мозга, либо выраженное нарушение его функции. У животных с симптомами данного средства имеется склонность к сильнейшим судорожным припадкам, спазмам, конвульсивным сокращениям мышц и подергиваниям. Голова часто запрокинута, отмечается сходящееся или (чаще) расходящееся косоглазие. Мне приходилось использовать *Cicuta* в основном при последствиях травм головного мозга. В подобных случаях, конечно, необходимо лечение и наблюдение врача-ветеринара, однако при совпадении симптомов болезни и картины средства *Cicuta virosa* часто оказывает существенную помощь в лечении. При травме головного мозга средней тяжести особенностью поведения таких животных является их желание находиться в одиночестве, избегая общества.

Клиническое применение: см. «Травмы головного и спинного мозга» в гл. «Нервная система» и «Эклампсия» в гл. «Репродуктивная система».

Cina (цитварная полынь)

Картина симптомов данного средства во многом сходна с картиной *Chamomilla*. *Cina* обычно назначается животным молодого возраста, для которых характерны раздражительность и постоянное недовольство. В отличие от животных *Chamomilla*, которые всегда успокаиваются на руках, животные *Cina* постоянно просятся на руки, но на руках не становятся спокойнее.

Такие животные часто бывают толстыми и неряшливыми,

подобно щенкам с гельминтозом, и заболевания у них, как правило, сопровождаются глистной инвазией. Данное средство оказывает влияние скорее на последствия глистной инвазии, чем на устранение гельминтов. У щенков (реже у котят) с симптомами *Cina* часто отмечаются судорожные подергивания мышц, во время которых они даже могут укусить. Обычно симптомы глистной инвазии у щенков выражены в возрасте от 1 до 6 месяцев; преобладает инвазия круглыми видами гельминтов.

Клиническое применение: см. «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы».

Cinnabaris (киноварь)

По химическому составу *Cinnabaris* представляет собой сульфид ртути; соответственно в картине симптомов данного средства можно найти симптомы как *Mercurius* (выраженное воспаление, особенно половых путей), так и *Sulphur* (краснота и жажда). У животных с симптомами *Cinnabaris* часто наблюдается воспаление глаз. Симптомы улучшаются на открытом воздухе и ухудшаются при прикосновении и ближе к вечеру. Иногда животные *Cinnabaris* бывают раздражительными; после еды у них обычно грустное настроение; они часто вздрагивают во сне. Основным показанием для назначения этого средства в острых случаях является баланопостит и воспаление полового члена.

Клиническое применение: см. «Выделения из половых путей» и «Фимоз и парафимоз» в гл. «Репродуктивная система».

Clematis erecta (ломонос прямой)

Животные с симптомами данного средства обычно сонливые и дезориентированные. Ухудшение симптомов отмечается ночью, особенно в тепле. Одним из характерных симптомов является отек лимфатических узлов, которые часто уплотнены и болезненны при прикосновении. Подобные симптомы также отмечаются и со стороны молочных желез. У *Clematis erecta* выражена тропность к ткани яичек.

Клиническое применение: см. «Орхит» в гл. «Репродуктивная система».

Cocculus (кукольван)

Одним из наиболее характерных симптомов данного средства является укачивание при движении, особенно при поездках в автомобиле. Нам часто приходится назначать *Cocculus* тем животным, у которых во время движения автомобиля возникает рвота (однако *Cocculus* далеко не единственное средство, которое помогает в подобных случаях). Другое показание для назначения этого препарата – слабость мышц, парезы и параличи, поражающие только одну сторону тела. Часто отмечается дрожание конечностей. Животные с симптомами *Cocculus* обычно грустные, дезориентированные и заторможенные. Контакттировать с ними иногда достаточно трудно из-за интровертированности их характера. Им не нравится холод – они предпочитают спокойно лежать в теплом помещении.

Клиническое применение: см. «Дегенеративная миелопатия» в гл. «Нервная система».

Coccus cacti (кошениль мексиканская)

Подобно *Cantharis*, симптомы гомеопатического средства *Coccus cacti* связаны со слизистыми оболочками, при этом отмечается усиленное образование густой слизи. Состояние, соответствующее *Coccus cacti*, обычно развивается после длительного пребывания на холоде. Симптомы ухудшаются в положении лежа, особенно ночью, поэтому такие животные часто чрезвычайно беспокойны. Показанием для назначения этого препарата в острых случаях является обструкция уретры слизистой пробкой, что чаще встречается у котов.

Клиническое применение: см. «Обструкция уретры и катетеризация» в гл. «Мочевыводящая система».

Colchicum (шафран луговой)

Colchicum обладает тропностью к суставам и пищеварительному тракту. Одним из характерных симптомов данного средства являются выраженные боли в суставах, с усилением при движении. Болезненность может быть настолько сильной, что при прикосновении животные начинают буквально выть от боли. Из-за интенсивных болей состояние таких особей может быстро ухудшиться вплоть до развития сильнейшей слабости и коллапса. Часто животные с симптомами данного средства

чрезвычайно беспокойны и раздражительны. Ключевым симптомом *Colchicum* является тошнота, особенно при виде и запахе пищи. Иногда даже воспоминание о пище вызывает тошноту, поэтому часто животные *Colchicum* истекают слюной и обливаются, когда их зовут поесть (слюнотечение возникает скорее из-за надвигающейся рвоты, а не вследствие условного рефлекса по Павлову). Животные *Colchicum* обычно зябкие и чувствительные к внешним воздействиям.

Клиническое применение: см. «Вздутие живота» в гл. «Система пищеварения» и «Артрит» в гл. «Костно-мышечная система».

Colocynthis (колоцинт обыкновенный)

Это средство во многом сходно с *Colchicum* по своей тропности к суставам и пищеварительному тракту. Однако боли *Colocynthis* не столь интенсивные. Тем не менее боли в кишечнике заставляют пациентов сгибаться пополам, что иногда приносит облегчение. Боли *Colocynthis* обычно облегчаются при надавливании, поэтому иногда кошки или собаки с симптомами этого средства ложатся животом на подушку или похожие предметы. Характерно внезапное появление спастических болей в животе, часто после вспышки гнева или других сильных эмоций. Симптомы данного средства ухудшаются на холоде и улучшаются в тепле.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения»; «Артрит» в гл. «Костно-мышечная система» и «Фимоз и парафимоз» в гл. «Репродуктивная система».

Copium maculatum (болиголов пятнистый)

Именно этот яд выпил приговоренный к смерти Сократ. *Copium* вызывает развитие восходящего паралича, который начинается с нижних конечностей и постепенно поднимается вверх. В таких случаях смерть наступает вследствие паралича дыхательной мускулатуры и сердечной мышцы. Паралич сопровождается ощущением тяжести в пораженной области. Одним из характерных признаков *Copium* у животных является паралич задних конечностей, при этом их походка становится ковыляющей — создается впечатление, будто задние конечности слишком тяжелые.

Для *Conium* характерна тропность к железистой ткани. Показанием для его назначения является воспаление и выраженное уплотнение («каменистая» плотность) лимфоузлов, молочных желез, простаты и яичек. Животные этого типа обычно медлительные, слабые, дезориентированные и заторможенные. Они не переносят яркий свет и предпочитают находиться в темноте. Часто симптомы *Conium* возникают у старых животных. *Conium* в основном назначается при лечении хронических заболеваний – в этих случаях лечение целесообразно проводить у ветеринара-гомеопата. Однако в случаях некоторых острых заболеваний можно попытаться назначить данное средство самостоятельно в домашних условиях.

Клиническое применение: см. «Травмы глазного яблока» в гл. «Орган зрения»; «Дегенеративная миелопатия», «Паралич норных собак», «Травмы головного и спинного мозга» в гл. «Нервная система» и «Фимоз и парафимоз», «Орхит», «Травмы яичек», «Заболевания простаты» и «Травмы молочной железы» в гл. «Репродуктивная система».

Soraiva (копаифера лекарственная)

Soraiva также является средством растительного происхождения, эффективным при раздражении слизистых оболочек и выделениях из естественных отверстий организма неприятного зловонного характера. Животные с симптомами данного препарата необычайно чувствительны к шуму и вздрагивают почти при каждом звуке. Картина симптомов *Soraiva* напоминает *Seria*, однако это средство не столь широко известно.

Клиническое применение: см. «Выделения из влагалища» в гл. «Репродуктивная система».

Crotalus horridus (чернохвостый гремушник)

Данное гомеопатическое средство готовится из яда змеи – чернохвостого гремушника (отряд «гремучие змеи»). Яды многих змей вызывают кровотечение, что является одним из основных показаний к назначению соответствующих гомеопатических лекарств. *Crotalus* показан в тех случаях, когда при кровотечении темная кровь вытекает медленной непрерывной струей. Это средство эффективно при лечении инфицированных ран и гангрены. Со стороны психоэмоциональной сферы у

животных *Crotalus* отмечается либо состояние угнетения и подавленности, либо возбуждение, напоминающее делирий. И в том и в другом случае у них выражено стремление убежать. Часто симптомы имеют правостороннюю локализацию.

Клиническое применение: см. «Ушные гематомы» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Отравление пищей и пищевыми отбросами» и «Кровотечение» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Croton tiglium (критон слабительный)

Масло из семян *Croton* действует раздражающе на кожу и слизистые оболочки, вызывая появление сыпи, появляющуюся после контакта с ядовитым плющом. В некоторых случаях с помощью данного гомеопатического средства удастся полностью излечить подобное состояние. Отравление семенами *Croton* у кошек и собак встречается очень редко, однако при контакте с ними может возникнуть кожная сыпь, которая излечивается приемом *Croton*. Это средство обладает выраженным воздействием на кишечник и применяется при лечении диареи; в этих случаях жидкий стул имеет желтоватый цвет. Усиление диареи отмечается при употреблении даже незначительных количеств пищи и жидкости. Слизистые оболочки обычно гиперемизированы и воспалены.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения».

Drosera (росянка круглолистная)

В основном это лекарство используется при лечении кашля; в частности, у людей типа *Drosera* с успехом назначается при коклюше. Животные с симптомами *Drosera* обычно раздражительные и беспокойные, особенно по ночам и в одиночестве. Симптомы этого средства схожи с симптомами *Arsenicum*, однако кашель *Drosera* более выраженный. Ухудшение отмечается ночью и в положении лежа.

Клиническое применение: см. «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы».

***Dulcamara* (сладко-горький паслен)**

Ключевым симптомом *Dulcamara* является ухудшение от сырости (особенно в сочетании с охлаждением), в сырую погоду или сыром климате. Заболевания *Dulcamara* часто возникают вследствие быстрого переохлаждения животных после перегрева, например переохлаждение после интенсивного физического перенапряжения. Вслед за переохлаждением может развиваться кашель, диарея и поражение кожи.

Клиническое применение: см. «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы».

***Echinacea* (эхинацея узколистная)**

Многим знакомо жаропонижающее и противовоспалительное действие лекарств, изготовленных из этого растения. *Echinacea* стимулирует иммунную систему, что позволяет организму лучше противостоять развитию инфекции. Гомеопатическое средство *Echinacea* назначается при тяжелых воспалительных процессах, когда организм истощен и ослаблен вследствие серьезной болезни. У животных с симптомами данного лекарства часто отмечаются значительные местные поражения тканей. Обычно такие особи настолько сильно ослаблены, что производят впечатление дезориентированных, однако быстро раздражаются, если их заставляют делать что-то против их воли.

Клиническое применение: см. «Выделения из влагалища» и «Инфекции в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система»; «Укусы змей» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Erigeron* (кониза)**

Это малое гомеопатическое средство в основном назначается при кровотечениях из естественных отверстий организма с выделением крови ярко-красного цвета. Кровотечение усиливается при движении и купируется в покое.

Клиническое применение: см. «Кровотечение» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Eucalyptus* (эвкалипт)**

Эвкалиптовое масло раздражает слизистые оболочки, вызывая усиление образования слизи. Гомеопатическое лекарство из *Eucalyptus* назначается в основном при состояниях с избыточным образованием слизи. Для этого средства характерно поражение желудка, легких и почек. Животные с симптомами *Eucalyptus* обычно беспокойны и склонны к постоянным перемещениям с одного места на другое.

Клиническое применение: см. «Вздутие живота» в гл. «Система пищеварения» и «Почечная недостаточность» в гл. «Мочевыводящая система».

***Euphrasia* (очанка лекарственная)**

Как аллопатический препарат, так и гомеопатическое средство из этого растения в основном назначается при травмах и воспалительных заболеваниях глаз. Животные с симптомами *Euphrasia* часто вздрагивают во сне, будто просыпаясь от шума. Симптомы *Euphrasia* ухудшаются от жары, сильного ветра, пребывания на солнце и внутри помещения; такие животные обычно предпочитают находиться на открытом воздухе вне помещения.

Клиническое применение: см. «Конъюнктивит» и «Травмы глазного яблока» в гл. «Орган зрения».

***Ferrum metallicum* (железо металлическое)**

Данное гомеопатическое средство обычно назначается ослабленным животным молодого возраста. Любое физическое усилие приводит к полному упадку сил. Часто такие животные ведут себя беспокойно, особенно ночью; их трудно приучить к дисциплине, они раздражаются, если их заставляют делать что-либо против их воли. Симптомы со стороны внутренних органов часто сопровождаются кровотечениями из естественных отверстий организма. Картина симптомов *Ferrum metallicum* напоминает *Arsenicum album*, однако у животных *Ferrum* более выражена раздражительность; как правило, они предпочитают оставаться в одиночестве. Для животных *Arsenicum* характерна сильная жажда, тогда как у животных *Ferrum* обильное питье может вызвать ухудшение самочувствия. Обычно животные этого типа не любят яйца — при упот-

реблении яиц в пищу их состояние может ухудшиться.

Клиническое применение: см. «Рвота» в гл. «Система пищеварения».

Ferrum phosphoricum (фосфат железа)

Данное гомеопатическое средство обладает выраженным воздействием на развитие воспалительного процесса и лихорадки, особенно на ранних стадиях заболевания. Оно особенно полезно при воспалительных заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, при которых воспаление сопровождается кровотечением. У животных с симптомами *Ferrum phosphoricum* обычно отмечают слабость, снижение веса и анемия. Они часто бывают раздражительны, что свойственно *Ferrum metallicum*, однако раздражительность чередуется с потребностью в обществе, что характерно для *Phosphorus*. Ухудшение симптомов обычно отмечается ночью и ранним утром. Самое тяжелое время суток для пациентов этого типа — от 4 до 6 часов утра.

Клиническое применение: см. «Носовое кровотечение» и «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Лихорадка и инфекции» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Ferrum picricum (железо пикриновое)

Для животных с симптомами *Ferrum picricum* характерны слабость (выраженная даже сильнее, чем у *Ferrum metallicum*) и непереносимость физического напряжения, которое может стать причиной глубоких нарушений функций различных органов. Одним из основных показаний к назначению этого препарата является старческое увеличение простаты (не связанное со злокачественными новообразованиями).

Клиническое применение: см. «Заболевания простаты» в гл. «Репродуктивная система».

Fluoricum acidum (плавиковая кислота)

Фтор обладает способностью накапливаться в костной ткани, однако его избыток приводит к тому, что кости становятся слабыми. Очевидно, что длительное употребление фторированной воды способствует разрушению костей и зубов. Гомеопатическое средство *Fluoricum acidum*, подобно *Calcare*

fluorica, нормализует содержание фтора в костной ткани и зубах. Показания и воздействие на организм этих гомеопатических средств во многом сходны, однако картина симптомов *Fluoricum acidum* более характерна для старых животных с присущими этому возрасту разрушением и дегенерацией. У животных с симптомами *Fluoricum acidum* отмечаются выраженные дегенеративные изменения тканей организма вплоть до образования язв. Такие животные обычно плохо переносят жару и состояние покоя; симптомы улучшаются при движении и на холоде. У них отмечается необычная модальность — улучшение от купания в холодной воде. Часто они равнодушны к своим опекунам и членам семьи, в которой живут.

Клиническое применение: см. «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» и «Ретенционная подъязычная киста» в гл. «Полость рта, десны и зубы».

Formica rufa (муравей красный)

Это средство в основном используется при лечении острых случаев кожного зуда в сочетании с жжением. Иногда оно полезно при артритах и обладает способностью уменьшать рост полипов. Оно также показано при некоторых хронических заболеваниях, однако в этих случаях лечение следует проводить под руководством опытного ветеринара-гомеопата.

Клиническое применение: см. «Кожный зуд» в гл. «Кожные покровы и уши».

Gelsemium (жасмин желтый)

Для данного средства характерны слабость, заторможенность и вялость. *Gelsemium* часто назначается животным после острого периода болезни, когда сохраняется вялость, апатичность и организм никак не может выйти из болезненного состояния. Одним из характерных симптомов *Gelsemium* является паралич, а также дрожание тела и конечностей от слабости. Обычно такие животные стремятся к одиночеству. Они с трудом приспособляются к новым условиям и испытывают тревогу и слабость при изменении привычной обстановки — подобные симптомы также являются показанием к назначению *Gelsemium*. Фактически у таких животных показания к назначению данного средства могут возникнуть при любой стрессо-

вой ситуации, особенно при эмоциональном напряжении.

Клиническое применение: см. «Дегенеративная миелопатия» в гл. «Нервная система»; «Роды» в гл. «Репродуктивная система»; «Лихорадка и инфекции» и «Перегревание» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Glonoinum (нитроглицерин)

Перегревание, особенно вследствие длительного пребывания на солнце, является одним из основных показаний для назначения данного гомеопатического средства. У таких животных отмечается выраженная слабость и сильные головные боли. Улучшение симптомов отмечается при подъеме головы вверх и в положении сидя на открытом воздухе.

Клиническое применение: см. «Перегревание» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Granatum (гранат обыкновенный)

Мне приходилось применять данное лекарство только при инвазии ленточными гельминтами, однако в руководствах описаны показания к назначению *Granatum* при усиленном слюнотечении, болях в желудке, постоянном ощущении голода и выраженном зуде дистальных отделов конечностей. Улучшение всех симптомов отмечается после еды.

Клиническое применение: см. «Гельминты» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Graphites (графит)

Это гомеопатическое средство готовится из графита, представляющего собой чистый углерод. Углерод является основой органической жизни, именно поэтому все гомеопатические лекарства, в состав которых входит этот элемент, оказывают глубокое воздействие на организм и используются при лечении выраженных нарушений структуры и функции различных органов. Назначение данного препарата при хронических болезнях следует доверить ветеринару-гомеопату. Имеется ряд показаний для назначения *Graphites* при острых состояниях у животных. Такие животные обычно тучные, с избыточным весом, медлительные, неповоротливые, со сниженной способнос-

тью тканей к заживлению. У них отмечается склонность к кожным высыпаниям в области суставных сгибов, кожная сыпь обычно влажная, с отделяемым цвета меда. Животные с показаниями к назначению *Graphites* обычно зябкие, хотя симптомы могут ухудшаться от жары и пребывания в жарком помещении и улучшаться на открытом воздухе (что напоминает модальность *Pulsatilla*).

Клиническое применение: см. «Участки раздражения кожи» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Запор» в гл. «*Система пищеварения*»; «Выделения из влагалища» в гл. «*Репродуктивная система*».

***Hamamelis* (гамамелис виргинский)**

Показания к назначению данного средства при ушибленных ранах и кровотечениях сходны с показаниями *Arnica* и *Bellis perennis*. Одним из характерных симптомов *Hamamelis* является венозное полнокровие и нарушение кровообращения в пораженном участке, обычно вследствие травмы. Область повреждения, как правило, болезненна. Симптомы усиливаются от прикосновения и движения, поэтому такие животные предпочитают находиться в покое, в положении лежа. Назначение *Hamamelis* облегчает боли после хирургических вмешательств. Если назначение *Arnica* или *Bellis* оказывается неэффективным, следует подумать о назначении *Hamamelis*.

Клиническое применение: см. «Носовое кровотечение» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Травмы глазного яблока» в гл. «*Орган зрения*»; «Растяжение мышц и связок» в гл. «*Костно-мышечная система*»; «Кровотечение» и «Хирургические вмешательства» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Hesla lava* (лава исландского вулкана Гекла)**

У данного средства отмечается тропность к костной ткани, особенно к костям челюстей. *Hesla lava* в основном назначается при воспалении костной ткани и опухолях костей. Лимфоузлы в области поражения обычно увеличены в размерах и болезненны при прикосновении.

Клиническое применение: см. «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*».

Helodrilis (земляной червь)

Это средство было недавно испытано Л. Клейном, поэтому его описание отсутствует в большинстве книг по гомеопатическому лекарствоведению. Основная область его применения — заболевания и травмы позвоночника.

Клиническое применение: см. «Травмы головного и спинного мозга» в гл. «*Нервная система*».

***Hepar sulphuris calcareum*
(серная печень по Ганеману)**

Большое гомеопатическое средство при нагноениях и болезненных воспалительных процессах. Животные с симптомами данного лекарства часто агрессивны и раздражительны. Возможно, эти симптомы связаны с интенсивными болями, которые не могут не оказывать влияние на состояние психоэмоциональной сферы. Животные *Hepar sulphuris* столь сильно реагируют на прикосновение к очагу поражения, что создается впечатление, что поражение намного сильнее, чем можно было бы ожидать по внешним признакам. При попытках исследовать или промыть рану животное может даже укусить. Наблюдается выраженная склонность к нагноению ран. Пациенты *Hepar sulphuris calcareum* обычно очень зябкие, чувствительные к холоду и сквознякам. Подобное состояние встречается в основном в зимнее время года, при холодной и сухой погоде. Облегчение самочувствия отмечается в теплую влажную погоду.

Клиническое применение: см. «Участки раздражения кожи» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Чиханье и выделения из носа» и «Кашель» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Гипопион» и «Язвы роговицы» в гл. «*Орган зрения*»; «Агрессивность» в гл. «*Нервная система*»; «Выделения из влагалища» и «Мастит» в гл. «*Репродуктивная система*» и «Абсцессы» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

Hydrastis (гидрастис канадский)

Данное гомеопатическое средство готовится из растения, обладающего выраженными антисептическими свойствами. Особенно полезен *Hydrastis* при лечении воспалительных процес-

сов с густым вязким отделяемым желтоватого цвета, причем воспаление обычно сильно выражено и сопровождается разрушением тканей, образованием изъязвлений и гнойных полос-тей, требующих дренирования. Симптомы усиливаются на холоде. *Hydrastis* нередко назначается старым животным для лечения изъязвляющихся и малигнизированных ран.

Клиническое применение: см. «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Выделения из влагалища» в гл. «Репродуктивная система».

Nyoscyatus (белена черная)

Характерными симптомами данного препарата являются агрессивность и сексуальное возбуждение. В поведении животных *Nyoscyatus* отмечается чередование периодов агрессии в сочетании с мастурбацией и периодов жизнерадостности и веселости. Такие животные обычно подозрительны и могут нападать на незнакомых людей и других животных. Для них характерно чувство ревности, которое проявляется в собственнических сексуальных инстинктах. Обычно они не любят находиться в одиночестве. В основе их агрессивности лежит чувство страха, что напоминает картину *Stramonium*. Для данного средства также характерны спазмы и судорожные подергивания мышц. *Nyoscyatus* чаще применяется для лечения глубоких хронических процессов; в подобных случаях лечение должно проводиться специалистом-гомеопатом. Это лекарство назначается также при некоторых острых состояниях. Картина симптомов *Nyoscyatus* часто возникает после вакцинации против бешенства.

Клиническое применение: см. «Агрессивность» в гл. «Нервная система»; «Эклампсия» в гл. «Репродуктивная система»; «Боязнь громких звуков (боязнь звуков льющейся воды)» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Hypericum perforatum (зверобой продырявленный)

Это средство иногда называют «*Arnica* для нервной системы» из-за его благотворного воздействия при травмах нервной системы, включая как центральные, так и периферические ее от-

делу. *Hypericum* особенно полезен для облегчения болей при ранах и повреждениях в зонах с богатой иннервацией (пальцы передних и задних конечностей, хвост, зубы и десны, язык), а также при травмах головного и спинного мозга. Это средство облегчает боли при чрезвычайно болезненных рваных ранах, подобно *Calendula* и *Staphysagria*. Симптомы *Hypericum* ухудшаются при сотрясении, прикосновении и движении, причем особенно усиливается болезненность в области ран. По мнению некоторых гомеопатов, это средство может быть полезным при лечении столбняка.

Аллопатические препараты, содержащие *Hypericum*, обладают выраженными антисептическими и противовоспалительными свойствами и применяются для местного лечения инфицированных ран, абсцессов, нагноительных процессов в области наружного уха и т. п. Для местного применения следует приготовить отвар из свежего или сухого растительного сырья или раствор из 10–30 капель официальной тинктуры *Hypericum*, одного стакана кипяченой воды и четверти чайной ложки поваренной соли.

Клиническое применение: см. «Заболевания межпозвоночных дисков» в гл. «Костно-мышечная система»; «Травмы головного и спинного мозга» в гл. «Нервная система»; «Боли в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система»; «Укушенные раны у кошек и собак» и «Резаные и рваные раны» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Ignatia (бобы Св. Игнация)

Данное средство чрезвычайно полезно в тех ситуациях, когда животные, подобно людям, испытывают горе и впадают в состояние депрессии с потерей аппетита, отказом от еды и т. п. Подобные симптомы указывают на необходимость назначения *Ignatia*. Для животных, испытывающих чувство горя, характерно чередование периодов подавленности с периодами хорошего настроения. *Ignatia* также показана в тех случаях, когда горе является причиной какого-либо заболевания, несмотря на то что печальное событие произошло в прошлом.

Клиническое применение: см. «Горе» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Иресасианһа (рвотный корень)

Аллопатический сироп *Иресасианһа* обладает выраженным рвотным действием, поэтому родители часто прибегают к этому препарату на тот случай, если ребенок случайно съест «что-то не то» — сироп *Иресасианһа* поможет вовремя избавиться от ненужного продукта. У животных данное гомеопатическое средство назначается в тех случаях, когда приступ кашля сопровождается или заканчивается рвотой. Часто у животных с симптомами *Иресасианһа* отмечаются постоянная тошнота и примесь крови в рвотных массах, в моче и выделениях из влагалища (в этих случаях источником кровотечения является матка). Переедание и перегревание способствуют появлению симптомов данного средства.

Клиническое применение: см. «Рвота» в гл. «Система пищеварения»; «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Кровотечение в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система».

Kali bichromicum (бихромат калия)

Данное гомеопатическое лекарство обладает возможностью воздействия на слизистые оболочки и, подобно *Hydrastis*, часто назначается при наличии вязких и тягучих выделений желтоватого цвета из естественных отверстий организма с образованием корочек. Особенностью *Kali bichromicum* является более плотное соединение корочек с подлежащими тканями, когда после их удаления образуются участки раздражения и воспаления. Усиление симптомов отмечается по утрам. Обычно такие животные не переносят холод, который ухудшает их состояние. В поведении животных *Kali bichromicum* отмечаются периоды раздражительности и равнодушия к окружающим, что также напоминает симптомы *Hydrastis*. Различие между этими средствами заключается в том, что раздражительность *Kali bichromicum* уменьшается после еды, а раздражительность *Hydrastis* после еды усиливается.

Клиническое применение: см. «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Выделения из влагалища» в гл. «Репродуктивная система».

***Kali chloricum* (хлорид калия)**

У данного средства отмечается тропность к ротовой полости, именно поэтому *Kali chloricum* назначают при выраженных воспалительных процессах этой области. У животных с симптомами данного препарата обычно зловонное дыхание. Язык и другие участки тела могут быть холодными на ощупь. Животные этого типа обычно очень ослабленные и часто отказываются от еды. Особенностью их поведения является чередование периодов подавленности и хорошего настроения. Обычно в подобных случаях следует проводить лечение под наблюдением профессионала-гомеопата; однако в некоторых случаях можно попытаться назначить это лекарство самостоятельно на фоне обычного лечения у ветеринара. *Kali muriaticum* имеет сходные показания к назначению.

Клиническое применение: см. «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» в гл. «Ротовая полость, десны и зубы».

***Kali sulphuricum* (сульфат калия)**

Данное средство, подобно *Kali bichromicum*, назначается при выделениях желтоватого цвета из естественных отверстий организма, однако выделения *Kali sulphuricum* менее вязкие и не раздражают кожу. Другое различие между этими гомеопатическими препаратами (и *Hydrastis*) заключается в модальности — пациенты *Kali sulphuricum* предпочитают холод и открытый воздух. Картина симптомов *Kali sulphuricum* во многом похожа на картину *Pulsatilla*, для которой также характерны выделения желтоватого цвета и желание открытого воздуха, однако в отличие от представителей типа *Pulsatilla* животные *Kali sulphuricum* обычно раздражительны и беспокойны. Наряду с перечисленными выше симптомами часто отмечаются кожный зуд и сыпь с выраженным шелушением.

Клиническое применение: см. «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы».

***Kreosotum* (креозот)**

Креозот представляет собой масло растительного происхождения с выраженными раздражающими свойствами. Гомеопатический препарат *Kreosotum* назначается при раздражении

слизистых оболочек и едких жгучих выделениях со зловонным запахом. У животных с симптомами данного средства обычно поражаются десны и зубы; зубы разрушаются и выпадают в молодом возрасте. Симптомы *Kreosotum* обычно проявляются в период прорезывания зубов, причем такие животные, как правило, ослабленные и болезненные. Кроме того, у животных *Kreosotum* часто отмечается беспокойство, особенно по ночам. В покое наблюдается ухудшение симптомов.

Клиническое применение: см. «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Недержание мочи» в гл. «*Мочевыводящая система*» и «Выделения из влагалища» в гл. «*Репродуктивная система*».

Lac caninum (молоко собаки)

Lac caninum назначается при лечении многих заболеваний, однако основным показанием для его применения у животных является патология со стороны молочных желез. Животные *Lac caninum*, как правило, беззащитны и нуждаются в постоянном внимании и поддержке. Данное лекарство также обладает тропностью к заболеваниям глотки. Характерно чередование сторон поражения. У людей *Lac caninum* обычно назначается при тонзиллитах, особенно при воспалении миндалин сначала с одной, затем с другой стороны. При характерном для этого средства воспалении боль усиливается от сотрясения и прикосновения к воспаленным участкам.

Клиническое применение: см. «Недостаточная продукция молока» в гл. «*Репродуктивная система*».

Lachesis (яд змеи сурукуку)

Это одно из гомеопатических средств-полихрестов. Поведение животных с симптомами данного препарата в какой-то степени напоминает поведение змей: они подозрительны и пугливы, стремятся остаться в одиночестве и могут броситься и укусить, если их оттолкнуть. Стремление бросаться и кусать может со временем стать привычкой. Ключевым симптомом данного лекарства является ревность.

Отмечается склонность к левостороннему поражению и кровотечениям. Часто поражается сердечно-сосудистая система.

Ткани организма могут иметь синюшный цвет из-за нарушения кровообращения или венозного полнокровия.

Lachesis ускоряет заживление ран на фоне нарушения кровообращения. Для пациентов с симптомами данного средства характерно желание открытого воздуха, неприязнь к жаркой погоде или помещениям и ухудшение симптомов во сне.

Клиническое применение: см. «Укусы и ужаливания» и «Ушные гематомы» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» в гл. «*Ротовая полость, десны и зубы*»; «Агрессивность» в гл. «*Нервная система*»; «Кровотечение в послеродовом периоде» в гл. «*Репродуктивная система*» и «Абсцессы», «Укушенные раны у кошек и собак», «Укусы змей» и «Кровотечение» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Lactuca virosa* (латук ядовитый)**

Основное специфическое показание для назначения данного средства – стимуляция продукции молока. При недостаточном количестве молока у особей женского пола отмечается выраженное беспокойство и расширенные зрачки. Иногда наблюдаются признаки нарушения дыхания, которые уменьшаются при частом зевании. Частое зевание вообще характерно для животных с симптомами *Lactuca virosa* вне зависимости от наличия или отсутствия дыхательных расстройств.

Клиническое применение: см. «Недостаточная продукция молока» в гл. «*Репродуктивная система*».

***Lathyrus* (чина посевная)**

Данное лекарство является почти специфическим при лечении полиомиелита у людей. У животных *Lathyrus* полезен при лечении параличей, напоминающих параличи при полиомиелите. Особенностью таких параличей является отсутствие болей и усиление рефлексов. Состояние *Lathyrus*, как правило, проявляется при холодной сырой погоде. По мнению некоторых гомеопатов, данное средство обычно показано особям мужского пола и очень редко – самкам.

Клиническое применение: см. «Дегенеративная миелопатия» и «Паралич норных собак» в гл. «*Нервная система*».

Ledum palustre (багульник болотный)

Ledum palustre является средством выбора при колотых ранах. У *Ledum palustre* имеются и другие показания к назначению, однако основным в ветеринарии является наличие колотой раны какого-либо вида. По мнению некоторых гомеопатов, своевременное назначение *Ledum* способно предупредить развитие столбняка: средство показано в тех случаях, когда в области колотой раны отмечаются мышечные подергивания и снижение кожной температуры, хотя тепло усиливает ощущение дискомфорта. Часто у животных *Ledum* наблюдается кожный зуд, который усиливается ночью и в тепле, причем участки зуда обычно расположены в области стоп и задних конечностей. Обычно такие животные раздражительны и сердиты, предпочитают находиться в одиночестве (холодность тела сочетается с холодностью души).

Клиническое применение: см. «Кожный зуд» и «Укусы и ужаливания» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Травмы глазного яблока» в гл. «Орган зрения»; «Травмы яичек» в гл. «Репродуктивная система»; «Укушенные раны у кошек и собак», «Укусы змей», «Блохи» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Lilium tigrinum (лилия ланцетовидная)

Психоэмоциональное состояние, соответствующее данному средству, характеризуется выраженным напряжением и страданием. Такие животные (обычно особи женского пола) чрезвычайно беспокойны, торопливы, раздражительны и капризны, постоянно перемещаются с места на место, стараясь уменьшить душевные муки. Обычно отмечается повышенная сексуальность, что выражается в мастурбации и постоянном вылизывании гениталий. Для особей женского пола с симптомами *Lilium tigrinum* характерны заболевания половой сферы.

Клиническое применение: см. «Выделения из влагалища» в гл. «Репродуктивная система».

Lycorodium clavatum (плаун булавовидный)

Lycorodium является одним из главных средств в гомеопатической *Materia Medica*. В основном он назначается при хронических заболеваниях; в данной книге приводятся некоторые

показания к его назначению в острых случаях. *Luscorodium*, подобно *Sulphur*, представляет собой глубоко действующее средство, способное при частом назначении вызвать усиление симптомов, особенно в начале лечения.

У животных с картиной данного средства чрезвычайно развито чувство иерархических отношений. Они помыкают теми сородичами, кого считают ниже себя, и подобострастно ведут себя с теми, кого считают выше по положению. Именно поэтому они могут быть послушными и милыми в общении со своим опекуном и в то же время третировать других животных в доме. По той же причине животные *Luscorodium* не любят детей. Обычно у них отмечается боязнь незнакомцев, особенно мужчин. Если говорить о людях, то для женщин типа *Luscorodium* в целом характерно желание встречаться с друзьями в своем доме, однако отсутствует желание общаться с ними (в непривычной обстановке). Животные с картиной этого средства чрезвычайно привередливы.

Ключевым физическим симптомом является наличие расстройств со стороны системы пищеварения и мочевыводящей системы у одной и той же особи, причем не обязательно одновременно. Другим характерным симптомом является усиленное газообразование в кишечнике. Некоторые животные с симптомами данного средства могут быть зябкими. Животные *Luscorodium* обычно быстро старятся, поэтому даже у молодых особей (особенно у собак) можно увидеть седую шерсть. Отмечается склонность к правостороннему поражению или перемещению симптомов справа налево.

Клиническое применение: см. «Диарея» и «Вздутие живота» в гл. «Система пищеварения»; «Цистит» в гл. «Мочевыводящая система»; «Отставание в росте» в гл. «Репродуктивная система»; «Реакции при введении некоторых лекарственных препаратов» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Lyssinum (Hydrophobinum) (слюна бешеной собаки)

Это гомеопатическое лекарство представляет собой нозод, приготовленный из слюны собак, больных бешенством. Нозод не содержит инфекционного агента, но хранит информацию о

нем. *Lyssinum* отпускается только по рецепту врача. В этой книге рассматриваются некоторые показания для использования данного средства, однако эта информация предназначена скорее для гомеопатов и ветеринаров, так как назначение и применение данного нозода может осуществляться только под их строгим контролем. По мнению некоторых гомеопатов, нозод следует назначать после введения животным антирабической вакцины с целью предотвращения вакциноза. Однако, с нашей точки зрения, это мнение ошибочно. У нас нет достоверных фактов, указывающих на то, что *Lyssinum* наверняка предотвратит вакциноз, хотя, возможно, его введение и не принесет животному вреда. Вероятно, нозод поможет лишь в некоторых случаях. Стремление оградить животных от нежелательных последствий вакцинации вполне оправданно, однако вряд ли с помощью данного нозода удастся устранить последствия введения антирабической вакцины. Может быть, лучше отказаться от вакцинации в тех случаях, когда это возможно.

Клиническое применение: см. «Агрессивность» в гл. «Нервная система»; «Укушенные раны у кошек и собак» и «Страх» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Magnesia carbonica (карбонат магния)

Для данного препарата характерно ощущение онемения и прострации вследствие психической или физической травмы. Часто симптомы *Magnesia carbonica* появляются во время беременности. Именно поэтому данное лекарство часто назначается ослабленным котяткам и щенкам. Животные *Magnesia carbonica* обычно беспокойные, встревоженные, характерно наличие кислого запаха. Состояние ухудшается при употреблении молока.

Клиническое применение: см. «Ослабленные котята и щенки» в гл. «Репродуктивная система».

Magnesia phosphorica (гидрофосфат магния)

Показанием для назначения *Magnesia phosphorica* являются спазмы и судороги. К примеру, многим женщинам это средство помогает при спастическом характере менструальных болей. Спастические боли у животных могут быть настолько

сильными, что они иногда поскуливают. Характерна внезапность их появления. Обычно боли такого типа облегчаются от тепла. *Magnesia phosphorica* также полезна при заболеваниях желудка и брюшной полости, когда наряду с болями наблюдается вздутие живота.

Клиническое применение: см. «Вздутие живота» в гл. «Система пищеварения».

Mercurius (ртуть)

Ртуть является компонентом значительного количества гомеопатических средств, между которыми наблюдается много общего, но есть и определенные различия. *Mercurius vivus* и *Mercurius solubilis*, в сущности, очень похожи по своим показаниям; если говорится просто о *Mercurius*, то можно назначать как одно, так и другое средство. По моему мнению, *Mercurius vivus* более эффективное и доступное гомеопатическое лекарство. У *Mercurius corrosivus* несколько иная картина симптомов, однако очень много общего с картиной *Mercurius*. При лечении особей мужского пола следует предпочесть *Mercurius corrosivus*, при лечении самок — *Mercurius vivus* или *solubilis*. Если симптомы заболевания соответствуют картине *Mercurius*, то при правостороннем поражении лучшие результаты получаются при назначении *Mercurius iodatus flavus*, а при левостороннем следует предпочесть *Mercurius iodatum ruber*. Симптомы данного препарата во многом подобны симптомам *Silicea*, чем и обусловлена их несовместимость; в некоторых случаях при назначении этих лекарств одно за другим возникает масса нарушений. Одно из основных правил гомеопатической практики — никогда не назначать эти средства подряд. Если уж такая необходимость возникает, то следует между ними назначить *Sulphur* или *Hepar sulphuris*.

Лекарственная картина *Mercurius* соответствует тяжелым нарушениям в организме. Одним из симптомов данного лекарства является воспаление слизистых оболочек, особенно ротовой полости и пищеварительного тракта. Отмечаются выраженные нарушения со стороны мочеполовой системы. Где бы ни локализовался очаг воспаления, выделения всегда будут желто-зеленого цвета, зловонные, тягучие и густые. Раны и разрезy легко воспаляются и нагнаиваются; характерны

обильное отделяемое, изъязвления ран с изъеденностью краев. Типично обильное слюнотечение. См. более подробное описание средства в главе «Полость рта, десны и зубы» и его влияния на слизистые оболочки, особенно десны.

Животные с симптомами *Mercurius* чрезвычайно упрямы и раздражаются при любых попытках приучить их к дисциплине или как-то повлиять на их поведение. Они даже могут укунить, если их, например, прогонят с любимого кресла. По мере развития заболевания животные становятся необщительными, замкнутыми, вялыми и дезориентированными. Ртуть используется в термометрах; пациент с симптомами *Mercurius* сам напоминает термометр — не выносит крайних температур, т. е. ни жары, ни холода.

У животных с симптомами *Mercurius* часто отмечается поражение нижних отделов пищеварительного тракта. Характерны тенезмы во время дефекации и после нее, причем нередко вслед за нормальным стулом следует серия тенезмов. Кал часто с примесью крови. Наблюдается поражение мочевого пузыря, мочеиспускание также сопровождается тенезмами.

Клиническое применение: см. «Участки раздражения кожи» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта», «Ретенционная подъязычная киста», «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Диарея» в гл. «*Система пищеварения*»; «Чиханье и выделения из носа» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Конъюнктивит», «Гипопион» и «Язвы роговицы» в гл. «*Орган зрения*»; «Цистит» и «Почечная недостаточность» в гл. «*Мочевыводящая система*»; «Агрессивность» в гл. «*Нервная система*»; «Выделения из влагалища», «Фимоз и парафимоз», «Выделения из половых путей» и «Неполноценное молоко» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Абсцессы», «Укусы змей» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Mercurius corrosivus* (сулема)**

Данное средство во многом похоже на *Mercurius*, особенно его показания к назначению при острых состояниях. Картина симптомов *Mercurius corrosivus* при хронических состояниях тем не менее отличается от таковой у *Mercurius*. Чаше

Mercurius corrosivus назначается особям мужского пола, причем по сравнению с симптомами *Mercurius* симптомы данного средства отличаются большей интенсивностью (например, тенезмы при дефекации). В случаях диареи у пациентов с симптомами *Mercurius corrosivus* в каловых массах часто отмечаются включения белого цвета, состоящие из обрывков слизистой оболочки.

Клиническое применение: см. показания к назначению *Mercurius*.

***Mezereum* (волчье лыко)**

Обладает сродством к костной системе и коже. Одним из показаний к назначению данного лекарства является кожный зуд. Животные постоянно чешутся, однако на коже отсутствуют какие-либо высыпания, корочки или участки раздражения, за исключением гиперемии в местах расчесов. Под воздействием данного препарата облегчаются боли в области костей, особенно трубчатых. Животные с симптомами *Mezereum* обычно замкнутые, однако предпочитают находиться в одной комнате с их опекуном. Особенность их характера — раздражительность. Обычно симптомы *Mezereum* ухудшаются ночью. Зуд усиливается от тепла, однако костные боли нарастают от холода и сырости. Многие симптомы *Mezereum* возникают вследствие вакцинации.

Клиническое применение: см. «Кожный зуд» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Разрушение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*» и «Паностеит» в гл. «*Костно-мышечная система*».

***Millefolium* (тысячелистник обыкновенный)**

Как аллопатическое, так и гомеопатическое средство имеют тропность к выделению крови. Данное лекарство назначается при обильных кровотечениях с выделением ярко-красной крови без сгустков. Кровотечения часто начинаются после выраженных физических нагрузок.

Клиническое применение: см. «Ушные гематомы» в гл. «*Кожные покровы и уши*»; «Носовое кровотечение» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Кровотечение в послеродовом периоде» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Кровотечение» и

«Хирургические вмешательства» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Muriaticum acidum (соляная кислота)

Данное средство весьма эффективно при заболеваниях воспалительной и инфекционной природы. Особенно часто у животных с симптомами *Muriaticum acidum* поражаются ротовая полость и десны, причем отмечается образование трещин, язв и сухость слизистой оболочки полости рта. Состояние *Muriaticum acidum* либо возникает, либо ухудшается при сырой погоде. Как и большинство гомеопатических средств, приготовленных из кислот, *Muriaticum acidum* в основном назначается ослабленным животным с дефицитом «жизненной силы». Такие животные часто стонут и поскуливают.

Клиническое применение: см. «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» в гл. «Полость рта, десны и зубы».

Myristica sebifera

В гомеопатии *Myristica* пользуется заслуженной славой как незаменимое средство для удаления заноз и других инородных тел. Особенностью данного лекарства является его способность активизировать и ускорять процессы образования и выделения гноя. Этот замечательный препарат всегда должен быть в домашней аптечке, если вы работаете с древесиной и у вас часто бывают занозы. По моему мнению, *Myristica* при лечении абсцессов, связанных с попаданием инородных тел, назначается гораздо реже, чем того заслуживает.

Клиническое применение: см. «Лисохвост (шипы травы *Alopecurus pratensis*) и инородные тела» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Абсцессы» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Natrum carbonicum (карбонат натрия)

Ключевым симптомом данного препарата является повышенная чувствительность к летней жаре и солнечным лучам, вследствие чего развивается слабость, особенно при длительном пребывании на солнце. Животные *Natrum carbonicum* обычно чув-

ствительны к грозе, о приближении которой они каким-то образом узнают намного раньше других. Характерной особенностью является слабость связок суставов, поэтому у таких животных при малейших физических нагрузках часто наблюдаются растяжения связок. Обычно животные *Natrum carbonicum* очень плохо переносят физические нагрузки вообще. У них отмечается слабость системы пищеварения (тоже нагрузка!), поэтому они могут страдать диареей даже при полноценном питании. Ухудшение симптомов отмечается после еды, особенно если их вынуждают что-то делать «на полный желудок».

Клиническое применение: см. «Перегревание» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Natrum muriaticum

(хлорид натрия, поваренная соль)

Это одно из средств-полихрестов. Подобно *Lycorodium*, данное лекарство в основном назначается при хронических заболеваниях. Животные с симптомами *Natrum muriaticum* предпочитают одиночество и не любят особых проявлений внимания. На самом деле они нуждаются во внимании, но никогда не показывают этого, отказываясь от попыток общения. Для них характерно состояние некоторой изоляции и потерянности. В прошлом таким животным часто приходилось испытывать душевную боль и горе, что наложило свой отпечаток на их психику.

Средство готовится из поваренной соли, и многое в картине симптомов *Natrum muriaticum* напоминает воздействие соли на организм. Встречаются тучные животные с симптомами, соответствующими картине *Natrum muriaticum*, однако в основном они худые, поджарые несмотря на нормальный или повышенный аппетит (что особенно заметно у старых особей). Животные с симптомами данного лекарства часто страдают запором, каловые массы обычно сухие. Во многих случаях отмечается сухость слизистых оболочек. Для них характерно ощущение жажды — скорее всего таким образом организм пытается скомпенсировать свойственную данному типу сухость. У многих животных с симптомами *Natrum muriaticum* отмечается выраженное желание соленой пищи и рыбы.

Кожные покровы маслянистые, отмечается зуд и корочки на сгибах суставов. Животные плохо переносят жару, особенно

солнечный жар. Почти всегда они горячие и сухие. Возможно, что именно из-за непереносимости жары животные *Natrum muriaticum* плохо переносят и физические нагрузки. Пребывание на побережье часто ухудшает состояние таких пациентов из-за влияния соленого морского воздуха. Улучшение симптомов отмечается в покое и на свежем воздухе.

Клиническое применение: см. «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» и «Подъязычная ретенционная киста» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Запор» в гл. «*Система пищеварения*»; «Почечная недостаточность» в гл. «*Мочевыводящая система*» и «Заболевания межпозвоноковых дисков» в гл. «*Костно-мышечная система*».

Natrum sulphuricum (сульфат натрия)

Состояние пациентов с симптомами данного средства обычно ухудшается при сырой погоде и особенно при ее перемене от сухой к влажной. Симптомы улучшаются при пребывании на открытом воздухе и при теплой сухой погоде. Обычно такие животные кажутся подавленными и вялыми; часто подобные психические симптомы связаны с ранее полученной травмой головного или спинного мозга. Следует отметить эффективность назначения *Natrum sulphuricum* при травмах центральной нервной системы. Характерными симптомами являются отвращение к яркому свету, а также желтоватый цвет кожи и выделений. Данное лекарство в некоторых случаях полезно при заболеваниях печени, которые усиливаются в сыром климате. Характерным симптомом *Natrum sulphuricum* является диарея с ухудшением в ранние утренние часы, при этом каловые массы обычно водянистые и имеют желтоватый цвет.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «*Система пищеварения*» и «Травмы головного и спинного мозга» в гл. «*Нервная система*».

Nitricum acidum (азотная кислота)

Одним из характерных симптомов данного лекарства является выраженное воспаление с сильными болями, которое сопровождается образованием изъязвлений. Испытуемые (см. «Испытания препаратов» стр. 656 – *Примеч. гл. ред.*) сравнивают эти боли с болями при занозе. Часто воспаление локали-

зуются в области участков соединения кожи и слизистой оболочки (ротовая полость, нос, половые органы, анальное отверстие). По мере развития болезни подобный тип воспаления может встретиться в любой области тела. На поздних стадиях заболеваний *Nitricum acidum* обычно поражается костная система. Характерны образование абсцессов и выделения из естественных отверстий, причем выделения обычно зловонные, едкие и при контакте с кожей вызывают ее раздражение и очаговое выпадение волос.

Животные *Nitricum acidum* обычно отличаются раздражительностью и злобным характером — возможно, из-за острых болей, но вполне возможно, что эта особенность является одним из психических симптомов данного препарата. В покое эти животные кажутся вполне мирными, однако могут укусить при осмотре или лечебных манипуляциях. В подобных ситуациях многие животные рычат, бьют лапой или могут слегка «прикусить» — но животные *Nitricum acidum* «знают свое дело», кусая сильно и до крови.

Для многих животных с симптомами *Nitricum acidum* характерно желание жирной соленой пищи и рыбы. Некоторые очень любят сыр, другие вообще не берут его в рот, у некоторых отмечается отвращение к мясу и предпочтение рыбы. Почти всегда такие животные зябкие. Ухудшение всех симптомов, особенно усиление боли, отмечается при прикосновении, даже легком.

Клиническое применение: см. «Участки раздражения кожи» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Запор» в гл. «Система пищеварения»; «Выделения из половых путей», «Выделения из влагалища» и «Фимоз и парафимоз» в гл. «Репродуктивная система» и «Абсцессы» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Nux moschata (орех мускатный)

Данное средство часто назначается особям женского пола при заболеваниях половых органов. Ключевым симптомом со стороны психической сферы является дезориентация — такие животные легко теряются даже в привычной обстановке. Создается впечатление, что они постоянно пребывают в сонливом состоянии, живут в «своем собственном мире». Животные этого типа легко пугаются. Отмечается сухость слизистой оболоч-

ки ротовой полости, однако жажда отсутствует. Сочетание сонливости, зябкости и отсутствия жажды обычно указывает на *Nux moschata*. Характерно также повышенное газообразование и вздутие живота.

Клиническое применение: см. «Вздутие живота» в гл. «Система пищеварения» и «Недержание мочи» в гл. «Мочевыводящая система».

Nux vomica (чилибуха рвотная)

Nux является одним из наиболее ценных гомеопатических средств, особенно при острых состояниях (чтобы не путать с менее распространенным *Nux moschata*, *Nux vomica* называют просто *Nux*). Картина симптомов *Nux vomica* у животных возникает из-за воздействия ряда факторов: сочетания неполноценного питания, с приемом значительного количества аллопатических лекарств, перееданием, действием раздражающих стимулов, что в итоге вызывает изношенность организма и истощение иммунной системы. При плохом самочувствии они становятся раздражительными. Тем не менее животные *Nux* могут быть весьма дружелюбными. Их отличительная черта — повышенная чувствительность к внешним воздействиям, в том числе к шуму, свету и запахам. Все ощущения обострены и напоминают ощущения человека наутро после приема изрядного количества алкоголя.

Для животных *Nux vomica* характерно нарушение пищеварения. При изменении питания развивается диарея, сопровождающаяся тенезмами. Отмечается также рвота, хотя это менее типичный симптом по сравнению с диареей. После рвоты состояние обычно значительно улучшается.

Наихудшим временем суток для животных *Nux vomica* является утро. Обычно утром у них отмечают тошнота, головная боль, состояние подавленности и раздражительность. Почти все животные с симптомами данного средства зябкие, чрезвычайно чувствительные к сквознякам и холоду.

Назначение *Nux vomica* приносит огромную пользу многим животным в случае перенасыщенности их организма аллопатическими лекарствами. Многие гомеопаты начинают лечение с назначения *Nux vomica* с целью очищения организма от предшествующих традиционных лекарств или противодействия

предыдущему традиционному лечению. Во многих случаях такая практика, несомненно, приносит пользу, однако не следует относиться к этому как к рутинному назначению. Подобным образом после вакцинации часто назначается *Thuja*, однако и в этих случаях должны быть определенные, соответствующие *Thuja* показания к назначению.

Клиническое применение: см. «Рвота», «Диарея», «Запор» и «Вздутие живота» в гл. «Система пищеварения»; «Цистит» и «Обструкция уретры и катетеризация» в гл. «Мочевыводящая система»; «Заболевания межпозвонковых дисков» в гл. «Костно-мышечная система»; «Агрессивность и рабический миазм» в гл. «Нервная система»; «Боли при родах» и «Эклампсия» в гл. «Репродуктивная система»; «Реакции при введении некоторых лекарственных препаратов» и «Отравление пищей и пищевыми отбросами» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Oleander (олеандр обыкновенный)

Данное средство назначается нечасто, однако может быть полезным при лечении некоторых случаев слабости или паралича задних конечностей. Кроме того, показанием к назначению *Oleander* является диарея с ухудшением при жаркой погоде и вследствие употребления цитрусовых (олеандр, из которого готовится это средство, произрастает во Флориде). Каловые массы животных с показаниями к *Oleander* часто содержат непереваренные остатки пищи. При диарее у таких животных резко усиливается аппетит.

Клиническое применение: см. «Дегенеративная миелопатия» в гл. «Нервная система».

Orium (млечный сок из незрелых головок мака снотворного)

У данного гомеопатического средства имеется ряд строгих показаний: упорный запор, анамнестические указания на применение избыточного количества лекарств, ступор или постоянная сонливость, особенно в сочетании с другими характерными симптомами. Состояние, напоминающее картину симптомов *Orium*, может развиваться вследствие сильного испуга; подобную картину иногда можно наблюдать у птиц — сильный

испуг их буквально парализует. При состояниях, когда показан *Orium*, обычно отмечается уменьшение восприятия боли.

Как указывалось ранее в тех разделах книги, где подробно обсуждалось назначение *Orium*, в настоящее время в США применение данного гомеопатического средства не является узаконенным. Удивительно, но Фармацевтическая ассоциация США внесла это лекарство в «Перечень №1 наркотических препаратов», хотя, естественно, всем известно, что гомеопатические препараты *Orium* и *Cannabis* не содержат материальных количеств опиума и марихуаны, так как применяются в разведении 12С – 24Х. Таким образом, большинство американских врачей-гомеопатов и ветеринаров даже не имеют права приобрести данные средства для лечебных целей. Однако в европейских странах и в Мексике *Orium* и *Cannabis* свободно продаются в аптеках и при правильном назначении приносят огромную пользу пациентам.

Клиническое применение: см. «Запор» в гл. «Система пищеварения» и «Роды» в гл. «Репродуктивная система».

***Passiflora incarnata* (страстоцвет)**

Обладает выраженным успокаивающим воздействием на психику животных в состоянии испуга, хотя и не является седативным препаратом. Назначение *Passiflora incarnata* полезно при стрессовых ситуациях у животных, например, во время путешествий, перед хирургическим вмешательством и т. п.

Клиническое применение: см. «Эвтаназия», «Страх», «Хирургические вмешательства» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Phosphoricum acidum* (фосфорная кислота)**

Симптомы этого средства напоминают симптомы *Phosphorus* (см. далее), но отличаются выраженной слабостью, характерной для кислот. Много общего отмечается у *Phosphoricum acidum* и *China*. Животные с симптомами *Phosphoricum acidum* обычно слабые, легко истощаются как физически, так и психически, поэтому физическая слабость у них сочетается с апатией, сонливостью и равнодушием. Подобное состояние нередко возникает после перенесенного горя и печали. Кроме того, перечисленные симптомы часто сопровождаются диареей, причем выде-

ление стула происходит «фонтаном», с брызгами. Сквозняки и холодный воздух ухудшают состояние, поэтому животные предпочитают оставаться в тепле.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения»; «Гипертрофическая остеодистрофия» в гл. «Костно-мышечная система»; «Укусы змей» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Phosphorus (фосфор)

Данное лекарство является полихрестом и во многих случаях чрезвычайно полезно при лечении животных. Пациенты с классической картиной *Phosphorus* общительны, дружелюбны, любят внимание и обладают громким голосом; обычно они худые, с усиленным чувством голода, часто испытывают жажду, зябкие, легко пугаются и вздрагивают. Животные *Phosphorus* любят греться на солнышке. Долгое время у нас дома жил кот, полностью соответствующий типу *Phosphorus* – длинный, тощий и рыжий (кстати, многие рыжеволосые люди соответствуют этому типу). И как же громко он выражал свои желания – особенно когда речь шла о еде! Он всегда первым появлялся на кухне, требуя пищи; услышав его голос, другие коты сразу же удирали. За его «вокальные» способности мы прозвали его «Спикер».

Несмотря на свое дружелюбие, животные данного типа могут укусить или поцарапать, однако скорее в целях защиты, а не нападения. Подобные инциденты чаще случаются тогда, когда животные чувствуют страх, например на приеме у ветеринара. Пока игла шприца не коснулась кожи, они ведут себя вполне спокойно; но как только они почувствовали укол – происходит взрыв эмоций. У них нет намерения причинить кому-либо вред – они хотят вырваться из рук и убежать подальше. Их взрывной характер связан с присущей данному средству склонностью к испугу. (Химический элемент *Phosphorus* тоже взрывной и реактивный, особенно при контакте с водой.) Животные с симптомами *Phosphorus* почти всегда боятся грома, молнии и резких громких звуков.

Для пациентов данного типа характерна склонность к кровотечениям и анемия. Взятие больших количеств крови, например для последующего переливания, в значительной степе-

ни ослабляет особей типа *Phosphorus*. Характерным симптомом является рвота после питья воды, как только она согреется в желудке (так же ведет себя элемент фосфор при соприкосновении с водой!), а также рвота после торопливо съеденной пищи, особенно сухой. После отхождения стула анальное отверстие может оставаться открытым. У данного лекарства имеется тропность к легочной ткани, поэтому у животных *Phosphorus* часто отмечается кашель и другие симптомы заболеваний дыхательных путей. Им нравится пить холодную воду, они любят хорошо поесть и часто «уважают» пивные и обычные пищевые дрожжи.

Симптомы *Phosphorus* во многом сходны с симптомами *Causticum*, поэтому эти средства несовместимы и их нельзя назначать друг за другом. Отмечается сходство между *Phosphorus* и *Arsenicum album*, с которым он вполне совместим.

Клиническое применение: см. «Ушные гематомы» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» и «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» в гл. «Полость рта, десны и зубы»; «Рвота» и «Диарея» в гл. «Система пищеварения»; «Носовое кровотечение» и «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Рахит» и «Болезнь Легга—Кальве—Пертеса» в гл. «Костно-мышечная система»; «Кровотечение в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система»; «Абсцессы», «Эвтаназия», «Боязнь громких звуков», «Кровотечение» и «Хирургические вмешательства» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Phytolacca (лаконос американский)

Данное средство обладает тропностью к железистой ткани, особенно к молочным железам. Железы обычно уплотнены, воспалены и чрезвычайно болезненны. Боль значительно усиливается при любом движении. Слизистая оболочка ротовой полости может быть темно-красного или синюшного цвета; такого же цвета могут быть воспаленные участки в области молочных желез. Состояние, соответствующее *Phytolacca*, может развиваться после длительного пребывания вне дома в холодную и сырую погоду. Животные с симптомами *Phytolacca* часто равнодушны к жизни и могут отказываться от еды, хотя и не выг-

лдят тяжелобольными.

Клиническое применение: см. «Мастит» в гл. «Репродуктивная система».

***Picricum acidum** (пикриновая кислота)*

Характерными симптомами *Picricum acidum* являются слабость, быстрая утомляемость и неповоротливость. Животные с симптомами данного средства легко истощаются (как физически, так и психически) и быстро сдаются. Их ослабляет даже незначительное физическое напряжение.

Клиническое применение: см. «Почечная недостаточность» в гл. «Мочевыводящая система»; «Паралич норных собак», «Дегенеративная миелопатия» в гл. «Нервная система», «Заболевания простаты» и «Роды» в гл. «Репродуктивная система».

***Plumbum metallum** (свинец металлический)*

В материальных дозах свинец отличается чрезвычайной токсичностью. При отравлении им у человека и животных возникают приступы сильнейших коликообразных болей, анемия и паралитическая слабость мышц. При соответствии картины симптомов *Plumbum* может излечивать подобные состояния. Животные с симптомами *Plumbum* обычно слабые и беспокойные, предпочитают находиться в одиночестве. У них часто отмечается подавленное настроение. Особенностью *Plumbum* является очень медленное развитие симптоматики. Рефлексы обычно угнетены, на деснах может наблюдаться полоса синеватого цвета. Перечисленные выше симптомы часто сочетаются с диареей, причем каловые массы имеют желтоватый цвет. Отмечается преимущественно правостороннее поражение.

Клиническое применение: см. «Запор» в гл. «Система пищеварения» и «Дегенеративная миелопатия» в гл. «Нервная система».

***Rodophyllum** (подофил щитовидный)*

У данного гомеопатического лекарства выражена тропность к кишечнику. Самым частым показанием для назначения *Rodophyllum* является диарея, которая может чередоваться с другими симптомами, в том числе и с запором. Симптомы ухуд-

шаются при жаркой погоде и ранним утром. Картина симптомов, соответствующая *Podophyllum*, часто возникает в период прорезывания зубов у щенков и котят. По ночам животные с симптомами данного средства могут скрипеть зубами, особенно между 2 и 4 часами ночи. Время между 2 и 4 часами ночи типично для ухудшения большинства симптомов *Podophyllum*.

Клиническое применение: см. «Диарея» в гл. «Система пищеварения».

Psorinum (содержимое чесоточного пузырька)

Данное средство представляет собой нозод, который готовится из содержимого чесоточных пузырьков людей, больных чесоткой. В США большинство нозодов продаются по рецепту врача, так как у них нет острых показаний к назначению. Поскольку нозоды оказывают глубокое воздействие на организм, лечение данным препаратом следует проводить только по назначению опытного специалиста-гомеопата. В отличие от других нозодов *Psorinum* редко вызывает возникновение каких-либо нарушений, поэтому в некоторых случаях его применение возможно и в домашних условиях (однако его достаточно трудно приобрести).

Животные с симптомами *Psorinum* обычно выглядят грязными и неухоженными, с маслянистым налетом на шерсти и распространяют вокруг себя неприятный запах. Обычно животные *Psorinum* страдают от сильного зуда. Неприятный запах не исчезает после мытья или прекращается лишь на короткое время. Кроме того, после мытья отмечается ухудшение симптоматики. Обычно такие пациенты слабые и зябкие из-за нарушения способности организма к репарации и теплопродукции. Аппетит у них повышен. Симптомы могут сопровождаться диареей со зловонным запахом.

Клиническое применение: см. «Парша» в гл. «Кожные покровы и уши» и «Крипторхизм» в гл. «Репродуктивная система».

Pulex irritans (блохи человека)

По мнению некоторых ветеринаров-гомеопатов, данное средство обладает способностью уменьшать кожный зуд за счет истребления популяции блох у животных (*Pulex irritans* готовится из блох, паразитирующих на коже человека, однако воз-

действует на популяцию блох у животных).

Клиническое применение: см. «Блохи» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Pulsatilla (прострел луговой)

Pulsatilla представляет собой средство-полихрест. Симптомы *Pulsatilla* чаще наблюдаются у особей женского пола. Обычно такие животные очень ласковые, деликатные, воспитанные и привязчивые. Они так нуждаются во внимании и ласке, что иногда становятся эгоистичными. Обычно у них мягкий характер, они робки, послушны, и с ними нетрудно ладить.

Для данного препарата характерна быстрая изменчивость симптомов и перемещение их с одной стороны тела на другую. Например, при артрите боль может менять локализацию и перемещаться от одной конечности к другой. Отмечается непостоянство стула. Выделения у животных *Pulsatilla* обычно желтоватого или белого цвета, густые и обильные; появление выделений облегчает состояние. Характерна плохая переносимость жирной и калорийной пищи. Жажда обычно не выражена и появляется чаще всего только после еды. Животные *Pulsatilla* обычно зябкие, однако не переносят жару и душные помещения, поэтому предпочитают находиться на открытом воздухе. Ухудшение симптомов отмечается в положении лежа с низко опущенной головой и в начале движения (как у *Rhus toxicodendron*); при движении симптомы улучшаются. У данного гомеопатического средства выражена тропность к репродуктивной системе.

Подобно *Nux vomica*, *Pulsatilla* является полезным лекарством в тех случаях, когда в анамнезе у животных есть указания на назначение значительного количества аллопатических лекарственных препаратов, хотя картины симптомов этих средств существенно отличаются друг от друга.

Клиническое применение: см. «Рвота» и «Диарея» в гл. «Система пищеварения»; «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Конъюнктивит» в гл. «Орган зрения»; «Цистит» и «Недержание мочи» в гл. «Мочевыводящая система»; «Артрит» в гл. «Костно-мышечная система»; «Орхит», «Заболевания простаты», «Выделения из влагалища», «Кровотечения в послеродовом периоде», «Прерывание беременности», «Ослабленные котята и щенки» и «Недостаточная продукция мо-

лока» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Реакции при введении некоторых лекарственных препаратов» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

Pyrogenium

(продукт септического разложения мяса)

Это гомеопатическое средство является продуктом септического разложения мяса и назначается в тех случаях, когда вследствие инфекции в организме развивается гнойный процесс. Основным показанием к назначению *Pyrogenium* является септическое состояние, в том числе и гангрена. Для картины симптомов данного препарата характерна сильнейшая боль, которая вынуждает животных постоянно перемещаться и поворачиваться в поисках наименее болезненного положения. Именно поэтому животные с симптомами *Pyrogenium* кажутся чрезвычайно беспокойными. Боль облегчается от наружного тепла. Местные признаки воспаления сопровождаются появлением на коже ярко-красных полос. Британский врач-гомеопат Дороти Шефферд (Dorothy Shepherd) рекомендует применять данное средство в качестве антидота при осложнениях вакцинации комбинированными вакцинами; однако этот вопрос является спорным, так как, по нашему мнению, вряд ли какое-либо гомеопатическое лекарство способно полностью устранить негативные последствия вакцинации. Правильнее было бы стараться избежать вакцинации там, где это возможно.

Клиническое применение: см. «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Выделения из влагалища» и «Инфекции в послеродовом периоде» в гл. «*Репродуктивная система*»; «Абсцессы» и «Вакцинальные реакции» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Rhododendron* (рододендрон золотистый)**

Животные с симптомами *Rhododendron* чрезвычайно чувствительны к ветреной и штормовой погоде, а также испытывают сильный страх при грозе. Характерно ухудшение состояния перед бурей или ураганом. Наряду с другими симптомами часто наблюдаются боли артритического характера. В покое большинство симптомов ухудшается, тогда как при движении

наступает облегчение.

Клиническое применение: см. «Орхит» в гл. «Репродуктивная система».

***Rhus toxicodendron* (токсикодендрон ядовитый)**

Данное средство обычно назначается при различных заболеваниях суставов. Классическим является использование *Rhus toxicodendron* при усилении болей в суставах в начале движения у зябких животных и постепенном облегчении болей в процессе движения. Животным с симптомами данного препарата свойственно «отогреваться» от болей, хотя *Rhus toxicodendron* не единственное лекарство, в картине которого имеется подобный симптом. Зябкость и беспокойство по ночам у *Rhus* напоминает подобные симптомы у *Arsenicum album*.

Характерны также кожные высыпания с зудом, напоминающие реакцию при контакте кожи с ядовитым плющом. Воспалительные процессы у животных *Rhus* сопровождаются отечностью, зудом и гиперемией. Кожная сыпь может чередоваться с диареей. Часто симптомы, требующие назначения данного средства, появляются после длительного пребывания вне дома при холодной сырой погоде или в холодном сыром климате. Обычно состояние улучшается от теплых компрессов или после горячих ванн. Возникновение или усиление болей в суставах часто отмечается после чрезмерных физических нагрузок.

Клиническое применение: см. «Кожный зуд» и «Участки раздражения кожи» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Конъюнктивит» и «Язвы роговицы» в гл. «Орган зрения»; «Артрит» и «Растяжения мышц и связок» в гл. «Костно-мышечная система»; «Фимоз и парафимоз», «Орхит» и «Инфекции в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система»; «Аллергические реакции» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Ricinus communis* (клещевина обыкновенная)**

Единственное показание для назначения данного средства, о котором упоминается в этой книге, — это увеличение продукции молока, причем в подобных случаях эффективнее назначать низкие разведения (например, 3X). Помогают также припарки из листьев этого растения. Гомеопат *Edgar Cayce* также

рекомендует местное применение касторового масла в качестве средства для уменьшения воспаления.

Клиническое применение: см. «Недостаточная продукция молока» в гл. «Репродуктивная система».

***Rumex crispus* (щавель курчавый)**

Сырьем для изготовления данного средства является конский щавель, который обладает свойством улучшать функцию печени и уменьшать зуд кожи и наружного слухового прохода. Основным показанием к назначению гомеопатического препарата *Rumex crispus* является кашель, возникающий из-за постоянного ощущения щекотания в области горла. Характерным для картины *Rumex crispus* является ухудшение симптомов на холоде и при перемене погоды от тепла к холоду и от холода к теплу.

Клиническое применение: см. «Кашель» в гл. «Система дыхания, нос и синусы».

***Ruta graveolens* (рута пахучая)**

Основным показанием к назначению данного средства, как и *Rhus toxicodendron*, являются боли в суставах и травмы. У *Ruta* отмечается тропность к сухожилиям, особенно к сухожилиям мышц-сгибателей. Кроме того, оно показано при ушибах и других видах травматических повреждений коленного сустава. Показания к назначению *Ruta* при растяжениях связок и мышц, а также при ушибах и гематомах мягких тканей напоминают показания *Arnica*, однако животные с симптомами *Ruta* не столь чувствительны к прикосновению. У животных *Ruta* часто отмечается раздражительность и «сварливость», покраснение глаз и постоянное слезотечение. Отхождение стула обычно затруднено и происходит при сильном натуживании, часто сопровождается выпадением прямой кишки. Симптомы ухудшаются в покое, на холоде и в положении сидя, тогда как движение и тепло улучшают самочувствие.

Клиническое применение: см. «Артрит», «Паностеит», «Первая помощь при переломах костей» и «Растяжения связок и мышц» в гл. «Костно-мышечная система»; «Травмы спинного и головного мозга» в гл. «Нервная система»; «Боли в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система».

Sabal serrulata (сабаль зазубренный)

Как аллопатический препарат из этого растения, так и гомеопатическое средство обладает выраженной тропностью к предстательной железе. У животных с картиной *Sabal* заболевания простаты часто сочетаются с воспалительными процессами в области глаз. Кроме того, показанием к назначению *Sabal* является недоразвитие молочных желез. Таким животным не требуется ласка или внимание; они или уходят при попытках приласкать их, или выражают свое неприязненное отношение. Характерным симптомом является также выделение мочи по каплям и мочеиспускание во сне. Ухудшение состояния у животных *Sabal serrulata* отмечается при холодной, сырой и облачной погоде, а также при проявлении внимания к ним.

Клиническое применение: см. «Заболевания простаты» в гл. «Репродуктивная система».

Sabina (можжевельник)

У данного гомеопатического лекарства выражена тропность к матке и костной системе. У многих животных с симптомами этого средства имеется склонность к самопроизвольным выкидышам, особенно на третьей неделе беременности. Типичны также кровотечения с выделением ярко-красной крови. Пациенты *Sabina* обычно грустные и унылые, особенно в утренние часы. Ухудшение симптомов отмечается ночью и в тепле, особенно в теплом помещении, поэтому такие животные предпочитают находиться на открытом холодном воздухе.

Клиническое применение: см. «Артрит» и «Паностеит» в гл. «Костно-мышечная система»; «Выделения из влагалища» и «Инфекции в послеродовом периоде» в гл. «Репродуктивная система».

Sarsaparilla (корневище Smilax officinalis)

У *Sarsaparilla* выражена тропность к мочевыводящей системе; помимо воспаления мочевыводящих путей *Sarsaparilla* назначается при кожных высыпаниях после вакцинации. Подобное состояние — не такая уж редкость у животных молодого возраста; возможно, что своевременное назначение данного лекарства помогает предотвратить заболевания мочевыводящих путей во взрослом возрасте. Кроме того, достаточно часто у

животных *Sarsaparilla* встречаются глубокие трещины в области стоп. Обычно животные с симптомами данного препарата унылые и обидчивые, особенно на фоне болей. Симптомы могут появляться весной, при холодной и сырой погоде.

Клиническое применение: см. «Цистит» в гл. «Мочевыводящая система».

Secale cornutum (спорынья)

По мнению многих гомеопатов, у *Secale cornutum* имеется большое сходство с *Arsenicum album*, за исключением того, что пациенты *Secale* не склонны к зябкости. И действительно, картины симптомов этих средств имеют много общего, особенно со стороны кишечника. Однако, в отличие от *Arsenicum album*, у *Secale cornutum* имеется тропность к матке. Гомеопатическое лекарство готовится из спорыньи (ржаная плесень), в составе которой имеется эрготамин — аллопатический препарат, стимулирующий родовую деятельность. Гомеопатическое средство *Secale cornutum* обладает таким же свойством, однако это воздействие более безопасное. Кроме того, как у аллопатического, так и у гомеопатического препарата выражена способность к сокращению кровеносных сосудов и уменьшению кровотечения. Ухудшение симптомов отмечается от тепла; улучшение — от холодных ванн и компрессов. Часто у животных с симптомами этого средства наблюдается повышенный аппетит.

Клиническое применение: см. «Выделения из влагалища», «Задержка отхождения плаценты», «Инфекции в послеродовом периоде» и «Прерывание беременности» в гл. «Репродуктивная система».

Selenium (селен)

Химический элемент селен принадлежит к той же группе элементов Периодической таблицы, что и сера; поэтому между гомеопатическими средствами *Sulphur* и *Selenium* много общего, хотя *Sulphur*, конечно, более известное и распространенное лекарство. Животные *Selenium* обычно слабые и вялые, их состояние ухудшается в жаркие летние дни. Отмечается шелушение кожи; шерсть кажется неухоженной и грязной, с участками выпадения волос. Недостаток минералов в организме часто приводит к развитию мышечной слабости; в подобных случаях

Selenium может быть очень полезным. Кроме того, это средство назначается при некоторых заболеваниях предстательной железы. Для животных *Selenium* характерны слабость, ухудшение симптомов в жару (особенно в жаркие дни), улучшение после захода солнца и, как правило, подавленное настроение.

Клиническое применение: см. «Заболевания простаты» в гл. «Репродуктивная система» и «Перегревание» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Sepia (каракатица аптечная)

Каракатицы принадлежат к тому же семейству головоногих моллюсков, что и кальмары и осьминоги. Для защиты от потенциальной опасности эти животные скрываются за завесой, которая создается при выбрасывании струи жидкости черного цвета. Животным с симптомами *Sepia* некоторым образом также свойственно желание скрываться от опасности и скрывать свои чувства; такие особи обычно равнодушны к своим опекунам и к семье, в которой они живут. Животные *Sepia* — одни из самых зябких; даже если в помещении тепло, они выйдут погреться на солнышке или будут держаться поближе к другому источнику тепла. Подобный симптом отмечается и у пациентов *Phosphorus*, однако различить эти препараты не так уж трудно — пациенты *Sepia* предпочитают одиночество и постоянно находятся в подавленном настроении.

Для животных *Sepia* характерны выделения зеленоватого или желтого цвета, особенно из носа и влагалища. У *Sepia* выражена тропность к матке, поэтому данное лекарство чаще применяется для лечения особей женского пола. Животные этого типа не переносят холод и холодный воздух; на холоде все симптомы ухудшаются. Улучшение состояния отмечается в тепле и при физическом напряжении.

Клиническое применение: см. «Запор» в гл. «Система пищеварения»; «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Недержание мочи» в гл. «Мочевыводящая система»; «Выделения из влагалища» и «Прерывание беременности» в гл. «Репродуктивная система».

Serum anguinale (сыворотка угря)

Сыворотка угря вызывает нарушение функции почек; гомеопатическое средство *Serum anguinale* помогает в некоторых случаях острой почечной недостаточности.

Клиническое применение: см. «Почечная недостаточность» в гл. «Мочевыводящая система».

Silicea (кремнезем)

Silicea — одно из главных гомеопатических средств, возможно, из-за способности данного лекарства излечивать некоторые осложнения вакцинации. Для лечения подобных состояний чаще применяется *Thuja*, и *Silicea* в некотором смысле является конкурентом этого препарата. У животных с картиной *Silicea* отмечается склонность к многочисленным кожным проявлениям — у них плохо заживают раны, наблюдается их нагноение и абсцедирование гнойных очагов. Кроме того, часто нарушается процесс формирования костной ткани, что приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, при лечении которых данное лекарство часто бывает очень полезным. *Silicea* также применяется при заболеваниях когтей и стоп (в том числе копыт).

У животных этого типа обычно светлая окраска, изящное телосложение и слабая мускулатура; некоторые из них необычайно красивы. Они отличаются от животных других типов хрупкостью и грациозностью. На самом деле животным *Silicea* просто не хватает жизненной силы для полноценного развития, быстрого заживления ран, физических нагрузок или даже, например, для нормальной дефекации. Часто такие животные необычайно робкие, особенно в непривычных ситуациях. Для *Silicea* характерна повышенная чувствительность к разнообразным влияниям внешней среды — к новым впечатлениям, громким звукам, яркому свету, к холоду. Животные такого типа не переносят холода, тогда как в тепле отмечается улучшение симптомов.

Во многих своих проявлениях *Silicea* напоминает *Mercurius*, поэтому эти средства не следует назначать одно за другим (см. описание *Mercurius*).

Клиническое применение: см. «Кожный зуд» и «Парша» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Абсцессы и кариозное разру-

шение зубов» в гл. «*Полость рта, десны и зубы*»; «Чиханье и выделения из носа» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*»; «Гипопион» в гл. «*Орган зрения*»; «Артрит», «Гипертрофическая остеодистрофия», «Расслаивающий остеохондрит», «Рахит» и «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса» в гл. «*Костно-мышечная система*»; «Выделения из половых путей», «Неполноценное молоко» в гл. «*Репродуктивная система*», «Абсцессы» и «Вакцинальные реакции» в гл. «*Показания к назначению средств при различных состояниях*».

***Spiranthes* (скученник осенний)**

У данного средства отмечается тропность к молочным железам и продукции молока. *Spiranthes* обладает способностью как увеличивать продукцию молока, так и уменьшать ее, причем низкие разведения, как правило, стимулируют, а высокие сокращают продукцию молока. Животные с симптомами этого препарата обычно сонливы и постоянно зевают.

Клиническое применение: см. «Недостаточная продукция молока» и «Как прекратить продукцию молока после завершения кормления» в гл. «*Репродуктивная система*».

***Spongia tosta* (греческая губка)**

Spongia в основном применяется при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем. Обычно начало таких заболеваний приходится на сухую холодную погоду с ветром. Животные с симптомами данного средства обычно беспокойные и боязливые, со склонностью вздрагивать во сне. Они постоянно испытывают жажду и чувство голода; после еды симптомы улучшаются и отмечается уменьшение кашля. Физические нагрузки и волнения, особенно при холодном ветре, ухудшают и усиливают симптомы, тогда как при спокойной обстановке и в тепле состояние обычно улучшается.

Клиническое применение: см. «Кашель» в гл. «*Система дыхания, нос и синусы*».

***Staphysagria* (живокость аптечная)**

Многие симптомы *Staphysagria* возникают вследствие травмы, причем острые состояния с показаниями к назначению *Staphysagria* связаны в основном с физической травмой (на-

пример, раны или катетеризация мочевого пузыря). Хронические болезни с симптомами *Staphysagria* чаще всего являются следствием психоэмоциональной травмы. Физические симптомы, приступы ярости и раздражительности возникают вследствие подавления эмоций в виде гнева и негодования по поводу прошлых обид. Состояние пациентов с симптомами данного препарата ухудшается из-за сильных эмоций и ссор.

Особенностью ран, при которых используется *Staphysagria*, является выраженная болезненность. Данное лекарство применяется в основном при ранах хирургического происхождения; для рваных и инфицированных ран более показаны *Arnica* и *Calendula*.

Клиническое применение: см. «Травмы глазного яблока» в гл. «Орган зрения»; «Обструкция уретры и катетеризация» в гл. «Мочевыводящая система»; «Травмы яичек» и «Заболевания простаты» в гл. «Репродуктивная система»; «Резаные и рваные раны» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Stramonium (дурман обыкновенный)

Сырьем для приготовления данного лекарства является растение, содержащее галлюциногенные субстанции. В основе галлюциноза при отравлении лежит страх, который вызывает мышечное напряжение и часто приводит к агрессивности. Гомеопатическое средство *Stramonium* часто назначается при агрессивности, в основе которой лежит чувство страха. Данное состояние в некоторых случаях возникает после введения антирабической вакцины.

Физические симптомы характеризуются напряжением за счет повышенной возбудимости симпатической нервной системы («испуг, борьба, побег»). Животные *Stramonium* часто боятся темноты и жмутся вечерами поближе к людям, поскуливают и часто будят своих хозяев по ночам без видимой причины. Они вздрагивают и пугаются при виде яркого света и зеркал. Из-за сильного страха такие животные предпочитают находиться поближе к людям и не выносят одиночества.

Клиническое применение: см. «Агрессивность» в гл. «Нервная система»; «Эклампсия» в гл. «Репродуктивная система» и «Боязнь громких звуков» в гл. «Показания к назначе-

нию средств при различных состояниях».

Strychninum (стрихнин)

При отравлении стрихнином наблюдается выраженное напряжение и сокращение мышц, а также сильнейшие спазмы под воздействием шума. Гомеопатическое средство *Strychninum* готовится из стрихнина и эффективно не только при случайных отравлениях стрихнином, но и при аналогичных симптомах, вызванных рядом других причин. Чаще всего подобное состояние наблюдается при эклампсии у собак, и назначение *Strychninum* в этих случаях вполне оправданно. Показанием к назначению данного средства являются заболевания, которые сопровождаются выраженными мышечными судорогами, при этом всегда отмечается значительное повышение рефлексов и расширение зрачков. Стрихнин также содержится в растениях, из которых готовится *Nux vomica* и *Ignatia*; именно поэтому в картине симптомов этих препаратов так много общего.

Клиническое применение: см. «Эклампсия» в гл. «Репродуктивная система».

Sulphur (сера)

Иногда данное средство называют «королевой гомеопатии» или основным полихрестом из-за широкого применения серы при гомеопатическом лечении преимущественно хронических болезней. На самом деле многие специалисты-гомеопаты не рекомендуют применять *Sulphur* при лечении острых состояний, а при лечении хронических болезней использовать только тогда, когда картина симптомов пациента будет полностью соответствовать картине симптомов данного средства; в противном случае возможно усиление симптоматики.

Тем не менее, в данной книге уже обсуждались некоторые показания для назначения *Sulphur*, в основном в тех случаях, когда другие препараты не помогают и отмечаются рецидивы заболевания. У животных с симптомами этого лекарства отмечаются нарушения иммунной системы; поэтому то, что легко заживает у других, не заживает у представителей типа *Sulphur*. В этом отношении *Sulphur* напоминает *Silicea*. Животные с типичными симптомами *Sulphur* неопрятные и вскло-

коченные – их мало интересует собственная внешность. Обычно они добрые, дружелюбные и весьма смышленные. Представители лекарственного типа *Sulphur* встречаются как среди собак, так и среди кошек.

У таких животных часто отмечается жажда и избыток внутреннего тепла. У них наблюдается плохой аппетит (духовное важнее телесного!), однако у некоторых аппетит даже повышен. Шерсть животных *Sulphur* обычно сухая и грубая, на коже отмечается шелушение. Они предпочитают либо двигаться, либо лежать – им не нравится спокойно стоять на месте. В общем такие животные производят впечатление лентяев. Часто отмечается покраснение глаз и естественных отверстий, выделения обычно прозрачные или беловатого цвета. Частым симптомом является жжение и зуд кожи, в том числе в области анального отверстия – именно из-за зуда они предпочитают лежать или на земле, или на коврах. Как правило, у таких животных есть блохи и гельминты. Короче говоря, их внешность оставляет желать много лучшего, однако мало кто из животных доставляет окружающим столько радости и приятных эмоций, сколько животные этого типа.

Клиническое применение: см. «Парша» и «Ушные клещи» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Диарея» в гл. «Система пищеварения»; «Чиханье и выделения из носа» в гл. «Система дыхания, нос и синусы»; «Конъюнктивит» и «Язвы роговицы» в гл. «Орган зрения»; «Почечная недостаточность» в гл. «Мочевыводящая система»; «Выделения из половых путей» и «Отставание в росте» в гл. «Репродуктивная система» и «Абсцессы», «Лихорадка и инфекции» и «Блохи» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Sulphur iodatum (йодид серы)

Во многом это средство подобно *Sulphur*, однако из-за присутствия йода избыток внутреннего тепла выражен еще сильнее. Обычно фолликулярный дерматит подбородка хорошо поддается лечению этим препаратом, однако лучше предоставить лечение этого заболевания опытному гомеопату. Основное острое показание для назначения *Sulphur iodatum* – случаи запора. Часто животные этого типа вялые и медлительные, им не нравится совершать какие-либо физические усилия.

Клиническое применение: см. «Запор» в гл. «Система пищеварения».

Symphitum (окопник лекарственный)

Это лекарство готовится из растительного сырья, обладающего выраженным свойством стимуляции репаративных процессов, в том числе заживления язв различной локализации (включая язвы желудка) и консолидации костных отломков. Гомеопатическое средство *Symphitum* успешно применяется для лечения переломов, в том числе таких, которые заживают медленно или не заживают вовсе. Данное лекарство является основным при травмах глазного яблока.

Клиническое применение: см. «Травмы глазного яблока» в гл. «Орган зрения» и «Расслаивающий остеохондрит» и «Первая помощь при переломах» в гл. «Костно-мышечная система».

Syphilinum (нозод сифилинума)

Это средство представляет собой нозод и обладает глубоким действием. У *Syphilinum* много показаний для назначения животным, несмотря на то, что это нозод человеческой болезни (сифилиса). Особенно часто это средство применяется при состояниях, сопровождающихся изъязвлением и разрушением тканей. Назначение данного нозода — прерогатива профессионалов-гомеопатов, и в этой книге о *Syphilinum* упоминается лишь для ознакомления ветеринаров-гомеопатов. В США данное средство можно приобрести только по рецепту. Во французских гомеопатических изданиях принято название «*Luesinum*».

Клиническое применение: см. «Воспаление десен и воспалительные процессы в полости рта» и «Ретенционная подъязычная киста» в гл. «Ротовая полость, десны и зубы»; «Конъюнктивит» и «Язвы роговицы» в гл. «Орган зрения»; «Расслаивающий остеохондрит» и «Паностеит» в гл. «Костно-мышечная система» и «Крипторхизм» в гл. «Репродуктивная система».

Tarentula cubensis (тарантул кубинский)

Tarentula cubensis назначается при выраженном воспалительном процессе, который сопровождается сильными боля-

ми. Воспаленные ткани приобретают синюшный оттенок и становятся плотными, ощущается жжение, как от огня. По мнению некоторых гомеопатов, данное лекарство может предупредить развитие бубонной чумы, если будет назначено в инкубационном периоде. Оно также предупреждает развитие интоксикации при укусе коричневого паука-отшельника, если его назначить сразу же после укуса. Не следует путать это лекарство с *Tarentula hispanica*.

Клиническое применение: см. «Укусы и ужаливания» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Эвтаназия» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Thlaspi bursa pastoris* (пастушья сумка)**

Это преимущественно острое средство, которое назначают при циститах и обструкции мочеочника. В некоторых случаях *Thlaspi* применяется при кровотечениях. У животных с симптомами данного препарата имеется склонность к постоянному хождению и перемещению с места на место.

Клиническое применение: см. «Цистит» и «Обструкция уретры и катетеризация» в гл. «Мочевыводящая система».

***Thuja occidentalis* (туя западная)**

Thuja является одним из важнейших гомеопатических препаратов при вакцинозе, т. е. заболеваниях, имеющих отношение к вакцинации. Большинство последствий вакцинации связано с мочевыводящей системой, спинным мозгом и кожными покровами. У данного лекарства отмечается тропность именно к этим системам и органам. У большинства животных обнаруживается благоприятная ответная реакция на назначение *Thuja* при вакцинозе. В основном это средство используется при хронических болезнях; *Thuja* может помочь в тех случаях, когда другие лекарства не оказывают эффекта из-за сильного воздействия вакцинации на организм.

У животных этого типа часто наблюдаются родимые пятна, бородавки и другие кожные разрастания. Отмечается выпадение шерсти и ломкость волос. Пациенты *Thuja* обычно крайне зябкие и чувствительные к холодной сырой погоде. Они пугаются незнакомых людей и испытывают страх в новой неизвестной ситуации.

Многие назначают данное средство с целью предупреждения нежелательных последствий вакцинации, при этом предполагается, что вакцина предупредит развитие заболевания, а гомеопатическое средство минимизирует вредные последствия вакцинации. Подобная точка зрения не соответствует действительности. На самом деле *Thuja* не обладает способностью предупреждать осложнения после вакцинации; а введение вакцины приносит больше вреда, чем пользы. Более подробная информация о вакцинации и ее последствиях изложена в гл. 16 «Вакцинация».

Клиническое применение: см. «Стригущий лишай» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Подъязычная ретенционная киста» и «Абсцессы и кариозное разрушение зубов» в гл. «Полость рта, десны и зубы»; «Конъюнктивит» и «Язвы роговицы» в гл. «Орган зрения»; «Цистит», «Обструкция мочеочника и катеризация» в гл. «Мочевыводящая система»; «Гипертрофическая остеодистрофия» в гл. «Костно-мышечная система»; «Дегенеративная миелопатия» и «Травмы головного и спинного мозга» в гл. «Нервная система»; «Выделения из половых путей», «Заболевания простаты» и «Ослабленные котята и щенки» в гл. «Репродуктивная система» и «Реакции при введении некоторых лекарственных препаратов» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

***Tuberculinum* (нозод туберкулеза)**

Tuberculinum представляет собой нозод, который готовится из легочной ткани коров, больных туберкулезом. В США *Tuberculinum* можно приобрести только по рецепту. Лечение животных этим препаратом следует проводить в соответствии с назначением специалиста-гомеопата. В книге приводятся некоторые показания к назначению *Tuberculinum* именно для ознакомления ветеринаров-гомеопатов. У людей данное средство полезно при лечении как физически ослабленных субъектов, так и при повышенной физической активности. В моей практике были случаи успешного назначения *Tuberculinum* при повышенной физической активности животных.

Клиническое применение: см. «Болезнь Легга-Кальве-Пертеса» в гл. «Костно-мышечная система» и «Крипторхизм» в гл. «Репродуктивная система».

Urtica urens (крапива жгучая)

Основными симптомами *Urtica urens* является зуд, ощущение жжения и покалывания в различных участках тела. *Urtica* имеет тропность к кожным покровам, мочевыводящей системе, суставам и молочным железам. У животных с симптомами данного препарата при употреблении в пищу моллюсков часто отмечаются различные нарушения, в этих случаях назначение *Urtica* будет полезным. Преимущественно «правостороннее» средство; запах животного с симптомами этого лекарства напоминает запах мочи. Отвар из этого растения является хорошим стимулятором функции почек.

Клиническое применение: см. «Кожный зуд» и «Ожоги пламенем и кипятком» в гл. «Кожные покровы и уши»; «Цистит» в гл. «Мочевыводящая система»; «Недостаточная продукция молока», «Как прекратить продукцию молока после завершения кормления» и «Мастит» в гл. «Репродуктивная система» и «Аллергические реакции» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Vaccin attenuie bilie (нозод БЦЖ)

Данное гомеопатическое средство готовится из ослабленных возбудителей туберкулеза (*Bacillus Calmette-Guerin*), которые используются для специфической вакцинации. В качестве стимулятора иммунной системы ослабленные возбудители туберкулеза добавляются также в состав убитой вакцины. Картина симптомов гомеопатического средства из *BCG* во многом сходна с картиной *Tuberculinum*; одним из показаний данного средства, так же как и *Tuberculinum*, является болезнь Легга–Кальве–Пертеса.

Животные с симптомами данного средства напоминают животных *Calcarea phosphorica* и *Silicea*. Они обычно зябкие, слабые и худые, часто отмечается нарушение физического развития и легкая утомляемость. Как правило, у них повышенная чувствительность к шуму и громким звукам. У таких животных отмечается нарушение пищеварения в виде вздутия живота после еды и замедленного пассажа содержимого кишечника, вследствие чего они страдают хроническим запором. У них часто отмечается грубый сухой кашель, воспалительные процессы в области глаз и отечность глоточных миндалин. Характер-

на левосторонняя локализация симптомов. Состояние этих животных ухудшается ближе к вечеру и после физической нагрузки и улучшается при потягивании и после еды. В целом животные с симптомами данного препарата слабые, хилые, со сниженной жизнестойкостью.

Vaccin attenuе bilie назначается очень редко. Препарат производится «Лабораторией Буарон» (Франция), однако в соответствии с правилами FDA его нельзя назначать в США.

Клиническое применение: см. «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса» в гл. «Костно-мышечная система».

Veratrum album (чемерица белая)

Картина симптомов этого препарата во многом сходна с *Arsenicum album*, однако симптомы у *Veratrum album* выражены сильнее. Характерны сильная рвота и диарея, возникающие внезапно. Животные этого типа слабые, истощенные, с недостатком внутреннего тепла. Нос, уши и стопы обычно холодные на ощупь. Такие животные часто нуждаются в помощи ветеринара, однако назначение *Veratrum album* помогает улучшить их состояние. Ухудшение симптомов отмечается при малейших физических усилиях, питье воды и в холодную сырую погоду, улучшение – в покое и тепле. Состояние может улучшиться при употреблении в пищу мяса, если животное не слишком ослаблено болезнью. Обычно животные *Veratrum album* физически слабы; если же сил достаточно, то они, как правило, раздражительные.

Клиническое применение: см. «Рвота» и «Диарея» в гл. «Система пищеварения»; «Отравление пищей и пищевыми отбросами» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Veratrum viride (чемерица зеленая)

Многие симптомы данного лекарства сходны с симптомами *Veratrum album*. Однако у *Veratrum viride* обнаруживается склонность к застойному полнокровию и повышенная чувствительность к жаре. Часто у таких животных отмечаются спазмы и мышечные подергивания. Вслед за застойным полнокровием может развиваться состояние прострации. Характерным симптомом является сильная головная боль и расширен-

ные зрачки. Все симптомы ухудшаются при попытке встать из положения лежа.

Клиническое применение: см. «Перегревание» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Vipera (гадюка обыкновенная)

Данное средство готовится из змеиного яда и иногда применяется при укусах змей. Раны отличаются чрезвычайной болезненностью. Часто наблюдается усиление рефлексов, вслед за чем развивается частичный паралич (парез) задних конечностей. Животные с симптомами данного средства стараются держать конечности в приподнятом положении из-за сильных болей, которые начинаются, если их опустить вниз. Отмечается примесь крови в моче и нарушение функции почек.

Клиническое применение: см. «Укусы змей» в гл. «Показания к назначению средств при различных состояниях».

Yohimbium (йохимбе)

Растение «йохимбе» обладает стимулирующим воздействием на мужские половые органы и сексуальную активность. Гомеопатическое средство *Yohimbium* применяется в случаях повышенной сексуальной активности у кобелей с целью их «утихомирить».

Клиническое применение: см. «Гиперсексуальное поведение» в гл. «Репродуктивная система».

Дополнение

Словарь специальных терминов

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Аллопатия (*allos* – другой, *pathos* – болезнь). Метод лечения заболеваний по принципу противоположности. Врачи-аллопаты лечат болезнь, а не пациента. Этот термин обычно используется в отношении западной медицинской школы, которая доминирует в современной медицинской науке. Иногда аллопатия называется также «конвенциональная медицина». См. гл. 1 «Введение в гомеопатию».

Аутоиммунный. Это заболевание, при котором в организме нарушается функция иммунной системы по распознаванию «своего» и «чужого», в результате чего иммунная система может «атаковать» ткани и органы своего собственного организма, вызывая их повреждения. Примерами аутоиммунных заболеваний являются аллергические болезни, волчанка, ревматоидный артрит, большинство заболеваний щитовидной железы, ряд болезней крови, кишечника и т. п. Фактически большинство заболеваний, с которыми встречаются как врачи, так и ветеринары, имеют аутоиммунный характер.

Встряхивание (суккуссия). Это процесс энергичного перемешивания, который следует проводить после каждого разведения при приготовлении гомеопатических средств. Многие гомеопаты полагают, что именно процесс встряхивания придает силу (энергию) гомеопатическому средству.

Гомеопатическое средство. Гомеопатические средства представляют собой лекарственные препараты, приготовленные в соответствии с основными гомеопатическими методами – разведением и встряхиванием. С точки зрения воздействия на организм только правильно подобранное для данного пациента средство может быть названо гомеопатическим. Чтобы соответствовать определению, гомеопатическое лекарство должно быть подобно картине болезни (см. «Гомеопатия»). Таким образом, гомеопатическое средство – это подобное средство.

Гомеопатия (*homeo* – подобный, *pathos* – болезнь). Метод лечения малыми дозами специально подобранных веществ,

которые в больших дозах вызывают симптомокомплекс, напоминающий картину болезни. Кроме того, врачи-гомеопаты лечат организм в целом, а не болезнь.

Жизненная сила. Этот термин ввел С. Ганеман для описания субстанции, представляющей собой сущность жизни. Именно за счет жизненной силы поддерживается жизнь и здоровье каждого живого существа. Во многом понятие жизненной силы тождественно понятию *Ци* в китайской медицине; по представлениям древнекитайских ученых, энергия *Ци* струится по организму и обеспечивает его жизнь и активность. Жизненная сила (и энергия *Ци*) существует отдельно от физического тела – это нечто большее, чем физические и химические процессы в организме любого живого существа.

Излечение. Полное исчезновение симптомов болезни в сочетании с улучшением общего состояния здоровья. См. гл. 3 «Природа излечения», а также «Паллиативное улучшение» и «Подавление симптомов».

Изопатия (*iso* – такой же, *pathos* – болезнь). Побочная ветвь гомеопатии, когда нозод (см. далее) готовится из продуктов болезни и затем используется для лечения этой же болезни. В общем, этот метод не является особенно эффективным, так как полноценная ответная реакция организма возможна лишь при назначении пациенту подобного гомеопатического средства, а не продукта болезни.

Испытание (прувинг). Испытанием называется тестирование гомеопатического средства на здоровых людях для определения его свойств. При испытании определяются характеристики каждого лекарства; полученная информация включается в гомеопатическую *Materia Medica* и в Реперториум, где организуется в определенном порядке для оптимального усвоения. Термин «*proving*» заимствован из немецкого языка, в котором «*prufung*» означает «тестирование». См. гл. 1 «Введение в гомеопатию».

-ит. Данный суффикс в названии болезни указывает на ее вос-

палительный характер. Таким образом, термин «ирит» означает воспаление радужной оболочки глаз, «аппендицит» – воспаление червеобразного отростка и т. п. В рамках конвенциональной медицины воспаление обычно отождествляется с инфекцией, однако это не совсем правильно. К огромному сожалению, отождествление воспаления и инфекции приводит к тому, что многие пациенты принимают антибиотики без показаний.

Комбинированное средство. В состав комбинированного гомеопатического средства входит несколько средств, иногда в разных потенциях. Например, некоторые фармацевтические компании производят комбинированное гомеопатическое средство для лечения диареи, в состав которого входят несколько препаратов, которые потенциально могут излечить данную патологию. Идея состоит в том, что из набора средств организм сам выберет то, которое нужно. Некоторые гомеопаты считают оправданным применение подобных лекарств при ряде острых состояний, однако не следует забывать, что их нельзя применять для лечения серьезных заболеваний и нельзя использовать дольше недели. Маловероятно, но возможно, что состояние пациента может ухудшиться из-за чрезмерного применения неправильно подобранных средств.

Конституциональное лечение. Разные гомеопаты вкладывают в понятие «конституциональное лечение» разный смысл. Сущность конституционального лечения состоит в назначении гомеопатического средства для лечения организма в целом. По мнению некоторых гомеопатов, конституциональным является любое правильно подобранное средство. Другие гомеопаты считают, что на протяжении всей жизни пациент демонстрирует проявления одного и того же лекарственного препарата. Таким образом, правильно подобранное конституциональное лекарство сможет излечивать почти все заболевания или отклонения в состоянии здоровья. Например, назначение *Pulsatilla* животному с симптомами данного средства поможет вернуть ему здоровье. На основании моего опыта могу сказать, что в некоторых случаях так и происходит. Однако у некоторых пациентов в течение жизни можно наблюдать картины нескольких лекарственных средств, сменяющих друг друга, что может

происходить в том числе и вследствие гомеопатического лечения. Ряд авторов подразумевает под этим «лекарственные слои», которые «удаляются» под воздействием гомеопатических препаратов (как при чистке лука мы удаляем кожуру слой за слоем). В соответствии с этими представлениями каждый «слой» необходимо удалять последовательно, начиная с внешнего, поэтому попытка сразу приступить к удалению глубоких слоев будет безуспешной. В этих представлениях, безусловно, есть рациональное зерно, однако они не совсем точно отражают сущность конституционального лечения. Возможно, правильнее считать, что происходит не наложение картин различных лекарственных средств, а их взаимное переплетение. Наконец, некоторые гомеопаты считают, что конституциональное лечение равноценно лечению хронического заболевания. Другими словами, конституциональное средство излечивает хроническую болезнь, которая представляет собой проявление слабости конституции, а не острую болезнь, как, например, респираторное заболевание, которое возникает вследствие внешнего воздействия. Таким образом, для лечения хронической болезни у пациента следует назначать именно конституциональное средство, а не острое лекарство, на которое указывают некоторые яркие симптомы. В главах, посвященных лечению различных болезней, рассматривается именно такой подход к назначению конституциональных препаратов. См. также гл. 5 «Применение гомеопатии в домашних условиях».

Кортизон. Этот препарат готовится из ткани надпочечников убойного скота и обладает противовоспалительным и иммуносупрессивным действием. В настоящее время кортизон применяется редко, так как почти полностью заменен синтетическими кортикостероидами типа преднизона. Многие врачи до сих пор ошибочно называют любой препарат коры надпочечников (особенно инъекционный) кортизоном. Именно по этой причине в тексте название «кортизон» приводится в кавычках.

«Кризис исцеления». В некоторых случаях после назначения гомеопатических средств у пациента в течение короткого промежутка времени отмечается усиление симптомов. Обычно данное усиление касается только физических симптомов; час-

то психоэмоциональное состояние пациентов даже улучшается несмотря на усиление физических симптомов. См. гл. 3 «Природа лечения».

***Materia Medica*.** Это руководство, где описываются картины симптомов и применение различных гомеопатических средств. В переводе с латинского языка *Materia Medica* означает «вещества для лечения». В общем *Materia Medica* примерно соответствует «Настольному справочнику врача». В справочниках такого типа вплоть до начала этого века описывались не только специфические гомеопатические средства, но и лекарства, принятые в конвенциональной медицине. Однако в настоящее время, насколько мне известно, в *Materia Medica* представлены описания исключительно гомеопатических средств.

Миазм. Этот термин означает «склонность к развитию болезни». Первоначально термин «миазм» означал склонность к заболеванию вследствие воздействия какой-либо внешней силы, однако в настоящее время этот термин применяется для описания способа, которым болезнь поражает организм. Известны три основных миазма: *псора*, при которой имеется склонность к недостаточной ответной реакции на болезнь; *сикоз*, при котором отмечается сверхвыраженная ответная реакция на болезнь (например, образование бородавок и опухолей), и *сифилис*, при котором иммунная система животных способствует развитию деструктивных процессов в организме, например образованию язв. У каждого из миазмов имеется тенденция к поражению определенных органов, однако возможно их частичное совпадение.

Настой. Настой представляет собой раствор, который готовится путем заваривания сухого или свежего растительного сырья кипящей водой и настаивания до полного охлаждения. В сущности, всем известный чай тоже представляет собой настой, однако настоящий настой процеживается после охлаждения.

Нозод. Нозод представляет собой гомеопатическое средство, приготовленное из продуктов болезни. *Distemperium*, например, готовится из секрета слизистых оболочек собак, больных

собачьей чумой. Однако важно понять, что лекарство, приготовленное из лабораторной культуры вируса собачьей чумы, и нозод *Distemperium* – это совсем не одно и то же. Нозод представляет собой сущность болезни, воплощенную в продукте болезни, а не скопление вирусов или бактерий. Возможны два способа применения нозодов. Во-первых, нозод можно подвергнуть испытанию (см. «Испытания») для определения картины симптомов, что позволит в дальнейшем назначать его в качестве гомеопатического средства в соответствии с определенными показаниями. Во-вторых, нозоды можно применять у других особей того же вида с превентивной целью. Несмотря на то, что данное показание вызывает множество возражений, по моему мнению, назначение нозодов является достаточно эффективной мерой при условии, что *нозод назначается примерно в то самое время, когда происходит заражение*. При назначении нозода более чем за несколько дней до начала заболевания особого эффекта не отмечается. Весьма вероятно, что наилучшее время для назначения нозода – инкубационный период болезни, т. е. промежуток времени между заражением и появлением первых симптомов.

-оз. Данный суффикс указывает на наличие болезненного патологического состояния, не связанного с воспалением. Подобное состояние можно также обозначить как «увеличение», особенно в отношении иммунных клеток или клеток крови. Например, термин «невроз» означает аномальное состояние психической сферы, «вакциноз» – болезнь, которая возникла как следствие вакцинации, «лейкоцитоз» – увеличение количества лейкоцитов в периферической крови.

Острый. Острым называется быстро развивающееся состояние. Чаще всего при развитии острого состояния симптомы выражены сильнее, чем при хроническом, хотя термин «острый» скорее отражает временной фактор в развитии процесса, чем выраженность симптомов. В зависимости от временного фактора различаются заболевания со сверхострым течением (молниеносным), острым, подострым и хроническим (при этом сверхострое течение – наиболее быстрое, а хроническое течение – наиболее медленное). В гомеопатии принято называть ост-

рым заболеванием такое, при котором процесс развивается быстро и склонен к самоограничению. Возможно также острое проявление хронического заболевания, при котором медленное и постепенное течение заболевания внезапно нарушается и начинается быстрое усиление симптомов. См. также «Хронический» в данном разделе, гл. 2 «Природа болезни» и гл. 5. «Применение гомеопатии в домашних условиях».

Паллиативное улучшение. Паллиативное улучшение представляет собой временное улучшение одного или нескольких физических симптомов без воздействия на основу болезни. При острых самокупирующихся состояниях болезнь затем может самостоятельно купироваться, однако при хронических болезнях продолжается ухудшение. Для более подробной информации см. гл. 3 «Природа излечения». См. также «Излечение» и «Подавление симптомов».

Подавление (супрессия). Этот термин означает элиминацию (удаление) одного или нескольких симптомов из клинической картины, вслед за чем возникают новые, более тяжелые симптомы или ухудшение состояния. Таким образом, на процесс подавления менее тяжелых симптомов (или на смещение этих симптомов внутрь) организм реагирует ухудшением состояния и усугублением патологических изменений. Для более подробной информации см. гл. 3 «Природа излечения», а также разделы «Излечение» и «Паллиативное улучшение».

Подобный (подобнейший). Подобным (подобнейшим) называется гомеопатическое средство, наиболее подходящее к данному случаю. Другими словами, это наиболее правильно выбранное лекарство, «гомеопатичное» данному пациенту.

Полихрест. Гомеопатическое средство-полихрест отличается широкими возможностями применения. Картина симптомов полихреста соответствует большому количеству случаев; в сущности, полихрест можно рассматривать как основной тип или категорию индивидуумов. Такие гомеопатические лекарства назначаются очень часто и подробно описываются во всех гомеопатических справочниках; гомеопатические средства-

полихресты действительно имеют больше показаний, чем другие препараты. Основными полихрестами являются *Sulphur*, *Lycopodium*, *Pulsatilla*, *Phosphorus*, *Calcareo carbonica*, *Arsenicum album*, *Natrum muriaticum*, *Silicea*, *Nux vomica* — хотя на самом деле их намного больше.

Потенция/потенцирование. Потенция является отражением силы гомеопатического средства. В зависимости от способа приготовления каждое лекарство может иметь различные потенции. Потенция средства не тождественна материальному количеству содержащегося в нем лекарственного средства — скорее, это отражение энергетической силы лекарственного средства. Таким образом, шкала потенций не является аддитивной шкалой — другими словами, две крупинки средства потенции 6С не эквивалентны потенции 12С. Потенцирование представляет собой процесс последовательного разведения и встряхивания гомеопатического препарата. Для более полной информации см. гл. 1 «Введение в гомеопатию» и гл. 5 «Применение гомеопатии в домашних условиях».

Признак. См. «Симптом».

Пурулентный. Это означает отделение или содержание гноя.

Реперториум. В переводе с латыни это слово означает «сумма» или «собрание». Это специальное название гомеопатического справочника, где каталогизированы симптомы и состояния; к каждому симптому прилагается перечень гомеопатических средств, которые содержат данный симптом как часть своей картины симптомов. Например, если у животного развивается абсцесс корня зуба, то следует найти в «Реперториуме» Кента раздел «Зубы» и название «Абсцесс» с перечислением гомеопатических средств, в картине которых есть данный симптом. Симптом или состояние, дополненные перечислением соответствующих средств, называется «рубрикой».

Рубрика. См. выше — «Реперториум».

Симптом. Симптом представляет собой реакцию организма в

ответ на болезнь. Таким образом, симптом — это не болезнь сама по себе, а ее отображение в организме. Некоторые гомеопаты различают симптом и признак, считая симптом субъективным явлением, а признак — объективным явлением. Например, болезненность глотки представляет собой симптом, так как субъективно ощущается пациентом; гиперемия глотки является признаком, так как воспринимается как объективный факт. По современным представлениям, симптом и признак — понятия равноценные и взаимозаменяемые, особенно если речь идет о лечении животных. В гомеопатии различаются несколько классов симптомов: характерные, распространенные, общие, местные (локальные), необычные, редкие и особенные.

Характерные симптомы в точности отражают болезнь данного пациента. К характерным симптомам не относятся распространенные симптомы; характерные симптомы позволяют индивидуализировать каждый случай заболевания и выявить на их основе наиболее подобное гомеопатическое средство.

Распространенные симптомы отмечаются у большинства пациентов с тождественным состоянием; на их основе не удастся индивидуализировать случай и подобрать подобное гомеопатическое средство. Например, у всех собак при развитии парвовирусной инфекции отмечается диарея с примесью крови.

Общие симптомы представляют собой реакцию на болезнь организма в целом, в том числе ответную реакцию организма на воздействие окружающей среды. Следовательно, общие симптомы более ценны по сравнению с местными.

Местные (локальные) симптомы представляют собой реакцию организма на болезнь местного характера. Эти симптомы менее важны, так как обычно они являются распространенными симптомами и не отличаются особым разнообразием.

Необычные, редкие и особенные симптомы представляют собой неожиданные, специфичные для данного пациента исключительные признаки заболевания, имеющие большую ценность, так как часто указывают на подобное гомеопатическое средство.

Сыпь. Сыпь представляет собой поражение кожи или слизистых оболочек в виде пустул, папул, гнойничков или язв.

Хемоз. При хемозе отмечается выраженное воспаление конъюнктивы глаз с гиперемией и отеком глазного яблока под веками, напоминающее поражение глаз химическими реагентами. См. гл.10 «Орган зрения».

Хронический. См. «Острый» в данном разделе. Хронические болезни развиваются медленно и постепенно, симптомы проявляются спустя месяцы и даже годы. Часто хронические болезни имеют аутоиммунный характер; их возникновение часто связано с неполноценным питанием, вакцинацией или воздействием ряда токсических факторов. Безосновательно было бы предполагать, что болезни такого характера могут исчезнуть менее чем за несколько месяцев; в некоторых случаях процесс излечения занимает два-три года. В настоящее время хронические болезни встречаются значительно чаще, чем острые. Многие заболевания, которые ранее считались острыми, на самом деле представляют собой острые проявления хронических болезней, как, например, цистит или дерматит с участками раздражения кожи. См. также гл. 2 «Природа болезни» и гл. 5 «Применение гомеопатии в домашних условиях»

Примечания

Предисловие

1. Richard Pitcairn, DVM, PhD. Personal communication.

Глава первая

1. Samuel Hahnemann, *Organon of the Medical Art*, trans. W. O'Reilly (Redmond, Washington: Birdcage Books, 1996), 60. (Manuscript date ca 1842.)
2. James Kent, *Lectures on Homeopathic Philosophy* (Berkeley, California: North Atlantic Books, 1979), 22. (Originally published in 1900.)
3. Much of the biographical material on Hahnemann comes from Harris Coulter's monumental work on the history of medicine, *Divided Legacy, volume II* (Washington, D.C.: Wehawken Book Co., and Berkeley, California: North Atlantic Books, 1988). I highly recommend the entire series, volumes I–IV, for a fascinating look at the development of medicine in the Western world.
4. Harris Coulter, *Divided Legacy, volume I* (Washington, D.C.: Wehawken Book Co., 1975), 380.
5. Samuel Hahnemann, *Lesser Writings*, ed. and trans. R.E. Dudgeon (New Delhi: B. Jain, 1990), 248. (Originally published in 1851.)
6. Thomas Bradford, *Life and Letters of Hahnemann* (New Delhi: B. Jain, 1992). (Originally published in 1895.)
7. Constantine Hering, *Analytical Therapeutics* (New York and Philadelphia: Boericke and Tafel, 1875), 24. Quoted in Coulter, *Divided Legacy vol I*, 417.
8. *The American Heritage Dictionary* Version 4.0, Softkey International, Inc., 1995.
9. Harris Coulter, *Divided Legacy, volume III* (Berkeley, California: North Atlantic Books and Homeopathic Educational Services, 1982), 306.
10. ———, *Divided Legacy, volume III*.
11. Jay Yasgur, *Yasgur's Homeopathic Dictionary* (Greenville, Pennsylvania: Van Hoy Publishers, 1998), 378.
12. Hahnemann, *Organon of the Medical Art*, 236–237.

Глава вторая

1. Harriet Beinfield and Efrem Korngold, *Between Heaven and Earth—A Guide to Chinese Medicine* (New York: Ballantine Books, 1991), 30–31.
2. James Kent, *Lectures on Homeopathic Philosophy* (Berkeley, California: North Atlantic Books and Homeopathic Educational Services, 1979). (Originally published in 1900.)
3. Philip Incao, "Nurture your Child," interview by Noelle Denke, *Lilipoh* 3, no. 11 (Winter/Spring 1998): 25.
4. Steven Jay Gould, *The Flamingo's Smile: Reflections in Natural History*. (New York: Norton, 1985), 160.
5. *The American Heritage Dictionary, Version 4.0*, Softkey International, 1995.

6. Samuel Hahnemann, *Organon of Medicine*, Trans. Jost Kunzli et. al. (London, Victor Gollancz, 1992).
7. Louis Pasteur, quoted in Laurie Garrett, *The Coming Plague* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1994), 192.
8. Francis Pottenger, *Pottenger's Cats: A Study in Nutrition* (San Diego. Price-Pottenger Nutrition Foundation, 1995).
9. Dorothy Shepherd, *Magic of the Minimum Dose* (New Delhi: B. Jain, 1997), 211.
10. James Kent, *Lectures on Homeopathic Philosophy* (Berkeley, California: North Atlantic Books and Homeopathic Educational Services, 1979). (Originally published in 1900.)
11. George Vithoulkas, *A New Model for Health and Disease* (Berkeley, California: North Atlantic Books and Mill Valley, California: Health and Habitat, 1991).
12. _____. *The Science of Homeopathy*, (New York: Grove, 1980).
13. Harris Coulter, *Vaccination, Social Violence, and Criminality*, (Berkeley, California: North Atlantic Books and Washington, D.C.: Center for Empirical Medicine, 1990).
14. Martin Miles, *Homeopathy and Human Evolution* (London: Winter Press, 1992).

Глава четвертая

1. Stuart Close, *The Genius of Homeopathy*. Reprint, New Deldi: B. Jain, 1996.
2. John Anderson, "The Poisons in Pet Food." *Alternative Medicine* 23: 82. (1998).

Глава шестая

1. J. Munoz and R.K. Bergman, "Some histamine sensitizing properties of soluble preparations of the histamine sensitizing factor (HSF) from *Bordetella pertussis*." *Journal of Immunology* 97, no.1 (1966): 120-125.
2. Richard Pitcairn, DVM, PhD and Susan Pitcairn, *Natural Health for Dogs and Cats*. (Emmaus, Pennsylvania, Rodale Press, 1995), 302.
3. Dr. M.L. Tyler and Sir John Weir, *Acute Conditions, Injuries, etc.* (London, British Homeopathic Association, 1982), 28.
4. Richard Pitcairn, DVM, PhD and Susan Pitcairn, *Natural Health for Dogs and Cats*. (Emmaus, Pennsylvania, Rodale Press, 1995), 264.

Глава седьмая

1. A.C. Guyton and J. E. Hall. *Textbook of Medical Physiology* (Philadelphia: Saunders, 1996), 818.
2. Richard Pitcairn, DVM, Ph.D. Personal communication. The concept of feline gingivitis as a form of scurvy originated with Dr. Pitcairn, though I have expanded upon the idea.
3. John H. Clarke. *Dictionary of Practical Materia Medica* 1900. (Reprint, New Delhi: B. Jain, 1991), 789.

Глава восьмая

1. Francis Pottenger, *Pottenger's Cats, A Study in Nutrition* (San Diego: Price-Pottenger Nutrition Foundation, 1995).

Глава одиннадцатая

1. Michael Lieb and William Monroe, *Practical Small Animal Internal Medicine* (Philadelphia, W.B. Saunders, 1996), 312.
2. K.C. Bovee, "Management of Chronic Renal Disease," in *Renal Disease in Dogs and Cats*, ed. A.R. Michell (Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1988), 151.
3. Farley Mowat, *People of the Deer* (New York: Pyramid Books, 1968).

Глава тринадцатая

1. Lou Klein, Lecture, National Center for Homeopathy Annual Conference, San Diego, CA, 1998.

Глава пятнадцатая

1. Harris Coulter, *Vaccination, Social Violence, and Criminality* (Berkeley, California: North Atlantic Books, 1990).
2. See the book *Ritalin-Free Kids*, by Judith Reichenberg Ullman and Robert Ullman (Rocklin, California: Prima Publishing, 1996), for information on homeopathic treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adults.
3. Jean Dodds, DVM. *More Bumps on the Vaccine Road*. Lecture and Proceedings of the American Holistic Veterinary Medical Association annual conference, Snowmass, CO, 1995.

Глава шестнадцатая

1. Niels Pedersen et al., "Evaluation of a commercial feline leukemia virus vaccine for immunogenicity and efficacy," *Feline Practice* 15 (1985): 7-20.
2. R. Sharpee et al., "Feline leukemia vaccine: evaluation of safety and efficacy against persistent viremia and tumor development," *Comp Cont Educ Pract Vet* 8 (1986): 267-268.
3. Alfred Legendre et al., "Efficacy of a feline leukemia virus vaccine in a natural exposure challenge," *J Vet Internal Med* 4 (1990): 92-98.
4. Roy Pollock and Janet Scarlett, "Randomized blind trial of a commercial FeLV vaccine," *J Am Vet Med Assoc* 196 (1990): 611-616.
5. Janet Scarlett and Roy Pollock, "Year two of follow-up evaluation of a commercial feline leukemia virus vaccine," *J Am Vet Med Assoc* 199 (1991): 1431-1432.
6. Tom Phillips and Ron Schultz, "Canine and Feline Vaccines," in *Current Veterinary Therapy XI*, ed. R. Kirk and J. Bonagura (Philadelphia: Saunders, 1992), 205.
7. Ron Schultz, "Theory and Practice of Immunization" (paper presented at the annual

meeting of the American Holistic Veterinary Medical Association, Snowmass, CO, September 1995), 92–104.

8. Neil Miller, *Vaccines: Are They Really Safe and Effective?* (Santa Fe, NM: New Atlantean Press, 1994).

9. Schultz, "Theory and Practice of Immunization", 92–104.

10. Christopher Day, "Isopathic prevention of Kennel Cough- Is Vaccination Justified?," *International Journal of Veterinary Homeopathy* 2, no. 2 (1987).

11. Proceso Ortega, *Notes on the Miasms* (New Delhi: National Homeopathic Pharmacy, 1980), 46.

12. Viera Scheibner, *Vaccination: The Medical Assault on the Immune System* (Maryborough, Victoria, Australia: Australian Print Group, 1993).

13. Miller, *Vaccines: Are They Really Safe and Effective?*, 36.

14. Scheibner, *Vaccination: The Medical Assault on the Immune System*, 49.

15. J. Cherry et. al., "Report of the task force on pertussis and pertussis immunisation," *Pediatrics-Supplement* (1988), 939–984.

16. Viera Scheibner, *Dangers and Ineffectiveness of Vaccinations*, videocassette, 1995.

17. Compton Burnett, *Vaccinosis and Its Cure By Thuja* (New Delhi: B. Jain, 1990), 16–17.

18. Samuel Hahnemann, *Organon of Medicine*, 6th edition. ed. J. Kunzli et al. (London: Victor Gollanz, 1992), 33.

19. Clarence Fraser, ed. *The Merck Veterinary Manual* (Rahway, New Jersey: Merck & Co., Inc., 1986).

20. Dee Blanco, Personal communication.

21. Don Hamilton, Personal observation.

22. Arthur Young, Personal communication.

23. Scheibner, *Vaccination: The Medical Assault on the Immune System*, 21.

24. Laurie Garrett, *The Coming Plague* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1994), 558–560.

25. Schultz, "Theory and Practice of Immunization", 92–104.

26. Christopher Day, "Isopathic prevention of Kennel Cough—Is Vaccination Justified?," *International Journal of Veterinary Homeopathy* 2, no. 2 (1987).

Список рекомендуемой литературы

Animal Care

Day, Christopher. *The Homeopathic Treatment of Small Animals*. London: Wigmore Publications, 1984. Though short on detail, this book has a lot of good information from an experienced British veterinary homeopath.

Human Home Care

The following three books are all very good. I suggest you browse each one to see which style you like. Or purchase more than one; each has its strong points.

Castro, Miranda. *The Complete Homeopathy Handbook*. New York: St. Martin's Press, 1991.

Cummings, Stephen, M.D., and Dana Ullman, M.P.H. *Everybody's Guide to Homeopathic Medicines*. New York: J.P. Tarcher/Putnam, 1997.

Panos, Maesimund, and Jane Heimlich. *Homeopathic Medicine at Home*. Los Angeles: J.P. Tarcher, 1980.

Homeopathic Reference Books

Boericke, William, M.D. *Pocket Manuel of Materia Medica with Repertory*. 1927. Reprint, Santa Rosa, California: Boericke and Tafel. This is an inexpensive book with good remedy descriptions. A good place to start with a *materia medica*. See also Phatak.

Clarke, John, M.D. *A Dictionary of Practical Materia Medica*. 3 vols. 1900. Reprint, Essex, England: C.W. Daniel and New Delhi: B. Jain, 1991. This is an excellent materia medica from a master of the past century. Dr. Clarke gives great information on remedy sources as well as very good remedy descriptions.

Kent, James, M.D. *Repertory of The Homeopathic Materia Medica*. Reprint, New Delhi: B. Jain, 1986. All modern repertories are based upon Kent. This book is inexpensive and a great place to start; many practitioners still use Kent's repertory as their primary resource.

Phatak, S.R. *Materia Medica of Homeopathic Medicines*. New Delhi: Indian Books and Periodicals Syndicate, 1977. This repertory is small and inexpensive and based upon Boericke, with Dr. Phatak's additional hints. A good introductory *materia medica*.

Phatak, S.R. *A Concise Repertory of Homeopathic Medicines*. 1982. Reprint, New Delhi: B. Jain, 1991. Dr. Phatak's personal repertory is based upon many years of practice. This is a wonderful book for acute symptoms, though it has great information for practitioners as well.

Tyler, Margaret. *Homeopathic Drug Pictures*. 1952. Reprint, Essex, England: C.W. Daniel, 1989. Dr. Tyler provides excellent pictures of remedies and highlights from the provings. Very good overall descriptions of remedies.

Vermeulen, Frans. *Concordant Materia Medica*. Haarlem, The Netherlands: Merlijn Publishers, 1994. This *materia medica*, though expensive, is a great compilation from several authors, beginning with Boericke.

Yasgur, Jay. *Yasgur's Homeopathic Dictionary and Holistic Health Reference*. Greenville, Penn-

sylvania: Van Hoy Publishers, 1998. An indispensable resource that assists in understanding the older medical terms encountered in homeopathic study.

Homeopathic Theory and Principles

Close, Stuart. *The Genius of Homeopathy*. Reprint. New Delhi: B. Jain, 1996. Dr Close practiced and taught in the early 1900s. This book is based upon numerous lectures. It has a lot of very insightful information, and it provides a good overview of the homeopathic method.

Hahnemann, Samuel. *Organon of the Medical Art*. Edited by Wendy O'Reilley. Translated by Steven Decker. Redmond, Washington: Birdcage Books, 1996. See next entry

_____. *Organon of Medicine*. Translated by Jost Kunzli, M.D., et al. London: Gollancz, 1989. Hahnemann's *Organon* is the Bible of homeopathic medicine. The O'Reilley edition is the easiest and clearest one, and although it is more expensive, it is a beautiful book. The Kunzli edition is also very good. There are other editions by Boericke, but these are harder to read because of the translation.

Kent, James, M.D. *Lectures on Homeopathic Philosophy*. 1900. Reprint, Berkeley, California: North Atlantic Books, 1979. Wonderful series of essays on the homeopathic healing art.

Roberts, Herbert. *The Principles and Art of Cure by Homeopathy*. 1942. Reprint, New Delhi: B. Jain, 1990. Very good introduction to homeopathic therapeutics.

Sankaran, Rajan. *The Spirit of Homeopathy*. Bombay: Homeopathic Medical Publishers, 1992. Sankaran is a modern homeopath from India whose ideas have had a great impact upon the homeopathic world. His work is somewhat controversial (some homeopaths believe he strays from Hahnemann, while others feel he has greatly expanded upon Hahnemann's ideas), but he gives a very good explanation of disease and the homeopathic approach, and the book is very interesting to read—and very thought-provoking.

Vithoulkas, George. *The Science of Homeopathy*. New York: Grove Press, 1980. Excellent overview of homeopathic medicine by one of the modern masters.

Whitmont, Edward, M.D. *The Alchemy of Healing*. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1993. Compelling treatise on the fundamental nature of disease and healing. The author was a homeopath as well as a Jungian scholar and psychotherapist. My copy is well worn.

History of Homeopathy and Medicine

Coulter, Harris. *Divided Legacy: A History of the Schism in Medical Thought*. (4 volumes). Berkeley, California: North Atlantic Books, 1975, 1977, 1981, 1994. This four volume set covers the history of medicine, emphasizing the divergence into rationalist and empirical pathways. Volume Three covers the conflict between homeopathy and allopathy in the Nineteenth century. Fascinating reading.

Winston, Julian. *The Faces of Homoeopathy: An illustrated History of the first 200 years*. Tawa, New Zealand: Great Auk Publishing, 1999. This new book covers the history of homeopathy in the United States, with many pictures of the great homeopathic masters. It should be very interesting reading, as the author is a leading authority on the subject.

General Animal Care

Frazier, Anitra, with Norma Ecroate. *The New Natural Cat: A Complete Guide for Finicky*

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ —

Owners. New York: Plume/Penguin Books, 1990. An excellent book on holistic cat care from a woman who really knows cats.

Frost, April, and Rondi Lightmark. *Beyond Obedience: Training with Awareness for You and Your Dog*. New York, Harmony Books, 1998. This book approaches training from a perspective that animals have intrinsic value; the training is thus done with respect for the animal.

Levy, Juliette de Bairacli. *The Complete Herbal Book for the Dog and Cat*. London: Faber and Faber, 1991. See next entry.

_____. *Cats Naturally*. London: Faber and Faber, 1991. These books are very interesting compilations of the author's many years of wisdom from treating animals using herbal and folk remedies.

Pitcairn, Richard, D.V.M., Ph.D., and Susan Pitcairn. *Dr. Pitcairn's Complete Guide to Natural Health for Dogs and Cats*. Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press, 1995. The best overall book on holistic animal care. Dr. Pitcairn covers everything from herbs and homeopathy to diet, vaccination, and general care.

Schoen, Allen. *Love, Miracles, and Animal Healing*. New York, Simon and

Schuster, 1996. An inspiring story of the author's transition into holistic medicine. The book also gives recommendations for holistic home treatment.

Schwartz, Cheryl. *Four Paws, Five Directions: A Guide to Chinese Medicine for Cats and Dogs*. Berkeley, California: Celestial Arts, 1996. A wonderful introduction to Chinese medicine, with generous instructions for home treatment with acupressure and herbs.

Nutrition

Balch, James, M.D., and Phyllis Balch. *Prescription for Natural Healing*. Garden City Park, New York: Avery Publishing, 1997. This book has a great encyclopedia of common illnesses and recommended supplements. Very good.

Pitchford, Paul. *Healing With Whole Foods*. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1993. My favorite nutrition book. The author combines Chinese medical and Western approaches to nutrition.

Vaccination

Coulter, Harris. *Vaccination, Social Violence, and Criminality*. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1990. Dr. Coulter presents a compelling hypothesis linking vaccination-induced brain damage to many modern ailments, including attention-deficit/hyperactivity disorder, autism, and violent behavior.

James, Walene. *Immunization—The Reality Behind the Myth*. Bergin and Garvey, 1995. A very good book that clearly explains the problems with vaccination.

Miller, Neil. *Vaccinations: Are They Really Safe and Effective?* Santa Fe, New Mexico: New Atlantean Press, 1994. An excellent overview of the vaccine issue.

Neustaedter, Randall. *The Vaccine Guide*. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1996. The author examines the pros and cons of vaccination. Excellent, well-referenced.

Scheibner, Viera, Ph.D. *Vaccination: The Medical Assault on the Immune System*. Maryborough, Victoria, Australia: Australian Print Group, 1993. The author compiled information from hundreds of articles published in conventional medical journals. Thoroughly documented and very interesting.

Дон Гамильтон

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

КОШЕК И СОБАК

Главный редактор:
Дмитриев В.К.

Технический редактор:
Ордиховская Е.А.

Корректор:
Тумасова Л.Г.

Верстка:
Иванов В.А.

Дизайн обложки:
Дмитриева Е.В., Иванов В.А.

Подписано в печать 22.04.2005.
Формат 60×84/16. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Бумага офсетная № 1. Печ. л. 42,5.
Тираж 1000 экз. Заказ № 5212

ЗАО «Гомеопатическая Медицина»
117 630, Москва, а/я 32
Юр. адрес: Москва, Можайское шоссе, 29/2
Тел.: (095) 241-70-83,
241-40-89

Отпечатано в типографии ФГУП
«Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»
140010, г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский проспект, 403
Тел.: (095) 554-21-86, факс: (095) 554-00-64
E-mail: pikran@pikran.ru, [http:// www.pikran.ru](http://www.pikran.ru)

«Это удивительная книга, пронизанная любовью и уважением к домашним животным. Я убедился, что самые лучшие советы по лечению наших питомцев может дать только ветеринар-гомеопат. Прочтите – и вы тоже в этом убедитесь».

Jeffrey Moussaieff Masson, автор «Dogs Never Lie About Love» и соавтор «When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals».

«Доктору Гамильтону удалось написать яркое и основательное руководство по ветеринарной гомеопатии, доступное всем, кто искренне любит своих питомцев. Эта замечательная книга – необычайно ценный вклад в развитие ветеринарной гомеопатии».

Allen Schoen, D.V.M., M.S., автор «Love, Miracles, and Animal Healing» и соавтор «Complementary and Alternative Veterinary Medicine, Principles and Practice».

«Доктор Дон Гамильтон является одним из наиболее опытных и эрудированных ветеринаров-гомеопатов в США. В этой книге нашли свое отражение как огромный практический опыт Дона Гамильтона, так и необычайно глубокое понимание принципов гомеопатии. Нам повезло, что доктор Гамильтон решил поделиться с нами своей мудростью. Благодаря этой книге мы сможем приобрести новые знания, которые позволят нам лучше заботиться о наших питомцах. Эта книга, несомненно, достойна того, чтобы занять место в вашей домашней библиотеке».

Cheryl Schwartz, D.V.M., San Francisco Veterinary Specialists, автор «Four Paws, Five Directions: A Guide to Chinese Medicine for Cats and Dogs».

«В своей книге Дон Гамильтон последовательно и в доступной форме излагает основные принципы гомеопатии, знание которых необходимо для успешного лечения больных животных. Несомненно, что благодаря этой книге вы приобретете реальную возможность помочь вашим питомцам в преодолении различных превратностей жизни... Конечно, читателям потребуется определенное время для внимательного изучения этой книги и постижения одного из величайших открытий в истории медицинской науки. Нам необыкновенно повезло, что в этом увлекательном путешествии нас будет сопровождать именно доктор Дон Гамильтон».

Из предисловия, написанного Richard Pitcairn, D.V.M., Ph.D., автора «Dr. Pitcairns Complete Guide to Natural Health for Dogs and Cats».

Доктор Дон Гамильтон, D.V.M., практикующий ветеринар с двадцатилетним стажем работы. В течение тринадцати лет занимается ветеринарной гомеопатией. Профессиональное обучение прошел в Академии ветеринарной гомеопатии; кроме того, изучал гомеопатию под руководством Dr. Richard Pitcairn (США), Francisco Eizayaga (Аргентина), Rajan Sancarap (Индия), Alize Timmerman (Нидерланды) и Edward C. Whitmont (США). В настоящее время практикует в штате Нью-Мексика.